

504e

No. 62.

Biblio.
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

HAUPT-PREIS-VERZEICHNISS

1885—1886

von



L. SPÄTH,
BAUMSCHULE



bei Rixdorf-Berlin.

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. Späth.

Handelsgärtner und Wiederverkäufer
erhalten auf Baumschulartikel
10% Rabatt.

Verkaufs-Bedingungen.

verstehen sich in Reichswährung, 1 Mark (M) = 100 Pfennig (P). Ausländisches Gold und
um Tageskurse in Zahlung genommen.

Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen

erkannte Besteller ersuche ich, *ihren werthen Aufträgen den Betrag*, einschliesslich
zufügen, oder mir *Nachnahme zu gestatten*, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht
gegangen — ohne Berücksichtigung und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird
sondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen
Geldsendungen bitte ich zu *frankiren*.

ne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages *bereits vergriffen sein*, so werde ich
ist Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu
besonders verboten wird.

ausnahmsweise starken Exemplaren tritt eine entsprechende *Preiserhöhung* ein.
dem Aussuchen der Pflanzen in der Baumschule durch den Besteller haben die

Catalogs keine Gültigkeit.

Die Hundert-Preise des Cataloges werden von 25 Stück, die Tausend-Preise von
500 Stück ab berechnet

Für Emballage, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird,
dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu
nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis, jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe,
Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die *Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller* und kann ich für Ver-
zögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben durchaus nicht ver-
antwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen
Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend, die Art des Transportes (*ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.*) anzugeben,
sowie die *letzte Eisenbahn- oder Poststation* gefälligst zu vermerken und den *Namen und Wohnort recht*
deutlich zu schreiben.

Etwaige *Reklamationen*, welche nicht *sofort nach Empfang* der Sendungen gemacht werden,
bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben,
die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem dazu gut geeigneten Sandboden sehr leicht in jeder anderen Bodenart
fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner bei Rixdorf-Berlin belegenen Baumschule, die über *125 Hektar oder*
über *500 preuss. Morgen* umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen.

Die *Versendung beginnt* nach den ersten stärkeren Nachfrösten, gewöhnlich *Anfangs October*, und
dauert bis *gegen Ende April*. Bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März,
wenn sie nicht etwa speciell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell aus-
geführt werden können, wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen *möglichst im Herbst*
zu machen. Uebrigens ist die *Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten*
ganz besonders anzuempfehlen und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur
die immergrünen Gehölze, deren *beste Verpflanzzeit der Spätsommer* ist und der Zeitpunkt, in dem sie im
Frühjahr zu treiben beginnen, also *Mitte April bis Mitte Mai* in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher *in gefrorenem Zustande ankommen*, so lasse man sie einige Tage
an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet
oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Adresse.

Seit 1. October 1884 habe ich mein Comptoir von Berlin nach der Baumschule verlegt und
werden von derselben Zeit ab Briefe und Postsendungen nach „Späth's Baumschule“ nicht mehr, wie
bisher, von Britz, sondern von Rixdorf-Berlin aus bestellt. Ich bitte daher dringend, um erhebliche Ver-
zögerungen bei der Bestellung zu vermeiden, vom 1. October ab alle Briefe und Sendungen nur wie
folgt zu adressiren:

L. Späth, Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Für meine in Berlin wohnenden geehrten Kunden bemerke ich, dass die Telephonverbindung
meines Hauses Berlin, Köpnickerstr. 154 mit dem Comptoir der Baumschule bei Rixdorf-Berlin, wie
bisher, bestehen bleibt, und auch unter Nr. 1710 mit allen Fernsprech-Stellen Berlins in Verbindung steht.

Medaillen internationaler und grosser allgemeiner Gartenbau-Ausstellungen

für richtig benannte Obstsorten, besonders
schön gezogene Obstbäume, Alleebäume und Gehölz-Sortimente.
Berlin 1872, 1880, 1883. **Berlin 1883.**



3 Grosse silberne Staats-Medaillen.
Viele kleine silberne und bronz. Staats-Medaillen.



Grosse goldene Medaille. Ehrenpreis der Stadt Berlin.
Grosse und kleine silberne und bronz. Medaillen.
Petersburg 1869, 1884.

Cöln 1875.




6 erste Preise für Obstbäume.
Paris 1867.



Grosse goldene und grosse silberne Medaille.
Hamburg 1869, 1883.



Für Hyacinthen.



1 goldene, 12 silberne, 6 bronz. Medaillen,
4 Extrapreise.

Erfurt 1876.



Erster Preis für Gehölz-Sortimente.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

A. Neuheiten der Baumschule.

- Acer dasycarpum* fol. albo-varieg. (Späth). Die Blätter dieser sehr schönen in hiesiger Baumschule entstandenen neuen Ahorn-Var. sind recht gut panachirt.
- 1jährige Veredlungen p. St. 2 M., p. 10 St. 17 M.
2—5jährige " p. St. 3 M., p. 10 St. 25 M.
- Acer dasycarpum longifolium*. (Späth). Eine neue Varietät der Britzer Baumschule mit tief eingeschnittenem, langen Blatte
- 2—5jährige Veredlungen und junge Hochstämme . . . p. St. 2 M., p. 10 St. 18 M.
- Acer dasycarpum lutescens*. (Späth). Die prächtig bronzefarbenen Frühjahrstrieb und die zart gelbgrüne Belaubung im Sommer, machen diese in der hiesigen Baumschule aus Samen entstandene Ahorn-Varietät zu einer höchst schätzenswerthen Neuheit für die Landschaftsgärtnerei.
- 1jährige Veredlungen p. St. 1,25 M., p. 10 St. 10 M.
2—4jährige " p. St. 2,— M., p. 10 St. 16 M.
Hochstämme " p. St. 2—3 M.
- Acer dasycarpum pendulum*. (Späth). Dieser prächtige neue Trauerbaum von zierlichem und stark hängenden Wuchse ist in Berlin aus Samen entstanden. Bei geschlossenem Stande hängen die Zweige nicht, sondern nur wenn der Baum frei steht
- 1jährige Veredlungen p. St. 1,50 M., p. 10 St. 12 M.
2—4jährige " und Hochstämme p. St. 3,— M., p. 10 St. 25 M.
Extra starke Hochstämme, prächtige Standbäume . . p. St. 6—8 M
- Acer dasycarpum pulverulentum*. (Späth) Aehnlich wie bei dem *Acer campestre pulverulentum* sieht das Laub dieser hübschen Neuheit der hiesigen Baumschule aus wie weiss bestäubt, während die Spitzen der jungen Triebe zart rosafarben angehaucht sind. Alle Zweige sind beständig bunt.
- 1jährige Veredlungen p. St. 2 M., p. 10 St. 17 M.
2—4jährige " p. St. 3 M., p. 10 St. 25 M.
- Acer dasycarpum pyramidale*. (Späth). Recht gleichmässig aufrecht wachsend
- Kräftige mehrjährige Veredlungen p. St. 5 M., p. 10 St. 40 M.
- Acer Negundo heterophyllum*. (Späth).
- 1jährige Veredlungen p. St. 1,— M.
2—4jährige " p. St. 1,50 M.
- Acer platanoides* „Max Buntzel“. (Späth). Sehr gute Neuheit! Die Farbe der Blätter ist leuchtend gelb und dunkelgrün, oft halbirt; andere sind gelb oder violett kupferfarben mit rothen Adern durchzogen.
- Kräftige Veredlungen p. St. 5,00 M.
Hochstämme p. St. 7,50 M.
- Acer platanoides* „Reichsgraf von Pückler“. (Späth). Buntblättriger Spitz-Ahorn. Die Farben-Variationen sind ausserordentlich hervortretend und wechselt vorherrschend gelblich weiss mit grün und graubraun ab. Bei den jungen Trieben sind die Blätter sehr oft ganz weiss mit verwaschenem rosa panaschirt, was zwischen einzelnen grünen Blättern sehr effectvoll hervortritt. Sehr zu empfehlen!
- Kräftige Veredlungen p. St. 7,50 M.
Hochstämme p. St. 10,— M.
- Acer Pseudoplatanus* fol. atropurpureis. (Späth) Sämling von *Ac. Pseudopl.* fol. purp. Die Unterseite der Blätter ist bedeutend dunkler roth als bei der älteren Form.
- 1jährige Veredlungen p. St. 1,— M.
2—3jährige " p. St. 2,— M.
Hochstämme " p. St. 2,50 M.
- Acer Pseudoplatanus* fol. purpur. „Prinz Handjery“. (Späth). Ein Sämling von dem auf der Unterseite der Blätter purpurrothen stumpfblättrigen Ahorn, dessen junge Triebe eine bei Bäumen vollständig neue Farbe auf der Oberseite der Blätter haben, die von rosa in ziegelroth übergeht und im Spätsommer mit grün und gelbgrau marmorirt erscheint, während die Blattstiele lebhaft roth und die Unterseite der Blätter purpurroth wie bei der Stammform bleiben.
- 1jährige Veredlungen p. St. 1,50 M.
2—3jährige " p. St. 2,— M.
Hochstämme p. St. 2,50 M.

Neuheiten der Baumschule.

Acer Pseudoplatanus insigne. (Späth). Sehr hübsch bunt, die Blätter der jungen Triebe marmorirt.
 1jährige Veredlungen p. St. 1,— M.
 2—4jährige „ p. St. 2,— M.
 Hochstämme p. St. 2,50 M.

Alnus incana monstrosa. (Späth). Eine höchst interessante Form, hier aus Samen gezüchtet, deren Zweigspitzen regelmässig Fasciationen bilden.

1jährige Veredlungen p. St. 1 M.
 Mehrjährige p. St. 2 M.

Cornus alba var. Spaethi. (Wittmack). Diese unzweifelhaft schönste aller bunten Cornusvarietäten entstand in hiesiger Baumschule durch den Einfluss der Veredlung des weissbunten Cornus alba auf die Unterlage unterhalb der Veredlungsstelle. Die Blätter sind im Frühjahr bronzefarben, im Sommer gesättigt goldgelb gerandet, zum Theil vollständig goldgelb und leiden selbst bei der grössten Hitze nicht. Der Wuchs der Pflanzen ist sehr kräftig.

Starke 1—3jährige Veredlungen p. St. 5 M.

Cydonia jap. Baltzi. (Späth). Sehr schöne, hier aus Samen gewonnene Varietät, die ihre lebhaft rosenrothen Blüthen an den Spitzen der Zweige trägt und deshalb viel effectvoller ist als die anderen Sorten, deren Blüthen halb versteckt an den unteren Theilen der Zweige sitzen. Ich habe sie nach dem verstorbenen Herrn Baltz, der viele Jahre Obergärtner der Baumschule war, benannt.

Kräftige Veredlungen p. St. 3 M., 10 St. 25 M.

Fraxinus pubescens fol. argenteo marg. (Späth). Eine prächtige, hier entstandene Neuheit, welche die bisher bekannten weissbunten Varietäten von Fraxinus an Schönheit weit übertrifft. Die stark weiss gerandete und zierliche Belaubung stellt sie den besten der bekannten weissbunten Gehölze ebenbürtig zur Seite.

1jährige Veredlungen p. St. 1,50 M., p. 10 St. 12 M.

Mehrjährige „ , Halb- u. Hochst. p. St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.

Platanus occidentalis fol. argenteo-varieg. (Späth). Diese weissbunte Platane hiesiger Baumschule, seit mehreren Jahren als ganz constant beobachtet, kann wohl mit Recht als eine hervorragende Neuheit bezeichnet werden. Die jungen Blätter erscheinen, besonders beim zweiten Triebe, zuerst weiss mit rosa getupft und dann schön weiss marmorirt . . . p. St. 3 M.

Populus alba Bolleana. (Lauche), Pyramiden-Silber-Pappel, sogenannt zu Ehren unseres berühmten hiesigen Botanikers Herrn Dr. Bolle. Diese Pappel stammt aus dem westlichen Asien, wo auch unsere gewöhnliche Pyramiden-Pappel ihre Heimath hat, und ist eine grosse Bereicherung für unsere Gärten, da wir an pyramidal wachsenden Bäumen in dieser Färbung bis jetzt nichts aufzuweisen haben. Die Unterseite der Blätter ist ebenso intensiv weiss wie bei der „Pop. nivea“, der Wuchs kräftig und elegant pyramidal.

Wir verdanken diese herrliche neue Einführung wie auch die unten beschriebene Ulmus camp. umbraculifera dem um die Verbreitung westasiatischer Gehölze hochverdienten Kaiserl. Garteninspector Scharrer in Tiflis. Derselbe schreibt mir darüber: „Die Pyramiden-Silber-Pappel findet sich in wenigen alten schön entwickelten Exemplaren im Volksgarten von Tiflis, welcher seinen Ursprung einem persischen flüchtigen Prinzen verdankt und noch heute seinen Namen trägt. Deshalb ist es uns wahrscheinlich, dass sie aus Persien stammt. Sie ist vollkommen winterhart, nimmt in jedem feuchten Boden ein gutes Wachstum an und zeichnet sich durch ihre gigantischen Formen besonders aus, so dass die neben ihr stehenden italienischen Pappeln (Pop. fastigiata oder dilatata), ein kümmerliches Ansehen haben. Der Stamm ist bis ins höhere Alter glatt wie polirt, hellblaugrün, ohne alle Flecken und Risse, das Gerüste der Aeste kräftig und versplittert sich nicht in kleine unansehnliche Nebentriebe. Das grosse, oben schwarzgrüne Blatt sitzt fest am Zweige und ist deshalb weniger beweglich. Die glänzend weisse Unterseite entfärbt sich auch im Laufe des Sommers nicht, sondern markirt den Baum von weitem mit immer gleichem Farbeffecte. Es ist ein Zierbaum erster Ordnung. Das Holz besitzt feinere Textur als das ordinäre Pappelholz und ist auch als Nutzholz jedenfalls bei weitem vorzuziehen. Wir empfehlen den Baum jedem Natur- und Gartenliebhaber aufs Wärmste.“

2—5jährige Veredlungen . . . p. St. 2 M., p. 10 St. 15 M., Hochstämme p. St. 3 M.

Prunus cerasifera fol. purpureis. (Späth). Purpurblättrige Kirschpflaume. Diese den ganzen Sommer über prächtig rothblättrige Pflaumensorte erhielt ich, wie die vorstehende Pappelsorte, vor mehreren Jahren aus Tiflis. Sie gehört zu den werthvollsten Einführungen der neueren Zeit. Neuerdings ist dieselbe von Herrn Paillet in Chatenay, der sie auch aus ihrer Heimath erhalten haben soll, unter dem Namen **Prunus Pissardi** offerirt worden.

1jährige Veredlungen p. St. 0,75 M., 100 St. 50 M.

2- und mehrjährige Pyramiden und Hochst. p. St. 1-2,50 M., 100 St. 120 M.

Prunus Cerasus fol. pulverulentis. (Späth). Bestäubtblättrige Sauerkirsche. Die Blätter sind gleichmässig weiss- und gelbbunt.

Kräftige Veredlungen p. St. 3 M.

Neuheiten der Baumschule.

- Quercus sessiliflora Giesleri.** (Späth). Eine sehr interessante vom Oberhofgärtner Giesler in Glienicke bei Potsdam aufgefunden Form, mit meist sehr langen, schmalen, theils oberflächlich gelappten, theils ganz randigen Blättern.
Kräftige mehrjährige Veredlungen p. 1 St. 4 M., p. 10 St. 30 M.
- Salix vitellina Britzensis.** (Späth). Blutrothe Goldweide. Das 1-jährige Holz dieser Weide hat im Winter eine leuchtend rothe Färbung, wie bei *Cornus sibirica*.
2—3-jährige Pflanzen p. 1 St. 50 Pf., p. 10 St. 3 M., p. 100 St. 20 M.
1-jährige Stecklingspflanzen p. 10 St. 1 M., p. 100 St. 7 M.
- Sambucus nigra laciniata fol. aureo-varieg.** (Späth). Diese hübsche goldbunte Var. von *laciniata* ist eine Neuheit hiesiger Baumschule, an welcher die goldgelbe Färbung bald in ganz gelben Zweigen, bald in hübscher Zeichnung, jedoch nicht ganz constant, hervortritt
p. 1 St. 1 M., p. 10 St. 7,50 M.
- Sorbus aucuparia fol. luteo-varieg.** (Späth). Diese Varietät entstand hier, durch den Einfluss der Veredlung von *Sorbus auc. pendula fol. var.* auf den Wildl., an dem unter der Veredlung ein bunter Zweig hervorkam.
1-jährige Veredlungen p. St. 1,50 M.
2—5-jährige „ „ „ „ „ p. St. 2,— M.
- Syringa vulgaris, „Andenken an Ludwig Späth.“** (F. Späth). Diese unzweifelhaft schönste aller bis jetzt bekannten Fliedersorten ist eine Züchtung der hiesigen Baumschule. Sie wurde unter ca. 15000 Sämlingen der besten Varietäten gewonnen. Die einzelnen Blüten sowohl wie die Rispen sind sehr gross und von prachtvoll dunkelpurpurrother Farbe, nicht nur als Knospen, sondern auch bei vollständig geöffneten Blüten.
Kräftige 1-jährige Veredlungen p. St. 2,50 M., 10 St. 20 M.
Kräftige mehrjährige „ „ „ „ „ p. St. 3,— M., 10 St. 25 M.
- Syringa vulgaris, „Frau Bertha Dammann.“** (Späth). Herrlich reinweisse Sorte mit enorm grossen Blütenrispen, die sich durch dankbares Blüten schon als ganz junge Pflanze auszeichnet und sehr zu empfehlen ist
1-jährige Veredlungen p. St. 1,50 M., 10 St. 12 M.
Mehrjährige „ „ „ „ „ p. St. 2,— M., 10 St. 17 M.
- Syringa vulgaris, „Geheimrath Heyder“** (Späth). Bouquet sehr gr., Knospe roth, Blume nach dem Aufbrechen hellblau, im Centrum weiss, reichblühend.
Kräftige Veredlungen p. St. 1,50 M., p. 10 St. 12 M.
- Syringa vulgaris, „Dr. von Regel.“** (Späth). Rispen sehr gr., freistehend, Knospen hellroth, Blume innen schön himmelblau, in voller Blüthe bedeutend mehr blau als *Syringa Eckenholm*, Rispe freistehend.
Kräftige Veredlungen p. St. 1,50 M., p. 10 St. 12 M.
- Taxus baccata albo varieg.** (Späth). Eine sehr empfehlenswerthe Neuheit der hiesigen Baumschule, als vollständig winterhart bewährt, welche ihre prächtig weissbunte Färbung ganz constant auch auf ganz sonnigem Standorte behalten hat. Die Nadeln sind hübsch gekräuselt.
Junge Pflanzen p. St. 1 M., stärkere Pflanzen, p. St. 2 M., 10 St. 17 M.
- Ulmus campestris umbraculifera. Kugel-Rüster.** Von den Persern Nalband d. h. Baum der Schmiede genannt, weil sich unter ihm, als dem besten Schattenbaum, der zugleich den sichersten Schutz gegen Regen giebt, mit Vorliebe die Schmiedewerkstätten etabliren. Diese Rüster wird in Persien und dem südlichen Kaukasus ein mächtiger Baum mit grosser, sehr dichter und kugelförmiger Krone. Sie ist eine Abart von „*U. campestris*“ und hält unsere Winter unzweifelhaft aus. Ihre Krone baut sich vollständig kugelförmig wie die einer Kugelakazie, ohne dass sie geschnitten zu werden braucht, und hat sicher in unserem nordischen Klima, wo die Kugelakazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hat ein lebhaft grünes Kolorit und hält sich im Herbst ebenso lange am Baume wie bei *U. campestris*.
Hochstämme p. St. 3 M., p. 10 St. 25 M.
Niedrige 1—3-jährige Veredlungen p. St. 0,75—2 M., p. 10 St. 6—18 M.
- Ulmus Heyderi.** (Späth). Eine neue Ulme aus Turkestan mit grossem, länglichen, rauh behaarten Blatte. Sehr starkwüchsig.
1-jährige Veredlungen p. St. 1 M., p. 10 St. 8 M.
2- und mehrjährige „ „ „ „ „ p. St. 2 M., p. 10 St. 15 M.
- Ulmus montana atropurpurea.** (Späth). Diese aus Samen in der hiesigen Baumschule entstandene Varietät ist die dunkelste und schönste von den bis jetzt bekannten rothblättrigen Rüstern.
2—3-jährige Veredlungen p. St. 1,50 M.
Hochstämme p. St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.

B. Neue, noch sehr wenig verbreitete Ziergehölze.

- Acer dasycarpum* Wieri laciniatum. Geschlitztblättriger Silber-Ahorn. Eine äusserst zierliche Form des amerikanischen Silber-Ahornes.
 2-4jährige Veredlungen p. St. 1,50 M., p. 10 St. 10 M.
 Hochstämme p. St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.
- Acer Negundo* versicolor. Bunter Eschen-Ahorn p. St. 3,50 M.
- Acer Pseudoplatanus* corstorphinensis. Hrt. angl. Bestäubtblättriger Ahorn p. St. 1,50 M.
- Acer Semenowi*. Ein neuer Ahorn aus Turkestan mit äusserst zierlicher Belaubung.
 2-4jährige Sämlinge p. St. 4 M.
- Amygdalus persic*. Davidiana alba. Prätig weissblühend p. St. 2 M.
- Crataegus Oxyacantha* semperflorens. (Ernaut). Diese Var. blüht sehr reichlich bis zum Spätherbst und wird ihres ganz niedrigen compacten Wuchses wegen auch zur Topfcultur und zum Treiben empfohlen p. St. 1 M.
- Deutzia crenata* fol. var. Gute, gelbbunte Varietät p. St. 1 M.
- Fraxinus excelsior* fol. aureis. Die Blätter sind leuchtend goldgelb, wie bei *Sambucus nigra* fol. luteis. Der Baum verdient die weiteste Verbreitung.
 1jährige Veredlungen p. St. 1,50 M., p. 10 St. 10 M.
 Hochstämme p. St. 3,— M., p. 10 St. 20 M.
- Gleditsia caspica*. Kaspische Gleditschie p. St. 1,50 M.
- Hypericum hircin* fol. var. Mit buntem Blatt p. St. 1,— M.
- Incarvillea Koopmanni*. (Lauche.) (Bignoniaceae). Im August und September in endständigen Rispen roth blühender Strauch von 1 m Höhe aus Turkestan p. St. 0,50 M.
- Ligustrum vulgare* glaucum fol. albo-margin. Ganz besonders schöne Varietät, deren Blätter sehr regelmässig weiss gerandet und weiss bestäubt sind p. St. 0,50 M., p. 10 St. 4 M.
- Neviusia Alabamensis*. Schöner zum Treiben geeigneter Strauch p. 1 St. 2 M.
- Philadelphus grandifl.* fl. pl. Blume stark gefüllt, 3-4 cm Durchmesser. Ganz neu! p. St. 2 M.
- Pirus Malus pendula*. „Elise Rathke“. Neuer stark hängender Apfel, trägt schöne grosse Tafel-früchte. Sehr empfehlenswerth.
 Hochstämme p. St. 6 M.
- Pirus Ringo fastigiata bifera*. (hort. Zoesch.). Regelmässig pyramidal wachsender, sehr fruchtbarer grosser Zierapfel. Zeigt oft im September eine zweite Blüthe p. St. 2 M.
- Prunus angustifolia pendula*. Hängend, sehr zierlich p. St. 1,50 M.
- Prunus cerasifera flore roseo pleno*. Gefüllt blühende Kirschpflaume. Neue zum Fröhrtreiben sehr empfohlene Pflanze, mit atlasrosa, stark gefüllten Blüten.
 Kräftige Veredlungen p. St. 2 M., p. 10 St. 17 M.
- Ptelea trifoliata aurea*. (Behnsh.). Glänzend goldgelb constant p. St. 4 M.
- Ptelea trifoliata* fol. var. Hrt. Bunt gestreift, zeigt die bunte Färbung erst ein Jahr nach der Pflanzung p. St. 2,50 M.
- Robinia Pseudo-Acacia monophylla pendula*. Sehr schöne neue Trauer-Acacie.
 Hochstämme p. St. 3 M.
- Salix Zabeli pendula*. Neue Trauer-Weide.
 Hochstämme p. St. 2 M.
- Sambucus racemosa plumosa*. Eine aus Russland erhaltene Form mit äusserst zierlich geschlitzten Blättern. Als Einzelpflanze auf Rasen von sehr guter Wirkung. p. St. 0,50 M., p. 10 St. 4 M.
- Sambucus racemosa rosaeflora*. Mit kleinen rosenähnlichen Blüten p. St. 1,50 M.
- Sambucus racemosa serratifolia*. Durch die schöne Form der Blätter äusserst zierend p. St. 0,75 M., p. 10 St. 6 M.
- Sophora sinensis* p. St. 2 M.
- Sophora violacea* p. St. 1,50 M.
- Ulmus Dampieri* Wredei. Pyramiden-Gold-Rüster. Die Farbe der Blätter ist intensiv goldgelb, die Form des Baumes die bekannte schöne Pyramidenform der *Ulmus Dampieri*, an der die Varietät als ein einzelner gelber Zweig in den Königl. Gärten zu Potsdam von dem Herrn Garteninspector Wrede aufgefunden ist
 1-3jährige Veredlungen p. St. 1 M., p. 10 St. 8 M.
 Hochstämme p. St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.
- Ulmus myrtifolia purpurea*. Myrtenblättrige Purpur-Rüster. Die Blätter dieses zierlichen Baumes sind sehr klein und viel dunkler rothbraun als bei der gewöhnlichen Purpur-Rüster. Sie behalten auch eine bräunliche Färbung den ganzen Sommer über
 2-4jährige Veredlungen p. St. 1 M., p. 10 St. 8 M., p. 100 St. 70 M.
 Hochstämme p. St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.

Edelreiser. Veredelte Obstbäume.

<i>Ulmus</i> camp. Koopmanni. Kugelige Feld-Rüster. Sehr kleinblättrig	p. St. 2 M.
<i>Ulmus</i> betulaeifolia nigrescens, {	Diese 3 Sorten bezog ich aus Belgien und ist von ihnen die
<i>Ulmus</i> corylifolia foliis purpureis, {	erste ähnlich der myrtifolia aber mit grösseren Blättern. Die
<i>Ulmus</i> latifolia nigricans, {	zweite besitzt noch grössere Blätter und hat beim Austreiben
	eine rothe Farbe, während die dritte, zur Abart der <i>U. montana</i> (scabra) gehörend, ganz
	grosse Blätter mit schwarzgrüner Färbung zeigt.
1—2 jähr. Veredl. p. 1 St. 0,75 M., p. 10 St. 6 M. Alle 3 Sorten zus. à 1. St. für 2 M.	
Hochstämme	p. 1 St. 2 M., p. 10 St. 15 M.
<i>Ulmus</i> fulva pendula. Amerikanische Hänge-Rüster, die sich durch ihren leichteren Bau und hell-	
grüne Blätter von der <i>U. mont. pend.</i> unterscheidet.	
Hochstämme	p. St. 3 M.
<i>Weigela</i> arborea grdf. sulphurea.	p. St. 1 M.
<i>Weigela</i> hybrida „Memoire de Mme L. van Houtte.“	p. St. 3 M.
<i>Weigela</i> rosea nana fol. var. Sehr schöne bunte Weigela. Niedrig bleibend.	p. St. 1 M.

Edelreiser,

für Frühjahrs- und Sommergeveredlung.

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im Februar zu bestellen.

Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen p. Sorte und Stück 15 Pf., 100 Äpfel derselben Sorte 1 M.
Pfirsiche und Aprikosen p. Stück und Sorte 30 Pf.
Rosen à Stück 20—30 Pf., Gehölze p. Stück 15—60 Pf.
 Neue Sorten von Obst und Gehölzen ungefähr $\frac{1}{3}$ des Preises einer niedrigen Pflanze.
 Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.
 Ein Reis hat mindestens 5—8 gute Äpfel.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältiger Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen, ferner neue Obstsorten.

Die **in dieser Schrift (fett) gedruckten Sorten** sind von den deutschen Pomologen Versammlungen empfohlen.

Von hochstämmigen Obstbäumen sind in diesem Herbst circa 200,000 Stück, von Zwergobstbäumen circa 75,000 Stück in sehr guter Qualität zum Verkauf vorrätig, so dass ich hoffe, alle Aufträge darauf zur vollsten Zufriedenheit der geehrten Besteller ausführen zu können. Trotzdem wird es im Frühjahr vorkommen, dass einzelne Sorten vergriffen sind und bitte ich daher, wenn nur ganz bestimmte Sorten verlangt werden, dieselben schon im October senden zu lassen.

Bei grösserem Bedarf an Obstbäumen empfiehlt sich der Transport in Wagentladung. Eine Lowry enthält 3—4000 Hochstämme und stellen sich die Gesamt-Unkosten an Fracht, Emballage etc. bei einer Entfernung von 500 Kilometer auf nur 6—8 Pfg. pro Baum.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

S. bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;

H. bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;

W. bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.

Ferner bedeutet:

Fl. — Fleisch;

Fr. — Frucht;

gr. — gross;

kl. — klein;

mgr. — mittelgross;

schm. — Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).

Aepfel.

Die Hochstämme und Halbstämme sind auf Apfelwildlinge, die Pyramiden und Palmetten auf Splittapfel (Doucin), die Cordons auf Johannisapfel (Paradies) veredelt.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als Hochstamm — H, Mittelstamm — M, Pyramide — P, Spalier — S, Cordon — C, 1jährige Veredlung — 1j. vorrätig ist.

Preise.

	pr. Stück M.	pr. 100 St. M.	pr. 1000 St. M.
Hochstämme , sehr schöne mit guten Kronen, ca. 6—8 cm. Stammumfang, auf 1 mtr Höhe gemessen und von ca. 1,90 mtr. Stammhöhe	1,50	125	1110
do. extra starke, 9—11 cm. Stammumfang, 1 mtr. hoch gemessen	1,75-2,50	160	1450
Mittelstämme , mit ca. 1,25 mtr. Stammhöhe	1,—	80	750
Schnurbäumchen , (Cordons), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet	0,75	65	600
do. doppelte und kräftige einfache	1,25	110	1000
Spalierbäume , Palmetten mit einer Etage	1,50	125	1200
do. do. mit zwei Etagen	2,75	250	2250
do. do. mit drei Etagen	4,—	375	—
Pyramiden	M. 0,75 bis 3,50	65-300	—
Einjährige Veredlungen auf Doucin oder Wildling	0,40	35	300

Einjährige Apfel-Veredlungen auf Wildling sind nur in den nachstehenden Sorten abzugeben: Nr. 2. 5. 8. 14. 15. 17. 18. 31. 32. 33. 37. 39. 41. 59. 70. 71. 73. 74. 76. 78. 79. 80. 83. 86. 103. 110. 120. 124. 127. 160. 184. 208. 239. 250. 280. 285. 286. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 327. 334. 356. 376. 398. 501. 530. 535. 552. 553. 560. 562. 566. 589. 594. 595. 644. 668.

Bezeichn., d. vorrätig. Form.	No	
H. M. P. S. 1j.	76.	Alantapfel , (Grosser edler Prinzessinapfel), **†† W, sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.
H. P. 1j.	131.	Ananasapfel , Rother, **†† Sept.—Oct. Fr. mgr. zart und saftig. Sehr angenehm duftend
H. M. P. 1j.	455.	„ Weisser , **†† Oct.—Dec.; treffliche reichtragende Sorte.
P. 228.		Api , Kleiner, *† W.—S
H. M. P. C. 1j.	86.	Astrakan , Rother, *††. Ende Juli — Mitte Aug. Gute Marktfucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der Schönheit der Früchte nicht für Anpflanzungen an Landstrassen geeignet.
H. M. P. 1j.	83.	„ Weisser , Russischer Eis-A., (Pomme de glace transparente) *† August. Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfucht sehr schätzbar.
H. M. S. 112.		August van Mons , **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund. Fl. fein und saftig, trägt früh und reich.
P. C. 1j. 127.		Belle de Boskoop , (Reinette de Monfort), *†† Nov.—Dec. I, Fr. mgr. auch gr. Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.
H. M. P. S. C. 1j. 120.		Bellefleur , Gelber **†† W.; feiner Tafelapfel, regelmässig tragend.
H. P. 1j. 75.		Blutapfel , †† Nov. Schätzbare Haushaltsfrucht.
H. M. P. 1j. 3.		Bohnenapfel , Grosser, ††, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte fest hängen und der Baum alle Jahre reich trägt.
H. M. P. 1j. 151.		Boikenapfel , **†† W. Für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.
H. M. P. S. C. 1j. 10.		Borsdorfer , Edel-, **†† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.



Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer.

Bezeichn. d. vorrätth. Form.	No.	
H. M. P. S. 1j.	183.	Borsdorfer, Rudolph's Zwiebel-, **†† Dec.—März. (S. Illustration). Frucht sehr fein, mürbe, von fein gewürztem, dem Edelborsdorfer oder auch der Orleansreinette ähnlichen Geschmack. Baum trägt früh und jährlich reich.
P. S. C. 1j.	66.	Cadeau du général, (Vaugoyeau), **†† Dec.—März, I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig; vorzügliche Frucht.
H. M. P. C. 1j.	589.	Calvill, Berliner weisser Winter-, **††. Eine vortreffliche Var. vom Weissen W. Calvill, die sich durch regelmässige und frühe Tragbarkeit vorthailhaft auszeichnet.
H. P. S. C. 1j.	162.	„ von Boskoop, **†† Jan.—April. Fr. gr. und fein.
P.	179.	„ des femmes, **† Febr.—Mai I. Fr. mgr. Fl. locker und saftig; besonders schätzbare Tafelfrucht.
H. M. P. S. C. 1j.	70.	„ Garibaldi's, **† Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.
P.	94.	„ Gestreifter Herbst-, **†† H.
H. M. P. S. C. 1j.	99.	„ Rother Herbst- , (Edelkönig), *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen, wächst langsam.
H. M. P. S. C. 1j.	91.	„ Rother Winter, **†† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.
P. S. C. 1j.	69.	„ von St. Sauveur, **†† Nov.—Dec. gr. mit weinbeerartigem Zucker- geschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.
H. M. P. S. C. 1j.	78.	„ weisser Winter, (Calville blanc), **†† W. Fr. gr. gehört zu den besten Tafeläpfeln. Wuchs als Hochstamm mittelgross.
H. M. P. S. C. 1j.	59.	Cardinal, Geflammt- , *†† W. Fr. gr., zu ökonomischen Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.
H. M. P. S. C. 1j.	163.	Cellini, *†† Oct.—Nov. I, Fr. gr. und von sehr schönem Aussehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar; auf Paradies oder Doucin veredelt oft schon im zweiten Jahre mit Früchten besetzt.

— 9 —

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H. M. P. S. C. 1j.	74.	Charlamowski , (Nalivia), *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.
H. M.	390.	Cousinet , Gellammter-, **† Sept.—Oct., mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zuckergeschmack. Sehr fruchtbar.
H. M. P.	1j. 148.	Purpurrother- , **† Nov.—Juni. Sehr schätzbarer Wirthschaftsapfel. Baum sehr fruchtbar.
H. M. P. S. C. 1j.	79.	Edelapfel, Gelber-, (Golden noble) , **† H.—W. Fr. gr. schätzh. Marktf.
P.	1j. 211.	Edelböhmer , **† Nov.—Febr., einer der schönsten und zartesten Rosenäpfel aus Tyrol; bald und reich tragend.
H. P.	1j. 100.	Edelrother , **† W., mgr. hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft u. delicat. Baum früh u. reichtragend, besonders für warme Lage geeignet.
H. M.	1j. 15.	Eiserapfel, Rother- , (Röther, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée), †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet. Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
H. M.	115.	Emilie Müller , **†† W. mgr., gelblich grün, sehr saftreich, von köstlichem Reinettengeschmack, trägt reich.
H. M. P. S.	263.	Findling von Bedfordshire , †† Nov.—März. Ein vorzüglicher englischer Küchenapfel, gross und schön, gleicht im Geschmack den Reinetten. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. M. P. S.	1j. 552.	Fürst Rismark , edle neuere Sorte, vorzügliche Winter-Gold-Reinette.
H. M.	1j. 90.	Fürstenapfel, Grüner- , †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
P. S. C. 1j.	46.	Gloria mundi , **†† Oct.—Dec., sehr gross und schön, fruchtbar.
H. M. P. S. C. 1j.	12.	Goldzeugapfel , (Drap d'or), **†† Nov.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Äpfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
H. M. P. S. C. 1j.	1.	Gravensteiner , **†† Sept.—Decbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.
H. M. P. S. C. 1j.	208.	Rother , **†† H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber viel mehr geröthet.
H.	261.	Gulderling, Gelber , **† W. Dec.—Mai. Mit sehr saftvollen, feinem gelblich-weissem Fleisch, von wenigem Geschmack.
H. M. P. S. C. 1j.	284.	Hausmütterchen , †† Oct.—Dec., sehr gross, flachrund, saftreich, von süss-weinartigem Geschmack. Baum starkwüchsig.
H. M. P. S. C. 1j.	243.	Hawthornden Apfel , †† Oct.—Nov., hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.
H. M. P. S. C. 1j.	561.	Rother , Sept., gross, abgeplattet, hellgelb, Sonnenseite roth, saftig, leicht säuerlich; sehr starkwüchsig.
H. M. P. S.	1j. 184.	Herbstapfel, Cludius , **† E. Spt.—Oct., delik. Tafelfrucht; Baum in jedem Boden gut wachsend u. reichtragend. Verdient d. weiteste Verbreitung.
H. M.	369.	Holländer, Doppelter , **† Nov.—Jan.
S.	177.	Jacob Lebel , **†† H. Fr. mgr., fein, saftreich, von edlem, weinartigem Zuckergeschmacke.
H. M.	1j. 95.	Jansen von Welten , **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum trägt bald.
P. S.	1j. 132.	Jaquins-Apfel , **†† Nov.—Frühj. I., Fr. gr., Fl. locker u. saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
H. M.	1j. 87.	Jungfernapfel, Rother , (Roths Hähnchen), *† H.—W.
P.	109.	Jungfernschönchen , **†† E. Oct.—W.
H. M. P. S. C. 1j.	39.	Kaiser Alexander , **†† E. Oct.—Jan., Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.
H. P.	C. 1j. 587.	Kaiser Wilhelm , W., sehr gross, sehr gut, hält sich bis zum Frühjahr, ähnlich einer Goldparmäne. Baum tragbar und starkwüchsig.
H. M. P. S. C. 1j.	2.	Kantapfel, Danziger , **†† Oct.—Dec., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürben, saftreichen, fast schmelzendem Fleische und von gewürzigem süssen Weingeschmacke, verlangt guten Boden.
P.	548.	Karanfil Alma , Oct.—Nov., (tartarische Sorte), trug hier reichlich, mgr., angenehm säuerlich.
H.	673.	Karthäuser, Sommer .
H. P. S.	565.	Kernloser, Sommer , (Menochers Nosecore); Winter; mgr., ausgezeichnete Qualität. Aus Amerika. Ohne alle Kerne.
H. M.	675.	Kohlapfel .

Äpfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H.	282.	Königs-Fleiner, **† Anf. Oct.—E. Nov. gr.
H. M.	238.	Köstlicher von Kew, *† bis **†† Dec.—Apr.
P.	102.	Köstliche, Der. (Lazzarola, Cossensa in Süd-Tyrol), **† W., mgr., rundlich, ausserordentliche saftreich und gewürzt, für wärmere Lagen und für Formbäume geeignet.
H.	72.	Krummstiel, Rheinischer-, †† Nov.—März. Frucht saftreich, von süß weinsäuerlichem Geschmack. Baum kräftig.
H.	436.	Küchenapfel, Keswicker-, †† Aug.—Sept., 6 Wochen. Ausserordentlich reichtragender werthvoller Kochapfel.
H. M. P. S.	1 j 167.	„ Mank's-, (Mank's Codling, *†† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saftreich, von süßweinigem Geschmack, reichtragend.
H. M. P. S. C. 1 j.	18.	Kurzstiel, Kgl.- , (K. rother K., Courtpendu rouge royal), **†† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen müssen.
H. M. P.	4.	Luiken-Apfel , *††! Oct. Jan., vorzüglicher, besonders in Württemberg hoch geschätzter Apfel, sehr spät blühend.
H. M. P. C. 1 j.	588.	Milchapel, Braunschweiger-, Ende August, s. gr., fast rund, milchweiss,
H. M. P. S.	118.	Morgenduft-Apfel, *†† Dec. Mai. Fr. gr.; trägt bald und sehr reich.
H. M.	386.	Nalivia, Possart's-, *†† Nov.—W.
H. M.	450.	Nonpareil, Alter-, *†† Jan.—Mai.
H. M. P. S.	1 j 553.	Olga Nicolajewna, W.—Mai, prächtige Borsdorfer Reinette aus d. Ukraine; starkw. und tragbar, vollständig pyramidal.
H. P. S.	554.	Parmäne, Henzens-, W., sehr schöner und guter Apfel für Tafel und Most, Baum mittelstark, gesund, sehr reichtragend.
H. P. S.	35.	„ Herefordshire, **†† Dec.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentlich fruchtbar.
M. P. S. C. 1 j.	73.	„ Scharlachrothe- , (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **†† H. Der Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.
H. P. C.	135.	„ Schwarzenbach's-, **†† Nov.—Febr. I., Fr. gr., Fl. fein u. locker, gewürzt,
P. S. 1 j.	38.	„ Sommer- , (Gestreifte S.-P.), **† Sept.—Oct., der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
H. M. P. S. C. 1 j.	8.	„ Winter-Gold- , (Engl. W.-Goldp.), **†† Dec.—März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht und springt nie im Regen auf. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.
H. M. P. S. C. 1 j.	140.	Pepping broad eyed. **† Sept.—Oct., Fr. sehr gr. und schön.
H. M. P.	1 j 80.	„ Deutscher Gold- , (Herrenhäuser deutsch. Gldp.), **†† W., Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hängen. Baum gesund und fruchtbar.
H.	93.	„ Duquesne's-, **†† Dec.—März.
P.	230.	„ Englischer Scharlach-, *†† S. M. August—E. Sept. Fl. rosenroth, locker, aber sehr saftig.
H. P.	489.	„ Gelber Lavendel-, fast **†† E. Aug.—Sept.
H. M. P. S. C. 1 j.	124.	„ London- , **†† ausserordentlich reichtragend. W.
H. M. P. S. C. 1 j.	31.	„ Parker's- , (Parker's grauer Pepping), *†† Dec.—März, sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebröckelt werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.
H. M. P. S. C. 1 j.	32.	„ Ribston- , (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.), **†† W., sehr empfehlenswerth, besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh und reich.
H. M. P. C. 1 j.	138.	Pojnik, **†† Decbr.—Mai, Fr. gr.
H. M. P. C. 1 j.	164.	Pomona, Cox's-, *†† Oct.—Nov. H. Fr. s., gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.
H. M. P. S. C. 1 j.	14.	Prinzenapfel , (Nonnen, Melonenapfel, Hasenkopf von Lübben), H., mgr., walzenförmig, saftreich und locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächst in allerlei Boden und ist sehr tragbar.
H. M. P. S. C. 1 j.	11.	Reinette, Ananas- , **†† Nybr.—Frühj., ein sehr saftvoll mgr. Apfel von angenehm gewürzhaftem, wenigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen und gedeiht auch in magerem Sandboden.

Aepfel.

Bezeichn. d. vorrath. Form.	No.	
H. M. P. S. C. 1j.	37.	Reinette, Baumann's- , (Baumann's rothe Winter-R.), **†† Dec.—März, ziemlich grosse werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.
H. M. P. S. C. 1j.	9.	Carmeliter- , (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Franz Gold-R., Limonen-R.), **†† Jan.—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süßem Geschmack und ausgezeichnete Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich, und zeichnet sich durch eine fast kugelförmige Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.
H. M. P. S. C. 1j.	16.	Champagner- , (Herrnappf., Loskrieger, Fürstl. Taf.-A., Glas-Reinette.) *†† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung, und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen, auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt u. die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können. Er dauert ein Jahr.
H. M. P. S.	1j. 334.	Coulon's- , **†† Nov.—März.
H. M. P.	1j. 501.	Cox's, Orangen- , **†† Nov.—März, sehr delikate, reichtragende Sorte.
H. M. P.	92.	Crede's Quitten- , **†† W., der Baum liebt trocknen Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.
H. M.	43.	d'Angleterre- , **†† Nov.—März.
H. M. P. S. C. 1j.	17.	Engl. Spital- , **†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.
H. M. P.	1j. 84.	Fromm's Gold- , **†† Nov.—Jan., Fr. gr. und schön goldgelb; Baum gross und sehr fruchtbar.
H. M.	C. 1j. 33.	Gäsdonker- , **†† Decbr.—Mai, Fr. mgr., delikate; gedeiht auch in rauheren Lagen.
H. M. P. S. C. 1j.	41.	Gold-, von Blenheim- , (Blenheim Pepping), **†† Winter, Fr. hält bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.
H. M. P. S. C. 1j.	6.	Grosse Casseler- , (Deutsche Goldrein. Duteh Mignonne, Holländ. Gold-Rein.), **—†† März—Juli, einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.
H. M.	669.	kleine Casseler- .
H. M. P. S.	1j. 327.	Graue, französische- , *†† W., fein gewürzt.
H. M. P. S. C. 1j.	20.	Harbert's- (Harb. Rambourrein.), **†† Dec.—April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.
H. M. P. S.	1j. 556.	Henzen's gestricke- , W., sehr guter Apfel. Baum sehr tragbar.
H. M.	507.	Köstliche von Newtown- , **†† Jan.—April.
H. M. P. S. C. 1j.	376.	Landsberger- , *†† Nov.—Jan. mgr.—gr., Fl. gelbl.-weiss, saftreich, von recht gutem süßweinigen Geschmack. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend.
H. M.	239.	Luxemburger- , *††, Fr. gr., sehr saftreich. Baum starkwüchsig und dauerhaft. Febr.—Sommer.
H. M. P.	510.	Molly- , *††, W.
H. M.	366.	Multhaupt's- , *†† W.
H. M. P. S. C. 1j.	103.	Muscat- , **†† W., mgr., zart, äusserst gewürzhaft, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.
H. M.	511.	neue Borsdorfer- , **††, Novbr.—Decbr.
H. M. P.	130.	Norwegische Wachs- , *† W.
H. M.	524.	Normännische- , **†† Oct.—Dec.
H. M. P. S. C. 1j.	285.	Oberdieck's , **†† Jan.—März, mgr., sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.
H. M. P. S. C. 1j.	19.	Orléans- , (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Gold-Rein.), **†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8—10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.

Aepfel.

Bezeichnung d. vorräth. Form.	No.	
H. M. P. S. C. 1j.	7.	Reinette, Pariser Rambour-, (Rein. von Kanada), **†† Dec.—Frühj., Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät, wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.
H.	671.	" Princess Auguste-
H. M. P. S. 1j.	206.	" Röthliche- , **†† Winter. Sehr edler Tafelapfel I. Rang, trägt sehr gut.
H. M. P. S. 1j.	398.	" Schmidtberger's rothe- , **†† Dec.-Apr. Vortreffl. Frucht, volltrag.
H.	81.	" von Breda-. **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.
H. M.	523.	" von Madeira-. **†† Dec.—März.
H. M. P. S. 1j.	356.	" Scott's- , **†† W. mgr. Baum sehr früh fruchtbar. Fl. gelblich, fein, saftig, gewürzhalt.
H. M.	564.	" Hochfeine, W. Nov.-Mai, mgr., sehr fruchtbarer und guter Tafelapfel.
P.	88.	" von Sorgvliet-. **†† Dec.-Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.
P. 1j.	129.	" Weidner's Gold- , **†† Nov.—März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch und ist tragbar.
H. M.	527.	" weisse englische, **†† Dec.-April.
H. M. P. 1j.	205.	" Woltmann's- , **†† Ende Octbr. — W. Fl. sehr fein, weiss, von sehr edlem gewürzreichen Geschmack.
H. M. P. C. 1j.	230.	" Willy's- , **†† W. Fl. sehr fein, von einem sehr aromatischen weinartigen Zuckergeschmack.
H. M. P. S. C. 1j.	110.	Richard, Gelber- , **†† Nov.—Dec.; ziemlich gr., eine werthvolle Frucht aus Mecklenburg.
H. M.	1j. 530.	Rosenapfel, Müschen's- , **†† Anf. Sept.—Octbr., mgr., flachkugelförmig, Fleisch schneeweiss, weich, saftreich, von sehr angenehm-erdbeerartigem Geschmack. Ist für die Tafel und die Wirthschaft vortrefflich.
H. M. P. S. C. 1j.	13.	" Virginischer- , (Virg. Sommer-Rosenapfel), (*) **†† Anf. Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
P. 1j.	467.	Rosmarinapfel, Rother- , **† Dec.—März.
H. M. P. S. C. 1j.	61.	" Weisser- , (Italienischer Rosm.-A.). *† Nov.—Febr., mgr., sehr fein.
H. M.	247.	St. Germain-Apfel, **†† H mgr.
P.	379.	Sämling von Beachamvell, **†, Debr.—März. Kleiner Apfel, aber sehr fruchtbar und von delikatem, gewürzreichem Weingeschmack.
H. M. P. S. C. 1j.	535.	Sommerapfel, Pfirsichrother- , **† Mitte Aug. — Anf. Sept.; einer der besten Sommeräpfel, prächtig gefärbt, früh und ausserordentlich voll tragend; auch für rauhere Gegenden.
H. M. P. S. C. 1j.	262.	Sondergleichen, Langton's- , *†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes und Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.
H. M.	1j. 250.	Stettiner, Gelber Herbst- , *†† H.—W.; mgr., sehr saftig.
H. M.	71.	" Rother- , (Rother Herrenapfel, Rostocker), *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich in manchen Gegenden nicht gesund.
H. M.	417.	Streifling, Echter Winter- , *†† W. gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.
S. C. 1j.	47.	Taffetapfel, Weisser- , (Taffetas blanc d'hiver), *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.
P. S. C. 1j.	126.	Taubenapfel, Neuer englischer- , *†† Nov.—Febr. (Neuer englischer Pigeon); gr., glänzend roth von sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig und süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.
H. M. P. S. C. 1j.	5.	" Rother Winter- , (Pigeon rouge, Mandel-A.). **† Nov.—Frühj., nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in zu feuchtem, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfrucht I. Ranges. Wuchs mässig.
P.	128.	" Schiebler's- , **† Nov.—Febr., gr., mattgelb, von zart gewürztem, kalmasartigem Geschmack. mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.
H. M. P. C. 1j.	108.	" von St. Louis- , **† H.; mgr., weinsäuerlich, sehr saftreich, eine wahre Zierde für die Tafel, hält sich jedoch nur etwa 3 Wochen. Baum kräftig, fruchtbar.

Russische Aepfel. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Bezeichn. d. vorrätb. Form.	No.	
H.	458.	Taubenapfel, weisser Winter-, **† W.
H.	674.	Transparentapfel, rother-.
H.	666.	Walze, rothe-, †† guter Wirthschafts- und Mostapfel. Oct. gr.; Baum wächst lebhaft und wird bald fruchtbar.
H. M.	1 j. 160.	Warraschke, Gabener-, †† Dec.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.
H. M. P.	1 j. 98.	Zimmetapfel, Sommer- (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair), **†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommer-Aepfeln.

Russische Aepfel.

Meist Sommer- und Herbstfrüchte, für rauhes Klima besonders passend; bezogen von dem um die Pomologie Russlands hochverdienten Director des bot. Gartens, Staatsrath Dr. von Regel in St. Petersburg.

Nachstehende Sorten sind als I — 3jähr. Veredlungen auf Wildl. abzugeben; die als Hochstamm vorrätthigen sind mit H., die als Mittelstamm, mit M. bezeichnet.

Bezeichn. d. vorrätb. Form.	No.	
H. M.	298.	<i>Antonowka</i> , bekannter ausgezeichneteter Winterapfel.
H. M.	301.	<i>Aport</i> , vorzüglicher Herbst- und Winterapfel.
H.	508.	<i>Bergamotnoje</i> , **†† Sept., mgr., sehr bald und reich tragend, braunroth gestreift und gefleckt, schöner ansehnlicher Apfel. Ist Mitte Sept. am Baume reif.
H. M.	296.	<i>Borkowskoje</i> , **†† Aug.—Sept., mgr., grün. Ein guter Süssapfel.
H. M.	299.	<i>Borowinka</i> , *† vorzüglicher Herbst- und Winterapfel; gelbl. grün mit schwachen rothen Streifen u. besonderem weinsäuerlichen Geschmack.
H. M.	302.	<i>Kalwil krasny betny</i> , (<i>Rother Sommer Calvil</i>). E. Sept., ausgezeichneteter Sommer-Tafelapfel, wachsweiß mit schwacher Röthe, von angenehmen, gewürzhaftem, säuerlich fremdartigem Geschmack.
H. M.	308.	<i>Karitschnewoje</i> , **† Anf. Sept., vorzügl. Herbstapfel, mgr., weisslich grün, karmin gestreift und geflammt, mit feinem, süsssäuerlichen, sehr gutem Geschmack.
H.	300.	<i>Plodowitka</i> , **†† Mitte Sept. — Oct., sehr schön und von gutem Geschmack, dem Charlamowsky ähnlich; reichtragend.
H. M.	295.	<i>Repka rozowaja</i> , Winter, rosenrother Repka, schöner Tafelapfel.
H. M.	304.	<i>Serjanka</i> , (Lehmapfel) guter Herbstapfel von der Küste des baltischen Meeres.
H. M.	306.	<i>Skrischappfel</i> , **† Winter, ausgeweichneter Tafelapfel mit weinsäuerlichem angenehmen Geschmack.
H. M.	305.	<i>Swinzowka</i> , *† Anf. Sept., ziemlich gross, grün, etwas gestreift, stark-säuerlich, darf nicht zu früh gepflückt werden.
H. M.	297.	<i>Titowka</i> , **† Sept.—Oct., eine sehr beliebte und viel verbreitete Sorte, dem Gravensteiner ähnlich.
H. M.	405.	<i>weisser</i> , *†† Aug.
H. M.	307.	<i>Tschernoje Derewo</i> , Winter-, vorzüglicher Tafelapfel von sehr angenehmen weinsäuerlich gewürzhaften Geschmack.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

<i>Einjährige Veredlungen</i> (in den mit 1 j. bezeichneten Sorten)	p. St. 1,— M.
<i>Spaliere</i> 1 u. 2 Etagen (in den mit S. bezeichneten Sorten)	p. St. 2-3 M.
<i>Pyramiden</i> od. 2—3jährige Veredlungen (i. d. mit P. bezeichnet. Sorten)	p. St. 1,50 M.
<i>Mittelstämme</i> in den mit M. bezeichneten Sorten	p. St. 1,50 M.
<i>Hochstämme</i> „ „ „ H. „ „	p. St. 2,50 M.

Bezeichn. d. vorrätb. Form.	No.	
P.	544.	<i>Aga Alma</i> , tartarischer Apfel. (Diese wie die anderen von dort stammenden Sorten erhielt ich von Hrn. kaiserl. Gartendirector Scharrer in Tiflis).
H. M. P.	1 j. 606.	<i>Akerö</i> , Nov.—März. Fr. gr., von fein gezuckertem, gut gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H.	672.	<i>Apfel</i> von Ramberg.
H. P.	605.	<i>Api rose</i> , Jan.—Mai, sehr gewürzhaft; schön gefärbter kleiner Dessertapfel.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Aepfel.

Bezeichn. d. vorrätth. Form.	Nr.	
H. P.	1j. 568.	<i>Beauty of Hants</i> ; Sämling der GoldreINETTE von Blenheim, herrliche Frucht. I. Qualität, Farbe dunkelroth, Gestalt kegelförmig.
H.	669.	<i>Birnappel</i> , Dr. Kuhn's-.
H. M. P.	1j. 642.	" Winter-, **†† eigenartig gewürzt
H. P.	602.	<i>Calvill</i> , Holmers.
H. P.	1j. 614.	" Holmers, Herbst.
H. M. P.	601.	<i>Cossonnet</i> , Kienast's-, mgr., Fl. zart, reinweiss, angenehm, süss-säuerlich; Baum spät blühend und sehr fruchtbar.
H. M. P.	590.	<i>Daru-Apfel</i> , ungarischer Winter-Apfel recht guter Qualität, anschaulicher Grösse und guter Haltbarkeit.
H. P.	545.	<i>Dasch Alma</i> , tartarische Sorte.
H. P.	1j. 636.	<i>Devonshire</i> , quarrenden.
H. M. P.	cl. 1j. 569.	<i>D. T. Fish</i> , Nov.—Jan., enorm gross, bis zu 10 Centim Umfang.
H.	660.	<i>Early Harvest</i> , Herbst-, mgr-gr., gelb. zart, etwas säuerlich, ausgezeichnete Qualität, Wuchsthum mittelstark. Amerik. Varietät.
H. P.	634.	<i>Evening Party</i> , W. Amerik. Var., mgr., s. gut.
H. M. P.	1j. 622.	<i>Fallawater</i> , (Tulpehocken), Nov.—März, ein grosser, schöner Apfel aus Pennsylvanien, von guter Qualität. Baum starkwüchsig, früh und reichtragend.
H. P.	1j. 616.	<i>Fall Pippin</i> , Oct.—Dec., ein in der Gegend um New-York sehr verbreiteter und beliebter, ausgezeichneter Tafel- und Küchenapfel. Frucht sehr gross. Baum starkwüchsig und reichtragend.
H. P.	1j. 623.	<i>Fameuse</i> , Nov.—Jan., im Norden der Vereinigten Staaten besonders verbreitet, dort einer der werthvollsten Dessert- und Markt-Aepfel. Fr. mgr. mit schneeweissem Fleische. Baum starkwüchsig.
H. M. P.	1j. 576.	<i>Frühapfel</i> , <i>Schmidtman's</i> -, E. Juli—Anf. August, mgr. von angenehmen Geschmack; ausserordentlich reichtragend. Ich erhielt die Sorte von Dr. Schmidtman, der sie aus Samen erzogen hat.
H.	657.	<i>Gallwyler</i> , ähnlich dem Borsdorfer.
H. M. P.	591.	<i>Gulderling</i> , <i>Henzen's</i> -, *†, mgr., schön goldgelb. ungemein reichtragend.
H. P.	547.	<i>Gunuss Alma</i> , tartarische Sorte.
H. M. P.	603.	<i>Haferapfel</i> , <i>Osnabrücker</i> -, sehr gr., Frucht von Nov. bis tief in den Winter brauchbar.
H. M. P.	579.	<i>Hampus</i> , Aug.—Oct., mgr, kugelförmig, hellgelb mit brannroth verwaschen, saftreich, fein säuerlich, Wuchs gemässigt, sehr fruchtbar
H.	665.	<i>Hermannsappel</i> .
H.	653.	<i>Herzogin Olga</i> , mgr., ausgezeichneter Herbstapfel.
H.	641.	<i>Jacobsapfel</i> , *††.
H. P.	1j. 617.	<i>Jeffers</i> , Sept.—Oct., aus Pennsylvanien, mgr. — gr., soll einer der besten Dessert-Aepfel sein. Baum fruchtbar.
H. P. S.	1j. 624.	<i>Jonathan</i> .
H. P.	637.	<i>Irish Peach</i> .
H. P.	638.	<i>Juneating red</i> , (Rother Juniapfel), *† E. Juli.
H. P.	548.	<i>Karanfil Alma</i> , tartarische Sorte.
H. P.	549.	<i>Kirmissi Alma</i> , tartarische Sorte.
H. P. S.	1j. 625.	<i>Königsapfel</i> , (King), Nov.—März, amerik. Sorte, soll einer der grössten Aepfel und bester Qualität sein. Baum starkwüchsig, reichtragend und hart
H.	658.	<i>Königin Olga</i> , W.—Mai, sehr gute Borsdorfer Rtte., aus der Ukraine. S. starkwüchsig.
H. P.	1j. 619.	<i>Kürbisapfel</i> , <i>Süsser</i> -, (Pumkin Sweet), Oct.—Nov., ein sehr grosser amerikanischer Apfel; süss, schön gewürzt, werthvoll. Baum pyramidal und sehr stark wachsend.
H. P. S.	1j. 555.	<i>Kurztiegel</i> , <i>Schwarzer</i> -, Winter—Mai, tief blutroth, plat. Tafel- und Zierfrucht.
H. M. P.	cl. 1j. 562.	<i>Lady Henniker</i> , Oct.—Jan. sehr gross, rund, oben spitz, kantig, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.
H. M. P.	1j. 585.	<i>Liebling</i> , <i>Heyder's</i> -, **†† Oct.—Jan. Fr. mgr. Von vorzüglichem Geschmack. Wurde auf der Ausstellung in Hamburg 1883 mit dem I. Preise ausgezeichnet.
P. S.	1j. 621.	" <i>Sherwood's</i> -, (Sherwood's Favorite, Chenango Strawberry, Sept., in den Ver. Staaten als Tafel- und Marktapfel wegen seiner Schönheit und Güte sehr geschätzt. Frucht gr., länglich; Baum sehr starkwüchsig und fruchtbar.

Aepfel.

Bezeichnung d. vorrath. Form.	No.	
H. P.	1 j.	695. <i>Lord Grosvenor</i> , sehr gross und reichtragend.
H. P.	1 j.	699. <i>Lord Suffield</i> .
H.		675. <i>Ludwigsapfel</i> .
H. M. P. C.		586. <i>Madame Granger</i> , Nov.—Jan., sehr gross, stark gerippt, I. Qualität. Baum ausserordentlich fruchtbar und starkwüchsig.
H. M. P.		570. <i>Monsieur Gladstone</i> , sehr früh, Sonnenseite scharlach, Fleisch fest und saftig, reichtragend.
H. P.		626. <i>Mother</i> , W. Amerikan. Var.
H. M. P. C.		604. <i>Nelson's Ruhm</i> , M. Oct.—E. Nov., ein auffallend grosser Küchenapfel, in Gestalt dem Hausmütterchen ähnlich.
H.	1 j.	644. <i>Nonnenapfel</i> , doppelter.
H. P.		627. <i>Northern Spy</i> . Dec.—Juni, gr., roth gestreift.
H. P.		610. <i>Parmäne</i> , <i>Mabbot's-</i> , Oct., mgr., fein gewürzt, reichtragend.
H. M.	1 j.	573. „ <i>Worcester-</i> , Aug.-Dec., ausgezeichnet durch ein glänzendes Roth und durch die Vollendung seiner regelmässigen länglichen Form, abknackend, saftreich, Geschmack milde und angenehm.
H. P.		609. <i>Pepping</i> , <i>Cheshunt-</i> , Nov.—Febr., mgr., I. Qualität.
H.		655. „ <i>Dechant Giersberg's Gold-</i> .
H. P.	1 j.	592. „ <i>Dr. Seelig's Orangen-</i> , ein sehr delikater Apfel, schön goldgelb wie eine Orange; allerersten Ranges.
H. P.	1 j.	577. „ <i>Galloway-</i> , sehr gr., von schönem Aussehen und langer Dauer.
H. M. P. S.		558. „ <i>Geneva-</i> , Jan.—Mai, grosse, sehr schöne und ausgezeichnet gute einfarbige Reinette aus Nordamerika.
H. M. P.		593. „ <i>Hensen's Gold-</i> , ein sehr edler Winter-Apfel allerersten Ranges; sehr fruchtbar.
H.		664. „ <i>Mammouth-</i> .
H. P. C. 1 j.		569. „ <i>Missouri-</i> , W. gross, roth, schön. Gute Marktfucht.
H. P.	1 j.	633. „ <i>Weisser</i> (White Pippin), Jan.—März, in Ohio und anderen d. westlichen Ver. Staaten viel gebaut und sehr geschätzt; dem Newtown Pippin ähnlich. Baum sehr starkwüchsig und tragbar.
H. P. S.		563. <i>Peter Smith</i> , W. ausserordentlich fruchtbar, sehr haltbar, von ausgezeichnetem Qualität.
H. M. P.		615. <i>Primate</i> , amerikanische Sorte, soll ein ausgezeichneter mgr. Sommer-Dessert-Apfel sein; Baum fruchtbar und mässig stark wachsend.
H. P.	1 j.	619. <i>Pumpkin</i> , Süsser.
H. M. P.	1 j.	640. <i>Quetier</i> , ein grosser weisser Apfel, ähnlich dem Weissen Calville.
H.		712. <i>Rambour Papelen</i> , *†† Nov.—Febr.
H. M. P. C. 1 j.		574. „ <i>Schorrad's</i> , extra gross.
H. P.		628. <i>Red Canada</i> , mgr., roth, sehr zart, saftig und wohlschmeckend. Wuchs mittelstark. Amerik. Sorte. Nov.—Mai.
H. M. P.		582. <i>Reinette Bartel's Orléans-</i> .
H. M.	1 j.	594. „ <i>Baseler-Gold-</i> .
H. M. P.		598. „ <i>Elsener pigeonartige-</i> , Winter-Apfel I. Qualit. mgr., süss-weinig.
H. M. P.		564. „ <i>Hochfeine-</i> , (R. superfine), Nov.—Mai; mgr., von sehr guter Qualit., als Hochstamm sehr fruchtbar.
H.		667. „ <i>Kleine Cusseler-</i> , *†† mgr. Nobr.—Dec.
H.	1 j.	651. „ <i>Kolvenbachs-Gold-</i> , mgr., haltbarer später Winterapfel bester Qualit.
H.		652. „ <i>Limperts-Gold-</i> , schöner, mgr., wohlschmeckender Apfel. W.
H. M. P.		595. „ <i>Lucas' Rambour-</i> , ein grosser ausgezeichneter Winter-Apfel. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
M. P.		596. „ <i>Melcher's Rambour-</i> , Wtr. gross, sehr haltbar; das dunkelgelbe Fleisch von ausgezeichnetem Wohlgeschmack.
H. P. S.		557. „ <i>Neue Ananas-</i> .
H. P.		584. „ <i>New-Yorker-</i> , *†† W. mgr., Fl. gelb-weiss, fein, fest, von gutem wenigem Zuckergeschmacke; Baum sehr starkwüchsig.
H. M. P.	1 j.	597. „ <i>Peter Heusgen's Gold-</i> , W., vortrefflich, nach Lucas eine der besten und schönsten Goldreinetten.
H.		711. „ <i>Pigeonartige-</i> .
H.		671. „ <i>Princess Auguste</i> .
H.	1 j.	656. „ <i>von Binsfelds Wein-</i> , W., grosser, guter, länglicher Tafel- und Mostapfel.
H. P.	1 j.	629. <i>Rhode Island Greening</i> , Decbr., grosser guter Apfel.
H. P. S.		559. <i>Rosenapfel</i> , <i>Hohenstaufener-</i> , H., überaus schön bandirt, Ausstellungsfrucht.
H. P.		630. <i>Roxbury Russet</i> , Nov.—Juni, mgr., grünlich, säuerlich, sehr gute amerikanische Sorte.

Äpfel. Birnen.

Bezeichnung d. vorräth. Form.	No.	
H. M. P. C.	581.	<i>Safranapfel</i> , *†† Wir., sehr schöner, haltbarer, vortrefflicher Winterapfel.
H.	670.	<i>Sary Alma</i> .
H. M. P.	578.	<i>Säftaholm</i> , Sept.—Oct., gr., länglich kegelförmig, stark carminroth gestreift, leicht abknackend, süß-säuerlich gewürzt, Baum fruchtbar und wuchshaft.
H. P.	611.	<i>Sämting. Thompson's</i> -, Dec.—Febr., guter Dessertapfel.
P.	1 j. 286.	<i>Späth's</i> -, Fr. mgr., Geschmack sehr süß und edel. Baum schwachwüchsig; die Sorte ist von meinem Vater aus Samen gezogen und vom Oberförster Schmidt, dem bekannten Pomologen, benannt.
H. P.	1 j. 620.	<i>St. Lawrence</i> , October.
P.	551.	<i>Scaba Alma</i> , Herbst, eine tartarische Sorte.
P.	550.	<i>Schakar Alma</i> , tartarischer Apfel.
H. M. P.	575.	<i>Schöner aus Werder</i> , ein lebhaft roth gestreifter Herbstapfel von der Form der Berliner Schafsaase.
H. P.	613.	<i>aus Wiltshire</i> -, (Wiltshire Beauty), Nov.—April, gr., ausgezeichnete Qualität.
H. M. P.	631.	<i>Seek-no-further</i> , Nov.—Febr., ein amerikanischer Apfel von ausgesuchter Güte, mgr.-gr., Baum starkwüchsig, alljährlich schöne Früchte bringend.
H. P.	1 j. 621.	<i>Sherwood's Favorite</i> -, gr., roth m. gelb, sehr gut.
H. M. P.	599.	<i>Siculai Apfel</i> , stammt aus Ungarn; nach Lucas zu den Rambouren gehörig; ein grosser, schön gefärbter Winterapfel.
H. S.	1 j. 571.	<i>Sondergleichen, Peasgood</i> -, (P.-Nonsuch), Oct.—Dec., sehr gr. und sehr schön wie eine schöne „Goldreinette von Blenheim!“
H. P. S.	1 j. 572.	<i>Welfort-Park</i> -, Nov., I. Qualität, erhielt ein Certificat I. Klasse durch die Londoner Gartenbaugesellschaft.
H. P.	1 j. 607.	<i>Stenkyrk</i> , Nov.—April, mgr., rund, Fl. saftig, zart, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum sehr fruchtbar, mässig starkwüchsig.
H. P.	618.	<i>Süsser aus Jersey</i> (Jersey Sweet), Sept.—Oct., mgr., roth gestreift, zart, saftig und süß; guter Tafel- und Küchenapfel; reichtragend.
H. P.	600.	<i>Täubling, Graf Haller's Winter</i> -, Febr.—Mai, ein sehr schöner, edler Tafelapfel.
H. M. P. C. 1 j.	632.	<i>Twenty-Ounce</i> , Winter, s. gr.
H. P.	1 j. 643.	<i>Wohlschmeckender</i> , Sommer, reichtragend.
H. M. P.	580.	<i>Yorkshire Beauty</i> , Aug.—Sept., 3 Zoll höher und 3½ Zoll breiter Apfel für Küche und Markt. Gerippt, abgeplattet, gelb, Sonnenseite geröthet. Fl. zart, saftig, angenehm säuerlich.

Birnen.

Die Hochstämme sind alle auf Birnenwildlinge veredelt.

Von Formbäumen sind alle Sorten, welche auf Quitte gedeihen, auf diese Unterlage veredelt, die übrigen auf schwachtreibende Wildlinge.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, M. = Mittelstamm, P. = Pyramide, S. = Spalier, C. = Cordon, 1j. = 1jährige Veredlung auf Quitte abgebar ist.

Preise.

Hochstämme, sehr schöne mit guten Kronen, ca. 1,90 mtr. Stammhöhe und ca. 6–8 cm. Stammumfang auf 1 mtr. Höhe gemessen

do. extra Auswahl, ca. 9–11 cm. Stammumfang

Mittelstämme, 1,25 mtr. Stammhöhe

Schnurbäumchen, (Cordons)

Pyramiden

Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage

do. mit 2 Etagen

do. mit 3 Etagen

Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend

do. do. auf Wildling

pr. Stück M.	pr. 100 St. M.	pr. 1000 St. M.
1,50	125	1110
1,75–2,50	160	1450
1,—	80	750
1,25	65–110	—
1,—	65–300	—
1,50	125	—
2,75	250	—
4,—	375	—
0,40	35	300
0,50	45	400

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Birnen.

Bezeichn. d. vorrath. Form.	No.	
P.	1j.	184. Alexandrine Douillard. * Oct.—Nov.
P. S.	1j.	877. America, **† Nov.—Dec.
P.	1j.	266. Andenken an Bouvier, *† Ende Oct.—Nov.
H. M. P.	1j.	768. " „ den Congress, (Souvenir du Congrès), ** Aug.—Sept., Fr. s. gr., auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe, Fl. weiss, saftreich, hlb. schm., fein parfümirt, Dauer der Frucht 5—6 Wochen.
S.		712. Angélique Leclerc.
H. M. P.	1j.	235. Angevine, Schöne-, (Belle Angevine), † Dec.—Jan., Fr. gr., Fl. abknackend, Baum kräftig und fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.
H.		701. Anna Audusson. * bis ** Oct.—Nov., zieml. gr.
H. M. P.	1j.	23. Annabirne, **† Aug., Fr. mgr., schm.; Baum kräftig und reichtragend.
H. M.	1j.	10. Apothekerbirne, Winter-, (Winter-Gutechristbirne), † Decbr.—März, gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.
H. M. P.	1j.	773. Augustbirne, Diel's-, *†† Anf.—Ende Aug., mgr.
H. M. P.		46. Baronsbirne , †† Jan.—April, Fr. gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack, wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft und trägt sehr reich.
H. M. P.	1j.	850. Bergamotte, Arsène Sannier-, mgr., Fl. fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
H. M. P. S. C.	1j.	81. " Deutsche National-, (Belle et Bonne), **† Octbr. Fr. gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und teigl., muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.
H.	P.	407. " Donauer's-, *† M.—E. Oct., mgr.
H. M. P. S. C.	1j.	122. " Esperen's-, (Bergamotte d'Esperen), ** März—Mai, Fl. schmelzend, stark gewürzt; Baum pyramidal.
H. M.		67. " Hertrich-, ** Jan.—Mai.
H. M.	1j.	824. " Lübecker, Sommer-, **† Sept.—Oct., Fl. fein, von bestem Geschmack.
H. M. P.		250. " Poiteau-, **†† Herbst, Fr. ausserordentlich schmelzend, fein gezuckert.
H. M. P.	1j.	68. " Rothe -, *†† Anf. Oct. 3 Wochen, für alle Lagen empfehlenswerth.
P. S.	1j.	851. Beurré amande, mgr., zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, nach Mandeln schmeckend, reift im November.
P.	1j.	852. " Henri Coureelle, mgr., graugrün, Fl. sehr fein, von ganz eigenthümlichem, ausgezeichneten Geschmack.
P.	1j.	733. " Oudinot.
H. M. P.	1j.	879. Brockworth-Park, Nov.—Dec. schöne und gute Birne aus England.
H. M. P. S. C.	1j.	158. Butterbirne, Amanlis -, (Beurré d'Amanlis), *† Spt. Fr. gr., feinschmeckend, Baum treibt kräftig und trägt reichlich.
H. M. P.	1j.	284. " Bachelier's -, ** Oct.—Nov. S. schätzenswerthe feine Tafelfrucht.
H. M. P. S. C.	1j.	59. " Blumenbach's -, (Soldat Laboureur), **† Nov., Fr. gr. u. schmelzend; Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.
H. M. P. S.	1j.	47. " Clairgeau's -, (Beurré Clairgeau), **† Nov., zuweilen bis Jan. Fr. gr. von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.
H. M. P. S.	1j.	4. " Coloma's Herbst -, (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste), **† Oct. Fr. mgr., saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist besonders für Pyramiden zu empfehlen.
H. M. P. S. C.	1j.	25. " Diel's -, (Beurré Diel), **† Ende Nov.—Decbr., sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagt von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen.“
H.	1j.	39. " Englische Sommer-, **† M.—Ende Sept.
P.	1j.	779. " Februar-, ** Frühjahr.
H. M. P. S.	1j.	77. " Gellert's -, (Beurré Hardy), ** Oct., mgr. schm.
H. M. P. S.	1j.	118. " Ghélin's-, (Beurré Ghélin), **† Nov.; Fr. mgr. von delikatem Geschmack.
H. M. P.	1j.	100. " Giffard's-, ** Juli—Aug. Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. und angenehm süss; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaften Boden.
H. M.	1j.	602. " Graue Herbst-, (Beurré gris), **† Oct., eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliegend butterhaft mit feiner Muscatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden, wird leicht krank.

Birnen.

Bezeichn. d. vorrätb. Form.	No.	
H. M. P.	1j.	2. Butterbirne, Grumkower- , (Grumkower Winterbirne), **† Nov. Fr. gr., saftig und angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen, auch für Alleen geeignet.
H. M. P. S. C.	1j.	8. Hardenpont's Winter- , (Hardenpont d'hiver, Beurré d'Hardenpont). **† Novbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten nahrhaften Boden.
H. M. P. S.	1j.	220. Hochfeine- , (Beurré superfine), *†† Oct.—Nov.; mgr., butterhaft, fein gewürzt.
H. M. P. S.	1j.	76. Holzfarbige- , (Fondante des bois), **†† Oct. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.
P. S.	1j.	704. Konning's- , (Beurré de Konning), ** A.—E. Oct.
H. M. P. S. C.	1j.	7. Liegel's Winter- , (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne), **†† Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
H. M. P. S.	1j.	49. Knight's Herbst- .
	1j.	560. Millet's- , (nicht = Millot de Nancy).
H. M. P.	1j.	5. Napoléon's- , (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon), **†† Ende Oct.—Nov., Fr. mgr., sehr saftig, von erhabenem Geschmack. Baum ist ausserordentlich fruchtbar und zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
P.		649. Paridan's- , ** Nov.
P.		673. Robert's- , **† E. Oct.
H. M. P.	1j.	267. Six's- , ** Novbr.—Decbr.
H. M. P.	1j.	149. Sterkmans- , (Beurré Sterkmans), ** Novbr.—Jan.; mgr., saftreich, von gewürztem, weinigen Zuckergeschmack; Wuchs kräftig.
	1j.	121. Van Mons- , (Poire Van Mons), **† II., gr., stark rothbraun berostet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume und warme Lagen geeignet.
P.		431. von Montgeron- , * E. Sept.—Oct.
H. M. P.	1j.	1. Weisse Herbst- , (Beurré blanc), **†† Oct., Fr. gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden.
H. M. P.		91. Weisse Sommer- , (Beurré blanc d'été), **† E. Sept.—Oct.
H. M. P.	1j.	3. Capiaumont- , (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Carthäuserin), **†† Octbr., Fr. mgr. und sehr wohlgeschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
P.		230. Charles de Basiner- .
P.		221. Charlotte von Eruwer- , ** Octbr.—Novbr., ist als gute Tafel- und Haus- haltungsfrucht zu empfehlen.
H. M. P. S. C.	1j.	41. Christbirne, Williams'- , (Bonchrétien Williams Bartlett), **† Sept., Fr. gr., s. feinschm.; Baum bleibt in jed. Bod. ges. u. liefert reiche Ernten.
H. M. P. S.	1j.	181. Colmar Arenberg's- , **†† Nov., gr., citronengelb, schmelzend, delicat; besonders für leichten nahrhaften Boden und als Formbaum passend.
P.		686. Delahant's- , * Dec.—März.
H. M. P.	1j.	441. Comperette- , **†† Herbst, Fl. sehr butterhaft, von herrl. Zimmetgeschmack.
H. M. P.	1j.	873. Comtesse Clara Frijs- , Sept., neue und vorzügliche Tafelbirne aus Dänemark; Baum sehr kräftig, dauerhaft und tragbar.
H. M.	1j.	919. Confesselsbirne, Rothe- , (Isambert), November, Fleisch mattweis bis gelblich, saftreich, schmelzend, von fein weinigezuckertem, alantartigen delic. Geschmack. Baum ges. u. kräft., auch im Sandboden sehr fruchtbar.
H. M. P.		74. Crasanne , (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne), **† Oct.—Nov., Fr. platt, Fl. butterhaft von delic., feinsäuerl. Geschmack; Wuchs kräftig.
H. M. P.		167. Neue , (Surpasse Cras.), * E. Oct. 3 Wochen.
H.		448. Dechantsbirne, Defai's- , ** Oct.
P.		150. Goubault's- , * Nov.—März, Fl. fest doch schm., von gewürzreichem weinigen Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.
H. M.		70. Jamin's- .
H. M. P.	1j.	829. Juli- , (Doyenné de juillet), ** Ende Juli.
H. M. P.	1j.	65. rothe- , **†† Herbst, eine der schätzenswerthesten Tafelfrüchte von köstlichem zuckerartigen Geschmack, gewürzhafter als bei der weissen Herbstbutterbirne. Selbst in ungünstigen Sommern bildet dieselbe sich vollkommen aus.

19

Birnen.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P.	1j.	12. Dechantsbirne, Schmidt's Sommer.
H. M. P. S.	1j.	" Vereins- , (Doyenné du Comice), ** Oct.—Nov.
P. S.	1j.	" von Alençon, **†† Nov.—März, Fl. zimmetartig süß, von bergamott-artigem Geschm. Sehr fruchtbar, darf nicht zu spät gebrochen werden.
H. M. P.	19.	" Winter- , (Pastorale, Doyenné d'hiver, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne), **†† Dec.—März, Fr. gr., saftig, von Muskateller-geschm. Anf. Oct. zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
P.	572.	Delvigne, (? — Kampervenus).
P.	222.	Dix (Madame Dix) * Oct.
P.	1j.	744. Doyenné crotté (= Graue oder Beschmutzte Dechantsbirne).
H. M.	796.	Eierbirne, Sommer, *†† S.
H. M.	331.	" Woltmann's, *†† Aug.
H. M.	88.	Eifersüchtige, Französische, ** Oct.—Nov., Fl. fein, saftreich, angenehm, weinigsüß mit viel Gewürz. Baum für alle Lagen brauchbar.
P.	806.	Enghien, *† S.
M.	248.	Erzbischof von Hons. ** M. E. Aug.
H. M. P.	1j.	136. Esperine , * Ende October, schätzbare Tafelfrucht.
H. M.	1j.	766. Feigenbirne, Holländische, **† Ende September.
P. S.	1j.	168. " von Alençon, * bis ** Nov.—Dec.
H. M. P.	1j.	20. Flaschenbirne, Bosc's, (Beurré d'Appremont, Calabasse Bosc), **†† Oct.—Nov., Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten warmen Boden.
M.	72.	Fleur de neige, Nov., sehr schön gefärbt.
M.	854.	Fondante des emmurées, M. Sept., mgr., hellgelb, schmelzend parfümirt.
H. M. P. S.	6.	Forellenbirne , (Poire Truité), **†† Nov.—Jan., Fr. mgr. und sehr schätz-bar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vor-zügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
H. M. P.	147.	Fulvie, Neue, ** Nov.—Jan., Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
H. M.	64.	Gaishirtenbirne, Stuttgarter- , (Langgestielte Stuttgarter Russet), **†† Aug., Fl. butterhaft, vollsaftig mit zimmetartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen, Baum pyramidal, reichtragend.
H. M.	1j.	73. General Toffen, ** Dec.—Febr., Fr. sehr gross, saftreich.
H. M. P.	1j.	877. Graf Moltke, **† Oct., sehr grosse, edle Birne, zimmetgelb mit feinem Rost überdeckt. Baum sehr tragbar.
H. M. P.	1j.	970. Grünbirne, Späte-, ** Sept.—Oct., sehr gute Wirthschaftsbirne zum Kochen und Backen.
H. M. P. S. C.	1j.	14. Gute Graue , (Sommer Beurré gris, Schöne Gabriele), **††† Sept., Fr. kl. von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
H. M. P.	1j.	875. Gute Louise, Späte-, Jan.—April, Fr. ziemlich gr., von guter Qualität, Baum sehr fruchtbar, verlangt warmen Boden.
H. M. P. S. C.	1j.	139. Gute Louise von Avranches , (Louise honne d'Avranches), ** Sept.—Oct., Fr. gr., sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittel-stark und ist sehr fruchtbar, verdient im Grossen angepflanzt zu werden. Unempfindlich gegen strenge Kälte.
H. M.	584.	Hasenkopf, Rother, †† W.—F.
M.	586.	Henriette Bonvier, ** Nov.—Jan.
H. M. P. S. C.	1j.	43. Herrenbirne, Esperen's- , (Seigneur d'Esperen, Oberdick's Butterb.), **† Sept.—Oct., Fr. mgr., delikat schmeckend, Baum wächst schön pyra-midal, rasch und gesund, wird früh tragbar.
H. M. P. S.	1j.	128. Herzogin von Angoulême , (Duchesse d'Angoulême), ** Nov.—Dec., sehr gross , butterhaft, v. süßem zimmetartig gewürzten Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren und an jungen Bäumen oft grobkörnig.
H. M. P. S.	1j.	450. Herzog von Nemours, ** Oct.—Nov.
H. M. P.	1j.	874. Himmelfahrtsbirne, (de l'Assomption), Aug., gr., neu und vortrefflich, Baum trägt bald und reich.
H. M. P. S.	1j.	154. Hofrathsbirne , (Conseiller de la cour), ** Oct.—Nov., mgr.; eine ausge-zeichnete Tafelfrucht.
H. M.	868.	Honigbirne, Ostpreussische, *††† Aug.—Sept., eine mgr., in Ostpreussen sehr verbreitete Birne. Baum sehr starkwüchsig und winterhart.
M.	108.	Houx de Fortune ††.
H. P.	257.	Howell, * M. Octbr. mgr. Fl., gelblich weiss mit gewürzreichem, nicht zu süßem Geschmack. Baum starkwüchsig.

Birnen.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H. M. P. S. 1j.	38.	Hoyerswerdaer. Grüne, **†† Aug.—Sept., Fr. mgr., Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
H. M. 346.		Jacobsbirne, Hannoversche- †† Aug., sehr reichtragend.
M. 45.		Jaminette, † W.
P. S. 1j.	253.	J. J. Gilain, ** Sept.—Dec., sehr gross.
H. M. P. S. 1j.	153.	Josephine von Mecheln, ** Jan.—März, Fl. fein saftreich, wenig süsser, schwach gewürzter Geschmack.
P. S. 1j.	112.	Jules de Liron d'Airoles, (Léon Leclerc), **† Fr. mgr., von ausgesucht feinem Geschmack.
H. P. 604.		Martin, (Martin Sire), † Jan.—Febr.
H. M. 22		Kampervenus, (Kamper Peer), †† Nov.—Febr., mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich und kommt in jedem Boden fort.
H. M. 9.		Katzenkopf, Grosser- , (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac), †† Nov.—Mai, Fr. sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.
H. M. 82.		Kleyenower, *† M. Aug., 3 Wochen, mgr., muskatellerartig, in Pommern vielfach zum Einmachen benutzt. Baum sehr starkwüchsig und hart.
H. M. P. 1j.	969.	Knausbirne, †† Sept., ausgezeichnete Backbirne
H. M. P. 1j.	104.	Königin der Birnen, (Reine des poires), ** Oct.—Dec., mgr., saftreich, etwas körnig, halbschmelzend, von angenehm gewürztem Zuckergeschmack.
H. M. P. S. 1j.	16.	Köstliche von Charneu, (Paire Legipont, Merveille de Charneu, Delices de Charneu), **† Oct.—Nov., Frucht gr. u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen, nährhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet
H. M. 21.		Kuhfuss, †† Sept., Frucht gross, für den Haushalt schätzbar und die beste Birne zum Backen. Baum wächst sehr stark, wird gross und alt, gedeiht in schwerem und leichtem Boden.
P. 1j.	750.	Laherand.
H. M. P. 61.		Leckerbissen, Hardenpont's-, (Délices d'Hardenpont). **† Oct., Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.
H. M. P. S. C. 1j.	127.	„ von Jodoigne, (Délices de Jodoigne), **† E. Sept.—Oct., Fr. mgr., schmelzend und gezuckert.
H. M. P. 1j.	116.	Léon Grégoire, ** Dec.—Jan., vorzügliche Tafelbirne. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. M. P. 1j.	881.	Liebling, Morel's-, Nov., gr., I. Qual., Baum sehr kräftig und fruchtbar.
M. P. 881.		Louis Dupont, (hier nicht Coloma's Butterb.).
S. 855.		Louise-bonne Sannier, Jan.—Febr., später als die „Gute Louise von Avranches“, sonst ebenso schön und gut.
H. M. P. S. 1j.	866.	Lucy Grieve, Oct., gr., citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich und schmelzend.
P. 106.		Madame Elisa, ** Oct.—Nov., Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
H. M. P. 1j.	942.	(249.) „ Treyve, **† Sept., früh- und reichtragend, delicate Frucht, die selbst in trockenem Boden an Fülle und Süssigkeit des Saftes der „Köstlichen von Charneu“ gleich steht.
H. M. P. S. C. 1j.	29.	Magdalene, Grüne-, (Grüne Margarethenbirne), **† Juli, wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.
H. M. P. S. 1j.	109.	Maihirne, de Jonghe's-, **† Mai, eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.
H. M. 871.		„ Schmidtman's-.
H. M. P. 1j.	924.	(801.) Marie Luise, (Duquesne), **† Oct.—Nov., Fr. gr. u. delicat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas empfindlich.
H. M. P. 1j.	92.	Markgräfin, (Marquise d'hiver), **† A. Nov.
H. 892.		Marotte, (? = Regentin).
H. M. 1j.	979.	Mangelbirne.
H. M. 1j.	878.	Marschall Vaillant, Jan.—März, gr., und der Diel's Butterbirne ähnlich, fein schmelzend; Baum sehr kräftig und fruchtbar. Vortrefflich!
P. 658.		Mary von Borchers.
H. M. P. 1j.	490.	Melonenbirne, Hellmann's- , **† Herbst—Winter.
H. M. P. 1j.	834.	Meuris, Winter-, (Nec plus Meuris), ** W.
P. 491.		Millot von Nancy, *† H.
H. M. P. S. 1j.	102.	Mundnetzbirne, Runde- , **† Ende Aug.
H. M. 26.		Muskateller, **† vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.
H. M. P. S. 857.		„ Französische-, *† S.

Birnen.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H. M. P. S. 1j.	18.	Nelis, Winter- , (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines). ** Dec.—Jan., Fr. mgr., schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.
H. M. P. 1j.	361.	Nina, (Butterbirne von Yelles), ** Aug., als Tafelfrucht sehr schätzbar.
H. M. P. S. 1j.	180.	Pastorenbirne, (schöne Andrine), *† Nov.—Febr., sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.
H. P. 1j.	767.	Pennsylvania, A. Oct., ziemlich gross.
H. M. 1j.	959.	Petersbirne, Aug., sehr gute sächsische Localsorte.
H. M. 1j.	870.	Pfalzgräfin, Kleine-, *†† M. Sept., sehr gute Marktf Frucht, in der Gegend von Meiningen ausserordentlich beliebt; starkwüchsig.
H. M. 1j.	503.	Pfundbirne, Grüne-, †† A., Oct.
H. M. P. S. C. 1j.	69.	Philipp Goes, (Baronne de Mello) , ** Oct.—Dec., Fr. mgr., von gewürzreichem Geschmack, Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.
H. M. P. S. 1j.	177.	Philippsbirne, Doppelte-, (nicht — Beurré de Mérode), Double Philippe, ** Oct., Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.
H. M. P. S. 1j.	57.	Poiteau, Neue- , ** Oct.—Nov., Fr. gr., delik特; auch für nördlichere Gegenden.
H. M. P. 1j.	611.	Pommeranzenbirne, Winter-
H. M. P. S. 1j.	245.	Präsident Müller.
H. M. P. S. 1j.	246.	" Royer.
H. M. P. S. 1j.	244.	" d'Osmonville, ** Nov.—Dec., Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
H. M. P. S. 1j.	887.	" Drouard, März—Mai, gr. bis sehr gr., allerbesten Qualität und sehr fruchtbar; Baum starkwüchsig auf Wildling wie auf Quitte.
H. M. P. S. 1j.	111.	Prince impérial de France, ** Oct. Fr. gr., s. gut, s. tragbar.
H. M. P. 1j.	141.	Prinzessin Marianne, **† H.
H. M. P. 1j.	247.	Professor Henau.
H. M. P. 1j.	941.	Queenbirne , ††, Nov.—Apr., gute Wirthschaftsfrucht. Baum bildet schöne Kronen.
H. M. P. 1j.	17.	Regentin , (Passe Colmar, Colmar souverain), **† Dec.—Febr., Fr. gr., schätzenswerthe Winterbirne, Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.
H. M. P. 1j.	75.	Rettigbirne, Leipziger-, *†† E. Aug.—M. Sept.
H. M. P. 1j.	78.	Rietbirne, Grosse-, † gr., E. Sept.
H. M. P. 1j.	971.	Rommelster, Grosse-, †† Oct., eine der besten Most- und Wirthschaftsbirnen.
H. M. P. 1j.	279.	Rostiezer, **† Aug.—Sept.
H. M. P. 1j.	613.	Rouse Lench, * W., kreiselförmig, sehr reichtragend.
H. M. P. 1j.	507.	Russelet, Bivort's-, ** Oct.—Nov.
H. M. P. 1j.	759.	" Van der Wecken-, ** Oct.—Nov.
H. M. P. 1j.	614.	" Winter-
H. M. P. 1j.	156.	St. Germain, (St. Germain d'hiver), **† Nov.—Jan., Fr. gr., von angenehm erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.
H. M. P. S. 1j.	24.	Schmalzbirne, Römische-, (Tafelbirne, Beurré romain), **†† Aug.—Sept., Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross und trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
H. M. P. 1j.	522.	Schwesterbirne , (deux soeurs), ** Oct.—Nov.
H. M. P. 1j.	35.	Seckelsbirne , **† Oct., eine der besten Tafelfrüchte. Baum trägt gern und sehr reichlich.
H. M. P. 1j.	698.	Siebenbürgerin, (Transsylvanienne), * Sept.
H. M. P. 1j.	620.	Sœur Grégoire.
H. M. P. 1j.	377.	Sommerbirne, Grosse britische-, *† Sept.—Oct.
H. M. P. 1j.	381.	" Zartschalige-, *†† Aug. 14 Tage.
H. M. P. S. 1j.	13.	Sommerdorn, Punktirter- , (Epine d'été), **†† Sept., Fr. mgr. und delik特; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
H. M. P. S. 1j.	856.	Souvenir de Sannier père, Oct., mgr., dunkelgelb mit rosa geflammt, herrliche und feine Frucht.
H. M. P. S. C. 1j.	29.	Späte von Toulouse, (Tardive de Toulouse, Duchesse d'hiver), **† März—April, Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüten sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte. Reift nur in sehr warmer Lage.
H. M. P. 1j.	922.	Sparbirne, **† Aug., (Franzmadame). Schätzbare frühe Tafel- und Marktf Frucht.

Birnen. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten

Bezeichn. d. vorrätth. Form.	No.	
H. M. 1 j.	40.	Sylvester, Herbst-, (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Württemberg, König von Württemberg), **† Oct., Frucht gr., eine feine Tafelbirne. Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.
H. M. P. M.	11. 524.	Tafelbirne, grüne- , (Fürstliche Tafelbirne), **†† S. Theodor van Mons, *† Oct.—Nov.
H. M. P. S. 1 j.	255.	Thompson, **† Oct.—Nov., Fl. delikate süssweinig; Baum v. mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.
H. M. P. C. 1 j.	87	Tongres, Birne von-, (Poire de Tongres), **† Oct.—Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssem Geschmack und schmelzendem Fl.; gr.
H. M. P. S. 1 j.	137.	Triumph von Jodoigne, ** Nov.—Dec., Fr. gr., vortrefflich.
H. 762.		Tygrée Janvier.
P. 718.		Victoria.
H. M. P. 1 j.	94.	Virgouleuse, ** oder *† W.
H. M. 79.		Volkmarser, *†† E. Sept.—Oct.
H. M. P. 1 j.	84.	Wildling von Montigny, (Besi de Montigny), ** Oct., Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.
H. M. P. S. C. 1 j.	15	" von Molte, (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte), **† Octbr.—Novbr., Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
P. 758.		Winterbirne, Königliche-, (Royale d'hiver), †—* Nov.—Dec.
M. 638.		Schönste-, † Dec.—März.
H. M. P. 1 j.	103.	Zéphirine Grégoire **†† Nov.—Jan., delikate Tafelfrucht.
P. S. 1 j.	309.	Zuckerbirne, Heyer's-, *†† Sept.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

<i>Einjährige Veredlungen</i>	(in den mit 1 j. bezeichneten Sorten)	p. Stück M. 1,—
<i>Pyramiden oder 2—3jähr. Veredlungen</i>	" " " P. " ")	" " 1,50
<i>Spaliere</i>	" " " S. " ")	" " 2,—
<i>Mittelstämme</i>	" " " M. " ")	" " 1,75
<i>Hochstämme</i>	" " " H. " ")	" " 2,50

Bezeichn. d. vorrätth. Form.	No.	
H. M. 1 j.	988	Abbé Fétel. **† Octbr.—Novbr. Sehr lange Fr., lebhaft roth, starkwüchsig.
H. M.	891.	Alexandrine Mas, Febr.—März, gr., I. Qual., Form wie „William's Christbirne“, Baum starkwüchsig.
H.	931.	Anne de Bretagne, Nov.—Jan., mgr.—gr.; schön gefärbt, Fleisch schmelzend, pikant gewürzt; allererster Qual.
H. M. P. 1 j.	932.	Armand Morel, März—April, diese ausgezeichnete, stets zarte und schmelzende Frucht ähnelt in Geschmack und Consistenz d. Fleisches d. Hardenpont's Butterb. Baum starkwüchsig, sehr fruchtbar.
H. M. P. 1 j.	961.	Auguste Droche, Jan.—März, sehr schöne Fr., fein schmelzend.
H. M. 889.		Belle des abrés.
H. M. 888.		" de Beaufort.
H. M. 893.		" d'Ecully, Sept., gross.
H. M. P. 1 j.	908.	" de juillet, M. Juli, vortreffliche frühe Birne.
H. M. 1 j.	989.	" William. ** Febr. Sehr gute und grosse Tafelfrucht.
H. M. 1 j.	933.	Bergamotte tardive Collette, März—Mai, I. Qual., stammt von der Dechantsbirne von Alençon.
H. M. 1 j.	918.	Beurré Chabocau.
H. M. 960.		" Chaudy. ** Oct.—Dec., s. gr., Fleisch s. fein schmelzend.
H. M. 1 j.	981.	" de Mérode, Oct., sehr gross.
M. 1 j.	991.	" de Mortillet. ** M. Aug. oder A. Sept. Fr. 400—500 Gramm schwer.
H. M. P. S. 899.		" Hugé, Frucht mittelgross, schmelzend, saftreich, allerersten Ranges.
H. M. P. 1 j.	934.	" perpétuel, Sept., mgr., Fl. fein und schmelzend, soll stets zweimal blühen; zweite Frucht jedoch nicht so vollkommen wie die erste.
H. M. P. 894.		" Bijou, Aug.—Sept., s. schön gefärbt.
P. 1 j.	944.	" Bonchrétien Frédéric Baudry, Febr.—März, mgr., fein gewürzt und gezuckert, I. Qual.
H. 1 j.	980.	" Bon Vicaire. Sehr gute Tafelbirne, ähnlich der Guten Louise von Avranches.
H. 1 j.	945.	" British Queen, **† Oct.—Nov. allerersten Ranges.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Birnen. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.


Bezeichn. d. vorrath. Form.	No.	
H.	1j. 987.	Butterbirne, Ahlmann's- , † mgr., E. Oct. Fl. ganz schmelzend. Vorzüglich für exponirte Lagen. Sehr reichtragend. (Dänische Sorte.)
H. M. P.	1j. 927.	" Dilly's- , Oct., Fr. gr., Fleisch fein butterhaft, von s. gewürzreich weinartigem Zuckergeschmack.
H. M. P.	1j. 928.	" Dumont's- , ** Octbr., Fr. gr., fein, gleichfalls sehr gewürzhaft und süß.
H. M. P.	1j. 968.	" van Geerts- , **† Oct., Fleisch gelblich, fein, saftreich, schmelzend. Wuchs rasch und schön pyramidal.
H. M. P.	1j. 966.	" von Alagér- , schwarze , eine neue aus Persien erhaltene Sorte.
H. M. P.	1j. 935.	Calixte Mignot , ** Oct.—Nov., Fr. gr., schmelzend.
H. M.	903.	Charles Delatin , Nov., kegelförmig, dunkelgelbgrün, heller marmorirt und punktirt; schmelzend, saftreich, gezuckert, delikat. Allerersten Ranges!
H. M. P.	1j. 909.	Chaumontel d'été , Aug., gr.—s. gr., dunkelgrün mit braun, an der Sonnenseite dunkelroth; Fl. schmelzend, saftig gezuckert, angenehm parfümirt. Sehr fruchtbar.
H. M. P. S	906.	Chevalier Evrard , Nov., grün, in völliger Reife goldgelb, rostfarbig punktirt und marmorirt; saftreich, butterhaft, von ausgezeichnetem Gewürz.
H. M.	880.	Claude Blanchet , Juli, kl.—mgr.; gute, reichtragende Frühbirne.
H. M. P.	905.	Conseiller Pardon .
H. M.	895.	Courte queue d'hiver , Ende Winter, gr. oder s. gr., rundl.-oval, von sehr guter Qualität. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. P.	1j. 946.	Curé Carnoy , Dec., mgr., schmelzend, von sehr fein gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. P.	1j. 936.	Délices d'Avril , April, mgr., schmelzend, fein gezuckert und saftig; ausgezeichnete Qual.
H.	1j. 1025.	Directeur Alphonse , Febr.—Apr. Fr. sehr gross. Fl. fest, sehr fein von angenehm aromatischem Geschmack. Gehört zu den feinsten und schönsten Tafelfrüchten.
M.	1j. 994.	Docteur Bourgeois , Nov.—Dec.; mgr.
H. M. P.	963.	" Reeder , Nov., mgr.
H.	1j. 973.	Doctor Lucas , H. s. schön und gut. Sehr saftreich und von vorzüglichem Geschmack.
M.	1j. 995.	Donatienne Bureau , **†† Oct.—Jan. Sehr vorzügliche Frucht. Starkwüchsig.
H. M. P.	1j. 900.	Dorothée Coureur , Oct.—Jan.; mgr., saftreich, I. Qual.
M.	1j. 997.	Doyenné Rahard , Dec.—Jan. Fr. gr. sehr süß und tragbar.
H. M. P. S.	1j. 910.	Du Canada .
H.	1j. 985.	Duchesse Grousset , **†† Dec.
H. M.	1j. 977.	" Pitmaston , **†† Oct.—Nov. Sehr grosse Frucht. Mit sehr erfrischendem, leicht süß weinsäuerlichem Geschmack, tragbar.
H. M. P.	937.	Fertility , ein Sämling von Goubault's Butterb., Frucht grösser und besserer Qualität als die letztere. Auf Quitte sehr starkwüchsig und reichtragend.
H. M. P.	1j. 957.	Frederick Clapp , eine neue amerikanische Sorte; M. Oct.—A. Nov., mgr.—gr., citronengelb, sehr saftig und schmelzend, von erfrischendem, reich aromatischen Geschmack; wird als von vorzüglicher Qualität empfohlen.
H. M. P.	1j. 925.	Fromental .
H. M.	1j. 928.	Général Thouvenin , mgr., Dec, Fl. fein schmelzend, stark gezuckert. Von angenehmem Geruch.
M.	860.	Gulabi , buttrige, { Nebenstehende 3 Sorten erhielt ich mit guter Em-
M.	861.	" späte, { pfehlung aus Persien.
M.	862.	" Wandami- , {
H. M.	1j. 999.	Henry Decaisne , Sept.—Oct. Vorzügliche Tafelfrucht.
H. M. P.	1j. 958.	Hoosie , Oct. Fr. gr., gleich einer Diel's Butterb., Fl. fein schmelzend, s. saftig, eine der besten Einführungen aus Amerika.
H. M. P.	1j. 948.	Ingenieur Wolters , **! October, Frucht allererster Qual.
H. M. P. S.	1j. 896.	Jonas d'hiver , Winter, aus Ost-Tennessee. Gross, braun, länglich; ausgezeichnete Qualität.
H. M. P.	1j. 955.	Jones , Jan, mgr., Fleisch butterhaft, süß und saftig. Baum starkwüchsig, pyramidal. Eine auf den Märkten von Philadelphia und Boston sehr gesuchte und theuer bezahlte Frucht.
H. M. P.	915.	König Christian , Oct.—Nov., gr., Fl. gelb, schmelzend, von angenehm süß-säuerlichem Geschmack, I. Qual. Baum sehr fruchtbar, starkwüchsig, schöne Pyramiden bildend.

Birnen. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Bezeichn. d. vorrath. Form.	No.	
H. M. P. S.	1j. 907.	Köstliche von Srijan , diese neue Birne erhielt ich vom Baumschulbesitzer Rosenthal in Wien, der sie mit ganz besonderer Empfehlung in den Handel gab. Frucht mgr., December.
H. M. P.	956.	Lawrence , W.
M.	1j. 1001.	Le Conte , Juli—Aug. Von kräftig pyramidalem Wuchse. Sehr fruchtbar, beste amerikanische Marktfrucht.
H. M.	938.	Lehou-Grignon , ** Febr.—April, gr. einer Vereins-Dechantsbirne ähnlich.
H. M.	1j. 1001.	Louis Cappe , **† Dec.—Jan. Sehr delikate Fr. Baum trägt früh und reich.
H. M.	1j. 972.	Madame Hutin , ** mgr. W.
	1j. 1004.	„ Lyé Ballet , **† Dec.—Febr. Geschmack einer Dechantsbirne ähnlich.
H. M. P. S.	911.	Mademoiselle Blanche Sannier , Oct., gr., länglichkegelförmig, fein, schmelzend. Baum sehr starkwüchsig.
H. M. P.	897.	„ Solange , Eine der frühesten Birnen.
M. P.	871.	Maibirne, Schmidtman's - W.
	952.	Manning's Elizabeth , Sommer, Fr. mgr., Fl. saftig und schmelzend.
H. M. P.	902.	Monseigneur Gravez , Nov.—Febr., mgr. oder gr., sehr schmelzend und saftig, von herrlichem Gewürz.
M.	1j. 1005.	Notaire Lepin , E. Jan.—Mai. Fr. sehr gross, unregelmässig. Schmelzend und gezuckert, fruchtbar.
H. M. P. S.	1j. 930.	Olivier de Serres , **† Febr.—März, mgr., s. gut, Fleisch schmelzend, fein gewürzt, riechend.
H. M. P.	920.	Pfingstbirne, Heicke's -.
H. M. P.	1j. 901.	Philippe Couvreur , Winter, mgr., saftig, schmelzend, I. Qualität.
H.	1j. 1006.	Président Barabé , Jan.—März, mgr., Fl. fein gezuckert und schmelzend. Für jede Form geeignet.
H.	1j. 1007.	„ Delacour .
H. M. P.	912.	„ d'Estaintot , ausserordentlich fruchtbar, I. Qualität, Frucht in Büscheln, Sämling von Blumenbach's Butterb.
H. M. P.	913.	„ Pouyer-Quertier .
H. M. P. S.	1j. 290.	Minister Dr. Lucius , (Späth), **†† Oct.—Nov., ausserordentlich grosse und sehr schöne Frucht von vorzüglichem feinem Geschmack. Muss zeitig gepflückt werden. Baum sehr fruchtbar. Im Dorfe Grubna in Sachsen aus Samen gezogen. (Siehe Illustration.)
H. M. P.	1j. 882.	Prinz Waldemar , Oct.—Dec., ziemlich gr., längl., grünl.-weiss, leicht gelb gezeichnet, Fl. ausserordentlich schmelzend, von fein gezuckelter Säure.
M.	1j. 1008.	Professeur Delaville , **† Jan.—Mai. Fr. mgr., Fl. fein gezuckert und parfümirt. Fruchtbar.
H. M. P.	914.	Prud'homme , Sept.—Dec., ähnlich der guten Louise von Avranches, fruchtbar und starkwüchsig.
H. M. P.	939.	Reine des vergers , grosse, schöne Frucht, ähnlich der Dechantsbirne von Mérode; in Büscheln und sehr reichtragend. Gedeiht nicht auf Quitte.
H. M. P.	923.	Rothfleischige , **† A. Sept. S. Fleisch blutroth.
H. M.	964.	Sabine Vermorel , Sept.—Dec. Fr. kl., saftig, schmelzend, zuckerartig mit etwas Säure.
H. M. P.	1j. 940.	Saint Swithin , Juli, sehr frühe Sorte von der Calabasse Tougard abstammend; mgr., saftig, fein gewürzt. Wegen der frühen Reife und grossen Fruchtbarkeit zur Markfrucht geeignet.
H. M. P.	1j. 962.	Sarah , Oct., neue Züchtung von Fr. Clapp; mgr., Fl. fein, schmelzend und gewürzt.
H.	1j. 1009.	Secrétaire Rodin . Novbr. gr. Extra feine und saftige Tafelfrucht.
H. M. M.	1j. 954.	Sheldon , Oct.—Nov., eine nordamerikanische Sorte, grossfrüchtig, schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum starkwüchsig, schön pyramidal und reichtragend auf Wildling, auf Quitte schlecht gedeihend.
M.	1j. 1010.	Souvenir de L'Abbé Lefébvre . Novbr.—Decbr.
H. M. P.	1j. 994.	„ de l'Evêque , E. Dec., fein butterhaft mit reichlichem süss gewürzigem Saft. I. Qualität. Wuchs mittelstark, sehr fruchtbar.
H. M.	926.	„ de l'Exposition .
M.	1j. 1011.	„ de Mme Charles .
H. M. P.	1j. 965.	„ du vénérable De la Salle , Oct.—Nov., Fleisch fein, schmelzend, zuckerig, s. empfohlen.
H. M. P.	916.	Thérèse , Sept.—Oct., zieml. gr., schmelzend, von herrlichem Gewürz, allerbesten Qualität.
H. M.	872.	Triumph von Vienne , H.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Birnen.



Minister Dr. Lucius. (Späth.)

Bezeichnung d. vorst. Form	No.
P.	1j. 953.
H. M.	1j. 917.
H. M. P.	1j. 919.
H. M. P.	1j. 898.
P.	943.

Tyson, Aug., eine der feinsten Sommerbirnen.

Vicepräsident Delbée, Jan., gr., von der Form d. Passe-Crasanne. Fl. schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum fruchtbar und starkwüchsig.

Victoria, William's, E. Oct., gr., citronengelb; von Dr. Hogg, dem bekannten englischen Pomologen, als eine ausgezeichnete Frucht empfohlen.

Zoë, Dec. — Jan., sehr schöne Frucht, circa 15 cm. hoch und 6 cm. breit, dunkelgrün, braun verwaschen mit rosa Backen, zart schmelzend ohne die mindeste Spur von Herbe. Wuchs kräftig.

Zwergbirne, Grüne, (Nain vert), Oct., von zwergigem, compacten Wuchse.

Japanesische Sorten. Kaukasische Sorten. Kirschen.

Japanische Sorten.

Dieselben sind winterhart und zeichnen sich durch Grösse und Form der Blätter vor allen übrigen Sorten aus. Fr. nicht für die Tafel brauchbar.

H. P. 883. *Daimyo*. H. P. 884. *Madame v. Siebold*. H. P. 885. *Mikado*. H. P. 886. *Sieboldi*.

Kaukasische Sorten.

M. 842. *Abassi-Armud*. — M. 843. *Beg-Armud*. — M. 844. *Bildirtshin-Budi* — M. 845. *Kabach-Armud*. — M. 846. *Kal-Armud*. — M. 848. *Nar-Armud* — M. 849. *Zmernück-Armud*

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind sämmtlich in Hochstämmen abgebar; im Uebrigen in den bezeichneten Formen. M. = Mittelstämme, P. = Pyramide, S. = Spalier, 1j. = 1jährige Veredlung Die Zahl hinter dem Namen bedeutet die Reifezeit in der 1. 2. etc. Woche der Kirschenzeit.

Preise.

Hochstämmen, veredelte Süsse und Saure, sehr schöne 7—9 ctm. Stammumfang, auf 1 mtr. Höhe gemessen, Stammhöhe 1,90 mtr.
do. veredelte Süsse und Saure, sehr schöne 9—13 ctm. Stammumfang, auf 1 mtr. Höhe gemessen, Stammhöhe 1,90 mtr.
do. gewöhnliche Sauerkirschen, *Vorrath ca. 16,000 Stück*, s. schön gezogene 6—8 ctm. Ufg.
do. do. do. do. 9—12 ctm. Ufg.

Mittelstämme, veredelte Süsse und Saure
Spalierbäume, (Palmetten) von Schattensmorellen und anderen mit einer Etage.
do. do. mit 2 Etagen
do. do. mit 3 Etagen
do. do. mit 4—5 Etagen M. 3,50 bis

Pyramiden, sehr schöne tragbare (*Vorrath ca. 10,000 Stück*) M. 0,75 bis
1jähr. Veredlungen, auf Weichsel (Mahaleb)

pr. Stück M.	pr. 100 St. M.	pr. 1000 St. M.
1,25	100	900
1,50-2,50	130	1200
0,75	65	550
1,—	85	750
0,80	60	550
1,25	110	—
2,—	175	—
2,75	250	—
4,50	400	—
2,—	50—150	—
0,50	40	350

Süsskirschen.

Bez. d. vorräth. Form.	No.	Schwarze Herzkirschen.	Bez. d. vorräth. Form.	No.	
M.	1j.	9. Adler, Schwarzer, **† 1. m.	M.	192.	Herzkirsche, Werder'sche, beste, **
M.	1j.	76. Herzkirsche, Bettenburger, **†† 3. gr.	M. P. S.	2.	„ Werder'sche, frühe, **† 2. m.
M. P.	1j.	4. „ Büttner's schwarze, **† 3. gr.	M.	45.	Schöne von Marienhöhe, **† Anf. Juli. mgr.
M.		77. „ Coburger-Mai , **† 1.	M.	75.	Tarasconkirsche, (Guigne Tarascon), **† 3. m
		78. „ Engl. schwarze Kron-, 5. oder 6. kl.		5.	Tartarische, schwarze, **†† 3. gr.
M.	S. 1j.	6. „ Fromm's , **†† 3. gr.			Bunte Herzkirschen.
M. P. S.	1.	„ Frühe Mai-, **† 1. m.	M.	253.	Cheque, gr.
M.		79. „ Grosse süsse Mai-, **† 3. gr.	M.	100.	Dankelmann's Kirsche, **† 3. kl.
M.		80. „ Grosse glänzende, *† 2.—3. mgr.	M.	101.	Downtonkirsche, **† E. d. 3.
M.	1j.	3. „ Knight's , **† 2. gr.	M.	1j.	47. Eltonkirsche , **† 3. gr.
	206.	„ Königliche, **† Anf. d. 3. gr.	M.	243.	Flamentiner, **† 2. gr.
M.	1j.	7. „ Krüger's , **†† 3. gr.	M.	123.	Gouverneur Wood, **† 2. g.
M.	1j.	81. „ Neue Ochsen-, **† 4. gr.	M.	203.	Herzkirsche, Bordan's, **† 2. g.
M.	1j.	10. „ Ochsen-, **†† 3. gr.	M.	200.	„ Co's bunte, **† 2. gr.
M.		83. „ Paretzer, **†† 3. gr.	M.	S. 1j.	11. „ Früheste, bunte, ** 1. m.
M.		84. „ South's breite, * 3. m.	M.	107.	„ Glas-, ** 4. mgr
M.	1j.	8. „ Spitzen's, **†† 3. m.	P. S.	46.	„ Podiebrader, bunte, ** 4. mgr.
	85.	„ Trauben- od. Bouquet-, * 4. kl.			

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Kirschen.

Bez. d. vorrätth. Form	No.		Bez. d. vorrätth. Form	No.	
	110.	Herzkirsche, Tilgener's, **††	M.	55.	Schleihahnskirsche, **†4. gr.
M.	1j.	2. gr.	M.	218.	Schrecken's Kirsche, **†2. gr.
	216.	„ Werdersche, bunte, **†	M.	15.	Spanische schwarze, **†5. gr.
M.	12.	2. m.		201.	Walpurgiskirsche, **† Ende
		„ Winklers weisse,	M.	82.	d. 5. gr. auch sehr gr.
		**†† 2. gr.			Wildling von Kronberg, **††
M.	S. 1j.	124. Kirtlands Mammuth, **†3. gr.	M.	251.	1. 2. mgr.
		197. Kronprinz von Hannover, **	M.	207.	Wilhelm. Kleindienst, **†† 5.
M.	S.	2. gr.			Zeisbergische Kirsche, **††
M.	1j.	13. Lucienkirsche, **†3. gr.			4. s. gr.
		118. Schöne von Ohio, (Ohio			Bunte Knorpelkirschen.
		Beauty), **† 2. gr.		98.	Agathe, schöne, (Belle Agate
M.		99. Schöne von Orléans, (Belle			de Novembre), * Sept.,
M.		d'Orléans) **† 2. m.			kl. — m.
		109. Spanische, süsse, ** 3. mgr.	M.	209.	Bernsteinkirsche, frühe, **†
		Gelbe Herzkirschen.			gr. E. Aug. — A. Sept.
		139. Durchsichtige, Jahn's, *†3. kl.		120.	Bigarreau, marbré, (2 Bütt-
M.		138. Herzkirsche, gelbe, ** 3. mgr.			ner's späte rothe Knor-
		Schwarze			pelkirsche) ** 4. gr.
		Knorpelkirschen.	M.	1j.	17. Grosse Prinzessin -
M.	1j.	199. Germersdorfer, grosse,			kirsche, (Lauernaus-
		**†† 5. sehr gr.	M.	126.	kirsche), **†† 4. gr.
		88. Knorpelkirsche, frühe schw.,			Knorpelk., Büttner's
		† 2. 3. kl.			späte rothe, **† Ende
M.	16.	„ Grosse schwarze,			d. 5. gr.
		**†† 5. gr.	M.	19.	„ Drogans. weisse, **† s. gr.
M.	213.	„ Heintze's schwarze, **		69.	„ Dunkelrothe, **† 4. gr.
		5. gr.		129.	„ Hildesheimer späte, **
M.	242.	„ Lampen's schwarze, **†			Ende Aug. — Anf. Sept.
		3. gr.	M.	220.	„ Liken's bunte, ** 6. 7. m.
M.	214.	„ Leschke's schwarze, **††		130.	„ Meininger späte, *††
		5 sehr gr.			6. gr.
M.	1j.	91. „ Neapolitanische, **†5 gr.		135.	„ Punktirte, (Punkt. Süß-
M.		92. „ Purpurrothe, **†† 5. gr.			kirsche mit festem
M.		94. „ Tabor's schwarze, **2. m.			Fleisch), **† 5 m.
M.	1j.	215. „ Schneiders späte,		136.	Süsskirsche, runde
		**†† 5. sehr gr.			marmorirte, **† 4. gr.
M.	121.	„ schwarze von Mezel.	M.	134.	Gelbe Knorpelkirschen.
M.	95.	„ Winkler's schwarze, **†		132.	Knorpelk., Doenissens,
		4. gr.			gelbe, **† 5. mgr.
M.	217.	„ Muckenberger grosse,		58.	„ Drogan's gelbe, **† 5. gr.
		aus Guben, gr., spät.	M.	136.	— s. gr.
M.	23.	Muskateller, Pragische, **†		143.	„ Meissener, weisse, **
		5. gr.			5. gr.
M.	59.	„ Thränen-, **†† 4. gr.			
M.	152.	„ rothe, **†† 4. gr.			
M.	1j.	227. Riesenkirsche, Hedel-			
		finger, **†† 3. s. gr.			
		ausgezeichnet.			

(N. B. Die unter dem Namen Badasconer-Riesenkirsche verbreitete neue Sorte ist sehr kleinfrüchtig u. werthlos. Ich empfehle daher allen die Stämme davon bezogen haben, dies. mit anderen Sorten zu veredeln.)

Sauerkirschen.

Bez. d. vorrätth. Form	No.	Süssweichseln.	Bez. d. vorrätth. Form	No.	Weichseln.
M.	144.	Felgerkirsche, **†† 3. gr.		70.	Braune, Brüsseler, (Brune
M.	S.	22. Fröhkirsche, Spanische, **††			de Bruxelles), †† 6 oder
		2. mgr.			7. m.
M. P. S.	21.	Maikirsche, rothe, **†		34.	Grafenkirsche, Henneberger,
		2. gr.			**† 4. m.
	148.	Königskirsche.	M.	62.	Jerusalemkirsche, **† 5. —
M.	25.	Süssweichsel, Provencer, **†			6. gr.
		m. 5.	M. P.	1j.	74 Kirsche v. d. Natte, (Doppelte
	205.	„ von Chaux, **† 5. mgr.			Natte), **† 3. m.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Kirschen.

Bez. d. vorräth. Form.	No.		Bez. d. vorräth. Form.	No.	
M. P. S. 1j.	37.	Lothkirsche, Grosse lange (Schattenmorelle), **† 5. od. 6. gr.	M. P. S. 1j.	156.	Glaskirsche, Grosse, **† 5. gr.
M.	193.	Weichsel, Herzförmige, **† 4. mgr.	M.	249.	„ Spanische-, **† E. der 2. gr.
M.	252.	„ Impérial, gr.	M. P. S. 1j.	30.	Gobet, Grosser, (Kurzstiel, Glaskirsche, Kurzstiel, Montmorency) **†† 4. gr.
M.	35.	„ Neue engl., **†† 4. m.	M. P. S. 1j.	27.	Herzogin von Angoulême, **† 3. gr.
M. 1j.	187.	„ Ostheimer, **†† 4. m.	M. P. 1j.	175.	Herzogin v. Paluan, ** 4. mgr.
M.	168.	„ Schwarze Mai-, **†† 1. kl.	P.	235.	(228) Kaiserin Eugenie, ** 2—3 gr. purpurroth. Trägt sehr reichlich als Formbaum. Wuchs mässig.
M.	33.	„ Spanische, Früh-, **†† 2. kl.	P. S. 1j.	212.	Kirsche von Planchoury, **† 7. gr.
M.	169.	„ Strauss-, **† fast ** 2. mgr.	M. P. S.	164.	Morelle, Frühe, **† 4. gr.
M. P. S.	32.	„ SüsseFrüh-, **†† 2. kl.	P. S. 1j.	63.	„ Späteste, doppelte.
M.	195.	Weinkirsche, Grosse, **†† 4. mgr.—gr.	M.	165.	Nonnenkirsche, Grosse, **†† 5. mgr.
		Glaskirschen und Amarellen.	M.	241.	Orangenkirsche, rothe-, **†† E. d. 5. gr.
	170.	Allerheiligenkirsche, Oct.—Nov., kl.	P. S. 1j.	196.	Schöne von Brügge, **† 3.—4. mgr.
P.	172.	Amarelle, Halbgefüllte, 3. E. Juli.	M. P.	153.	„ von Chateaux, ** 6. od. 7. gr.
M. P. S. 1j.	26.	„ Königl., **†† 2. m.	M. P. 1j.	44.	„ von Choisy, ** 2. m.
M. P. S. 1j.	173.	„ Sood-, **†† 4. gr.	M. P. S. 1j.	40.	Glaskirsch-Hybriden.
M. P. S. 1j.	29.	„ Späte-, **†† 3. mgr.			Königin Hortensia, (Hybride de Laeken) ** 4. s. gr.
M. P. S. 1j.	174.	„ Süss-, **† 3. gr.			
M. P. 1j.	28.	Glaskirsche, Doppelte, **† 3. gr.			
M. P. 1j.	154.	„ Bettenburger, **† 4. gr. für Tafel und Haushalt brauchbar.			

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Hochstämme u. Pyramiden (in den mit H. u. P. bezeichneten Sorten) p. 1 St. 2 M.

Mittelstämme („ „ „ M. „ „ „) p. 1 St. 1,50 M.

1jähr. Veredlungen („ „ „ 1j. „ „ „) p. 1 St. 1 M.

Bez. d. vorräth. Form.	No.	
P.	222.	Agh Gilas, eine persische Sorte zu den bunten Herzkirschen gehörend; zeichnet sich durch besonders süsse, saftige u. zartfleischige Frucht aus.
H. M. 1j.	239.	Amarelle, kurzstielige Berliner-, **†† 2. gr. In Berlin eine sehr gesuchte Marktfucht. Reift sehr früh und eignet sich ganz besonders gut zum Einnachen.
H. M. P.	233.	Herzkirsche, Frühe von Mathère.
M.	246.	„ Tülgener's schwarze-,
M.	245.	Kirchheimer Weichsel, †† 5. mgr. Leider noch wenig bekannt. Reift spät und ist für den Haushalt ganz vorzüglich. Sehr tragbar.
H. M. P.	229.	Knorpelkirsche, Champvans.
H. M. P. 1j.	230.	„ Frühe aus der Champagne, Juni, grosse, schwarzbraune, süsse Frucht.
H. M. P.	231.	„ Frühe von Frogmore.
M.	238.	„ Matting. 2. s. gr. Dänische schwarze Knorpelkirsche. Springt nicht im Regen auf. Trägt früh und reich.
H. M.	237.	Schöne von Montreuil.
H. M. P.	232.	„ von St. Tronc, eine früh reifende, saftige Herzkirsche erster Güte.
H. M.	234.	Sparhaacks Honey, amerikanische Sorte.
H. M. P. S. 1j.	221.	Süssweichsel von Olivet, grosse frühe schwarze Weichsel, grösser und früher als die „Doppelte Nette“. I. Qual.
H. P.	236.	Toronto.
H. M. P.	226.	Wachskirsche, gelbe, ** E. 3. Fr. gr., hellgelb, saftreich, angenehm süss. Hauptsächlich für die Tafel.
M. 1j.	244.	Wilhelminenkirsche, **†† 3. Schwach glänzend dunkelbraune Herzkirsche, sehr reichtragend.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Pflaumen.

Pflaumen.

Die Buchstaben H. M. P. S. Ij. geben an, ob die Sorte als Hochstamm, Mittelstamm, Pyramide, Spalier oder 1 jährig abgebar ist.

	pr. Stück M.	pr. 100 St. M.	pr. 1000 St. M.
Hochstämme , sehr schöne, Stammhöhe, 1,90 m., Stärke 6—8 cm. auf 1 m. Höhe	1,25	100	900
do. do. do. do. do. 8—10 „ do. 1,50 bis	2,50	130	1200
Mittelstämme mit Kronen	1,—	85	800
Pyramiden 75 Pf. bis	3,—	65—250	—
Spalierbäume , Palmetten mit 1 Etage	1,25	110	—
„ „ „ 2 Etagen	2,—	175	—
„ „ „ 3 „	2,75	250	—
„ „ „ 4—5 „ 3,50 M. bis	4,50	—	—
Einjährige Veredelungen	—,60	50	—

Bez. d. vorrätig. Form.	Nr.	
H. M. P. S. Ij.	257.	Anna Späth, **†† E. Sept., diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit. (Siehe Illustration S. 30)
H. M. P. S. Ij.	291.	Admiral Rigny, *† E. Aug. Fr. gr., grün.
H.	137.	Angeline Burdett.
H. M. P.	221.	Anglesio.
H. M. P.	17.	Aprikosenartige Braunauer- , ** A. Sept., gr., gelb s. werthv., reichtragende Sorte.
H. M.	211.	Aprikosenpflaume, Frühe, ** E. Aug.—A. Sept., mgr., grünlich-gelb
H. P.	157.	„ Gelbe, ** E. Aug., mgr., gelb.
H. M. S. Ij.	34.	„ Rothe, ** A.—M. Sept., mgr., rothbunt, rund.
P. Ij.	279.	Aprikosenzwetsche, Rothe, schöne und gut lösliche Frucht mit aprikosenähnlichem Fleisch.
H. M.	245.	Blaue von Belgien, ** E. Aug., gr., schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.
H. M. S.	255.	Cochet père, **† M. Aug., Fr. s. gr., oval, goldgelb mit carmin, sehr feine und zugleich sehr schöne Frucht.
H. M. P.	193.	Columbia.
H.	194.	Damascene, Frühe Leipziger.
H.	138.	„ Lange violette, ** E. August, gr. Dunkelviolett.
P.	26.	„ Koch's späte, ** E. Sept.—Oct., mgr., goldgelb.
H. M. P.	93.	Dattelszwetsche, Grosse gelbe, * E. Sept.—Oct., gr., für warme Lagen.
H.	69.	„ Violette, fast ** M. Sept., mgr., s. lang, blau, sehr reichtragend.
H. P.	60.	Decaisne's Pflaume, (Prune Decaisne), **† gr. gelblich, M. Sept.
H.	218.	Denniston's Superbe, ** mgr. E. Aug.
P. S.	109.	Diamantpflaume, **†† A. Sept., schwarzblau, sehr reichtragend.
H. M.	131.	Diaprée, Kook's neue, ** M. Aug. Fr. mgr. gelb.
H. M. Ij.	11.	„ Violette- , **† E. Aug., mgr., schwarz-blau; ausgezeichnete, delikate Frucht, ausserordentlich reichtragend; verdient einen Platz in jedem Garten.
H. M. P.	19.	Durchsichtige, ** M. Aug., mgr., grünlich gelb, sehr saftreich und süss.
H. M. S. Ij.	23.	Eierpflaume, Grosse Britzer, **† M.—E. Aug., gr., gelb., stark roth marmorirt und punkirt, sehr reichtragend, vortreflich.
H.	84.	„ Blaue, ** E. Sept., gr., blau, Geschmack vorzüglich.
H. M.	95.	„ Gelbe, *† Sept., Fr. sehr gr., gelb.
H. M. P. S. Ij.	8.	„ Nienburger- , ** M. Sept. Fr., gr., roth.
H. M. P. S.	7.	„ Rothe, ** E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
H. M. P. S.	227.	Emperor of Japan, (Kaiser von Japan), *† A. Sept., mgr. blutroth, rund.
H.	244.	Fruchtbare, Frühe, (Early Prolific), **† A. Aug., mgr., rundlich, schwarzblau.
H. M.	238.	Frühpflaume, Edle, ** Aug., Fr. kl., braunroth mit goldfarbenen Punkten.
H. M.	259.	„ Freudenberger, fast ** E. Juli—Anf. Aug., dunkelviolet, fast schwärzl. an der Sonnenseite.
H. M. P. S. Ij.	118.	Frühzwetsche, Biondeck's- , ** A.—M. Aug., mgr., hellroth, oval von sehr edlem, süssweinigem Geschmack.
H. M. P. S. Ij.	3.	„ Fürst's- , mgr., M. Sept., sehr süss und gewürzt.
H. M. P. S.	278.	„ Reutlinger, **† M. Aug., gr., sehr tragbar und gut.
H. M. S.	1.	„ Wangenheim's, *†† Sept. mgr., dunkelviolet.
H. P. S.	163.	Goldpflaume, Esperen's- , * A.—M. Sept., gr., gelb, reichtragend.
H. M. P.	10.	Goldtropfen, Coë's, (Coë's rothgefleckte Pf.), ** E. Sept., gr., gelb.

Pflaumen.



Anna Späth.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Pflaumen.

Bez. d. vorrath. Form.	No	
H.	178.	Goliath, Sept., grosse, schöne und gute Damascene, dunkelviolettblau, mit saftigem Fleische und süssem erhabenen aromatischen Geschmack
H. M.	44.	Grosse, Cooper's, (Cooper's large red), ** M. Sept., Fr. gr., blau.
H.	185.	Herrenpflaume, **† M Aug., Fr. schwarzblau, gr.
H.	243.	" Gelbe, **† E Aug., delikat.
H. P. S.	288.	Hyacinthpflaume, Berliner-
H. M. P. S. 1j.	20.	Jefferson , ** Fr. gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süss. Baum reichtragend.
H. M. P. S.	6.	Jerusalemspflaume, Violette , *† M. Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.
H. M.	119.	Isabella, ** E. Aug.—Sept., gr., rothblau, gut.
H. M.	16.	Jungfernpflaume, Weisse, ** A. Sept., Fr. mgr., gelb.
H. M.	315.	Kaiserin Violette, ** E. Sept.
H. M.	41.	Katharinenpflaume, Blaue, **† E. Sept., Fr. gr., blau.
H. M. P.	1j.	295. " Gelbe, **† E. Sept., mgr., wird um Paris vielfach zur Bereitung der Prünellen angebaut
H. P.	1j.	14. Kirke's , (Kirke's plum), ** A. Sept., Fr. gr., dunkel-violett.
H. P. S. 1j.	123.	Königin Victoria , (Queen Victoria), **† E. Aug., Fr. s. gr., roth.
H. M. P.	197.	Königspflaume, (Royale), ** E. Aug., mgr., blauroth, sehr angenehm schmeckend.
H. M.	198.	" Buchner's, **† E. Aug., mgr., dunkelbraun.
H. M.	200.	" Frühe. Aug. gute mittelgr., braune Frucht, von süssem, angenehm angesäuerten aromatischen Geschmack.
H. M.	254.	" Koch's, *† gr., E. Aug., blauroth.
H. M. P.	202.	" Mayer's, ** E. Aug., mgr., braunroth.
H. M. P.	1j.	22. " von Tours , **†† M. Aug., gr., violettroth; vortreflich für Tafel und Küche.
H.	199.	" Violette, **† E. Aug., Fr. mgr., s. saftreich, von ganz reineclaudenartig-süssem, durch feine Säure gehobenen, delikaten Geschmack.
H. M. P.	1j.	188. Lepine , fast **†† Oct.—Nov., kl.—mgr., schwarzblau; Geschmack süss-weinig; Baum alljährlich reichtragend. Sehr gut zum Welken.
H. P. S.	283.	Mac Laughlin, A. Sept., s. gross, rund grünlichgelb. Neuere amerikanische Sorte.
H. M. P.	1j.	296. (256.) Mirabelle, Gelbe , *†† E. Aug.; klein, besonders zum Trocknen beliebt.
H. M.	318.	" Grosse von Nancy.
H. M.	240.	" Herrenhäuser, doppelte, **† M. Aug., mgr., goldgelb.
H. M. P. S.	75.	" Rangheri's -, **†† M. Aug., Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen oder punktirt, höchst schätzbar.
H. M.	37.	" rothe, *† M. Aug., Fl. süss und angenehm.
H. P.	1j.	284. Nectarine, Rothe, ** A. Aug., rothbraun; nur für Formbäume. Haut abzuziehen.
H. P. S. 1j.	177.	Perdrigon, Bunter -, ** E. Aug., gr., violettroth.
H. M. P.	191.	" Normännischer, ** M. Sept., gr., breit, schwarzblau, mit starkem Duft. Sehr feine aromatische Frucht, von sehr schönem Ansehen. Löst gut und springt gar nicht auf.
H.	242.	Pflaume, Crüger's rothe, **† E. Aug.—A. Sept., mgr. Bunte Frucht, sehr hübsch, mit röthlich-bläulichem Duft. Fleisch fein, goldgelb, auch in kalten Jahren vollkommen lösend, sehr saftreich, angenehm süss-säuerlich, sehr gut!
H. M. P.	286.	Pfirsichpflaume. (Pêche.) A. Aug., gr., reichtragend; gute Marktfrucht.
H. M. P.	1j.	281. Pfirsichzwetsche, Frankfurter -, **† M. Sept., gr., schwarzblau.
M.	261.	Procuereur, ** E. Aug., mgr., roth. Schätzbar.
H. M. P.	1j.	282. Reineclaud, Althann's -, **† A. Sept., mgr., braunroth, heller marmorirt
H. M. P. S. 1j.	64.	" Bayay's, ** M. Sept., gr., grün mit etwas Röthe
H. M. P. S. 1j.	25.	" Frühe , **† M. Aug., oft früher; Fr. gelblich grün mit roth, Fl. zart von zuckersüßem Geschmack. Sehr empfehlenswerth!
H. M. P. S. 1j.	283.	" Boddaert's, **†† E. Aug., Fr. sehr gr., gelb, zuckersüß u. äusserst saftig.
H. M. P. S.	59.	" Durchscheinende, (Reineclaud Diaphane), **† Mitte Sept., Fr. gr.
H.	248.	" Bollweiler, **† M. Aug. gr., sehr süß.
H. M. P.	1j.	63. " Grosse -, **† A. September, Fr. gr., grün.
H.	219.	" Lawrence's, **† A. Aug., gr., gelbgrün.
H. M. P. S. 1j.	18.	" Meroldt's -, **†† M. Sept., gr., gelb.
H. M.	154.	" Prince's, rothe, (Prince's red gage), **† Aug., rothbr.
H. M.	247.	" von Jodoigne, ** M. Sept., gr., hellrothbraun.
H. M.	250.	" Rothe, Denniston's, **† E. Aug., mgr., hellroth, früh und reichtragend; sehr empfehlenswerth.
H.	1j.	235. Schöne von Löwen, **† E. Aug., gr., violett, angenehm süß

Pflaumen.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H. M.	132.	Spilling, Catalonischer, **† E. Juli, gelb, Baum bleibt klein.
H. M.	236.	Thomaspflaume, **† E. Aug., gr.—sehr gr., bräunlich gelb, roth punktirt; werthvolle Tafel- und Marktf Frucht.
H.	213.	Unvergleichliche, Lucombes, Aug., Frucht gross, saftreich, süss, aromatisch.
H. M. P. S. 1j.	21.	Washington , ** A. Sept., Fr. sehr gr., gelb.
H. M.	103.	Waterloozwetsche, ** M. Sept., mgr., gelb, gut; Stein fast lose.
H. M. P. S. 1j.	12.	Zuckerzwetsche Grosse , (Jacobi-Zw.), ** E. Aug., Fr. gr., blau.
H.	114.	Zwetsche, Bazaliez's, ** E. Aug., mgr., schwarzblau, früh und reichtragend.
H. M.	118.	" Biondek's, ** Anf. Aug., mgr., hellroth, sehr schöne und gute Frühzw.; s. fruchtbar, Fl. vollkommen lösend!
H.	99.	" Blaue, ** A. Sept., gr., Fl. gelblich von erhabenem, süssen Geschmack.
P.	50.	" Bremer.
H. M. 1j.	232.	Grosse blaue Haus -, (Bauernpflaume), **†† Sept.
H.	93.	" Grosse gelbe Dattel-, * E. Sept.—Oct. gr., länglichoval Als spät reifende Fr ihrer schönen Farbe wegen eine Zierde der Fruchtseale.
H. M. P.	279.	" Aprikosen, Rothe, M. Sept., bunte Fr. von angenehm süssem Geschmack.
H. M. 1j.	4.	" Grosse englische, **†† M. Sept., Fr. gr., blau.
H. M. P.	9.	" v. Hartwiss' gelbe , **† A. Sept., mgr.—gr., gut.
H. M. P. S. 1j.	3.	" Italienische , **†† E. Sept., Fr. gr., blau.
H. M.	13.	" Reizensteiner, gelbe, ** gr., gelb mit roth punktirt, saftig, süss-angenehm gewürzt, gut vom Stein lösend.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Hochstämme	in den mit H. bezeichneten Sorten	pr. St. M. 2,—
Mittelstämme	" " " M.	1,50
Pyramiden	" " " P.	1,50
Spalierbäume	" " " S.	1,75
1jährige Veredlungen	in den mit 1j. bezeichneten Sorten	1,—

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P.	314.	Ambre tardive, eine sehr schöne Pflaume zum Trocknen, s. reichtragend.
H. M. P.	310.	Baronne Helene Trauttenberg, eine sehr empfohlene Zwetsche.
H. M. P.	292.	Belvoir , ** A. Sept., gr., eirund, gelb, sehr saftig und süss, von ausgezeichneter Qualität.
H. M. P. 1j.	297.	Damascene Rivers' frühe , kl., dunkel-blau, saftreich und süss; sehr reichtragend und früh reifend.
H. M. P. S.	293.	Damson Farleigh Proflife , eine kleinfrüchtige Zwetsche von ausserordentlicher Fruchtbarkeit.
H. M. P.	306.	De Caradeuc , soll ein Bastard zwischen der amerikanischen Chickasaw-Pflaume und einer europäischen Varietät sein. Wird als eine frühe, delikate Frucht l. Ranges empfohlen.
H. M. P.	290.	Douane's dunkelrothe -, gr. Sehr tragbar und starkwüchsig. Eine der besten Pflaumen.
H. P. 1j.	285.	Dumiron , ausgezeichnete Frucht für Muss. Bedarf keines Zuckers beim Kochen.
H. M. P.	287.	Hasard , Sept., länglich, violett, saftig; Stein lose, besser als die Violette Reineclaude.
H. P.	298.	Herzog von Edinburg , gr., purpurroth, oval Eine als beste Qual. empfohlene englische Sorte.
H. M. P.	303.	Lombard , Sept., amerikanische Sorte. Grosse roth-violette Frucht von ausgezeichneter Qualität.
H.	307.	Miner , Sept., amerikanische Var., mgr., roth.
H. M. P.	294.	Montfort , ** M.—E. Aug., gr., rund-oval, blauschwarz, sehr delikat, reichtragend.
H.	308.	Newmann , Aug. u. Sept., roth mit purpur Duft. Fl. s. saftig, delikat.
H. M. P.	311.	Ontario , ** Aug., Fr. gr., rund, gelb marmorirt.
H.	304.	Peters Yellow Gage , (Peters gelbe Reineclaude), gross, durchsichtig gelb, sehr saftreich und aromatisch, Amerikanische Sorte. Sept.
H. M. P.	313.	Pond's seedling , Sept., Fr. roth in violett übergehend, eine der besten Sorten.
M.	322.	Reineclaude de Razambaut , ** mgr., M. Juni. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Eine der frühesten Pflaumen.
H. P.	305.	" Gelbe , (Yellow Gage), M. Aug., gr.; eine ausgezeichnete, reichtragende amerikanische Sorte.
H. P. 1j.	302.	" Kaiserliche , (Imperial. Gage), M. Aug., gr., grün, Fl. saftig, delikat, vom Stein gut lösend. Wird in den Ver. Staaten als eine der besten Pflaumen geschätzt.

Pflaumen. Pfirsiche.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H.	300.	<i>Sämling, Dry's</i> , gr., purpurroth, eine delicate, saftige Tafelfrucht I. Ranges.
H. M. P.	312.	<i>St. Lawrence</i> , E. Aug., gr. dunkelpurpur.
H.	277.	<i>Schüttelpflaume, Lindou's</i> , eine der frühesten Pflaumen, löst gut vom Stein und trägt sehr dankbar. Wird in Werder bei Potsdam viel angebaut.
H.	276.	<i>Stengelpflaume, Werdersche</i> , eine frühe, M. August reife, wohlschmeckende und saftige rothe Zwetsche. In Werder viel angebaut.
H. M. P.	301.	<i>Sultan</i> , eine neue, englische Varietät von ausgesuchter Güte; grossfrüchtig und früh reifend.
H. P.	262.	<i>Washington, Rothe</i> , A. Sept., gross, dunkelbraunrothe sehr tragbare Zwetsche. Geschmack vorzüglich. Stein lose.
H. P.	302.	<i>Weaver</i> , eine für nördliche Gegenden sehr werthvolle Fr. aus N.-Amerika.
H.	289.	<i>Wyedale</i> , Oct., mgr., purpurroth, schätzbare englische Sorte.
H. M. P.	289.	<i>Zuckerzwetsche, Ungarische</i> , vorzügliche Zwetsche, die ich unter diesem Namen mit grosser Empfehlung erhielt.
H. M. P.	264.	<i>Zwetsche, Gisborne's</i> , ** E. Aug., mgr., wachsgelb; nach Oberdieck eine vortreffliche frühe Zwetsche mit völlig lösendem Stein, im Regen nicht platzend.
M.	317.	<i>Zwetsche, Grüne</i> , ** A. Sept., Fl. zart, saftvoll von süss-säuerlichem, sehr guten Geschmack, gut vom Stein lösend.
P. 1j	500.	<i>Prunus Simoni</i> , Sept., eine neue Gattung von Pflaumen aus China mit glänzendem Laub. Sie trug hier mehrere grosse blutrothe Früchte, an Form den Reineclanden ähnlich. Zierpflaume! Der Geruch der Früchte ist ganz vorzüglich.
H. M.	321.	<i>Violette-Américaine</i> .

Kaukasische Sorten.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
P.	273.	Agh Ali.
P.	274.	Alibuchara, Gelbe. ** E. Aug. Ganz aprikosenartig. Fl. gelb mit aprikosenartig fein säuerlichem Geschmack.
M.	267.	Alutscha Arik.
P.	269.	" Aus der Bucharei.
P.	275.	" Späte September, ebenfalls sehr süss und ungemein saftreich.
P.	268.	" Weisse, späte.
P.	270.	Malassi, E. Oct., eine prachtvoll zinnoberroth gefärbte Fr., ebenfalls sehr saftig und angenehm schmeckend.
P.	271.	Wisir Ali, Sept., Form oval, gr., Fl. saftreich. Auf der Sonnenseite dkl.-röthl.-purpur. Schattenseite hell grünl.-gelb. Schwach beduftet, bläulich-weiss.

Pfirsiche.

Einjährige Veredlungen 1 St. M. 1. p. 100 St. M. 90, p. 1000 St. M. 800

Spaliere in Fächer- und Palmetten-

Form 1jährige 1 " p. 150—250.

do. stärkere 1 " p. 3—6.

Diejenigen Sorten, welche auch als Hochstämme vorrätig, sind durch ein **H** vor der Nummer bezeichnet. p St. 250—4 M.

No.	
185.	Acton Scott, mgr. A. Aug. I Qu
116.	Adam.
145.	Admirable Early, mgr.-gr., Fleisch fest, schmelzend süss, sehr angenehm gesäuert. Sept.
147.	Albatross, ** M. Aug., s. gr. Fl. weiss, s. saftig, gut.
H. 113.	Amsden oder Junipfirsich. Aus dem Staate Missouri, N.-Amerika. Die allerfrüheste, die grösste und beste unter den frühen; reift etwa 8 Tage vor „Précocée Béatrice“ in Missouri; bei uns A. Juli.
60.	Aprikosenpfirsich, Prachtvolle , (Admirable jaune), ** E. Sept.—A. Oct., gr., gelb.
190.	Balgowan. (Nectarine,) Sept. gr. I. Qu.
H. 102.	Beatrix, Frühe , (Précocée Béatrice), mgr. August, reift hier A. Sept. an völlig freistehenden Pyramiden; von robustem Wuchs und winterhart. Sehr werthvoll!
52.	Bourdine, gr., Fleisch saftreich, gezuckert fein und angenehm erhaben, October.
117.	Bon Oursin.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

- No.
179. **Bonouvrier.** Sept. I. Qu. z. gr.
181. **Bowden.** gr. A. Sept. mittl. Wuchs.
143. **Brugnon de Féligny,** mgr., schmelzend, saftreich, sehr gezuckert, angenehm gewürzt, sehr fruchtbar, Aug.
128. " **Lord Napier.** Früheste aller Nectarinen.
35. " violett, ** Ende Aug.—M. Sept., eine der frühesten, s. gut.
148. **Chancellor.**
187. **Comtesse de Montijo.** E. Sept. gr. I. Qualität.
140. **Conkling,** ** M. Sept., prachtvoll goldgelb, mit carmoisinroth, s. saftig, süss, weinartig.
149. **Conder,** ** A. Sept. Fr. gr.
150. **Diamond.**
105. **Doppelte Zwollische.**
131. **Downton,** gross, saftig gezuckert, angenehm parfümirt, sehr fruchtbar, Anf. September.
137. **Early Canada,** gross, sehr saftig und süss schmelzend, aromatisch, August.
69. " **Crawford's.** E. Aug.—A. Sept.
158. **Elruge's Nectarine,** ** A. Sept., Fr. hellkirschroth mit purpur. Fl. leicht vom Stein lösend s. saftig, von feinem, gewürzreichen, s. angenehmen Geschmack.
152. **Falcon,** gross. I. Qu. August.
163. **Fayes Early Anne,** mgr. vortreffliche, sehr tragbare amerikanische Frucht, August.
126. **Flache Chinesische, (Plate de Chine),** Frucht plattgedrückt, eigenthümlich geformt, gut, Aug.
184. **Frühe Albert** sehr fein, schmelzend. I. Qu.
H. 114. " **Alexander,** ebenfalls aus N.-Amerika, an früher Reifezeit und Güte mit Amsden wetteifernd.
101. " **Hale's, (Précoce de Hale),** mgr., rosa, sehr gut. Eine der allerfrühesten. Fest haftend am Stiel. Gute Marktfrucht.
160. " **Rivers.** ** A. Aug. zml. gr., ausgezeichnet; verdient häufige Anpflanzung; **nur 1jähr. Veredlungen.**
115. " **Silber-Pfirsich (Early Silver),** wie No. 113 u. 114. Amerik. Ursprungs und von denselben guten Eigenschaften.
120. " von Ezée, grosse, frühe Frucht.
183. " von Savoyen.
125. **Fürst Carl Schwarzenberg,** ** A. - M. Sept., s. saftig u. gut.
46. **Galande, (Belle Garde, Galande),** ** A. v. M. Sept., gr., Sonnenseite dunkelpurpur, sehr saftig u. gut, I. Qu.
121. **Galande de Montreuil,** ** A. Sept., Fr. mgr., s. saftig u. süss, von gewürzh. Geschmack. Baum ungemein fruchtbar und gegen Frühjahrsfröste nicht sehr empfindlich.
154. **Goshawk,** sehr gross und gut. Aug.—Sept.
138. **Governor Garland,** gross, saftig, schmelzend, zuckerartig, mit leicht-säuerlichen Weingeschmack. Aug.
122. **Königin der Obstgärten,** Fr. s. gross, schön gefärbt, schmelzend, süss gewürzt, Sept.
124. **Königin Olga,** ** s. gr. mit gut lösendem, gelblichen Fleische, delikate Fr. von leuchtender Färbung.
123. **Laurent de Bavay,** gr., spät.
27. **Leopold I.,** ** E. Sept., s. gr., Fl. schmelzend, grünl.-gelb, am Steine hellroth, saftreich, von angenehm gewürztem Geschmack.
50. **Liebling. Bollweiler,** ** M. Aug., gr., delikat.
110. " **Jühke's,** ** E. Aug.—A. Sept., zieml. gr.—s. gr., überfliessend saftig, fein gewürzt.
73. **Lord Palmerston,** die grösste aller bis jetzt bekannten Pfirsiche.
76. **Madame Gaujard,** ** Sept., zieml. gr., hellgelb, auf der Sonnenseite schön purpurroth gefärbt und fein punktirt. Fl. leicht vom Steine lösend, saftig, süss, von s. gutem Geschmack.
7. **Magdalene Rothe, (Madeleine rouge),** **! Aug., Fr. gr., sehr schätzbar.
19. " **Weisse,** ** M. Aug., von angenehm gewürztem Geschmack.
17. **Mignon. Grosse,** ** E. Aug., Fr. gr., sehr werthvoll, reichtragend.
5. **Montagne, Doppelte,** ** M.—E. Sept., gr.
119. " frühe.
53. **Noblesse,** ** gr., Anfang Sept.
164. **Oldmixon Freestone.** E. Aug. gr. Sehr gute und schöne, neuere amerikan. Frucht.
104. **Orange, doppelte.**
106. " (Nectarine), gross, Fleisch orangegelb, I. Q. Aug.—Sept.
155. **Padleys Seedling.**
24. **Peruvianerin, Frühe (Belle chevrense),** ** A. Sept., gr. überfliessend saftig, von angenehmem Geschmack.
162. **Pfirsich Nectarine.**

Aprikosen. Mandeln. Wallnüsse.

No.	76.	De Jouy. E. Juli gr. längl. fruchtbar und ausdauernd.	No.	74.	Pourret. E. Aug. gr. s. gut
	50.	Elsässer.	31.	Précoce d'Esperen. **†† mgr. Juli z. tragbar.	
	56.	Frühe von Montplaisir. gr., orangegebl., roth getüpfelt, Fl. roth, sehr gut. 14 Tage vor der „Frühen von Oullins“ reifend.	61.	Red muscadine, früh.	
H.	45.	Gerger.	24.	Royal. **! A. Aug. Fr. gr., Fl. fein schmelzend, s. süss.	
	59.	Gloire de Pourtalès. ** gr. Juli.	73.	Shipley. **†† gr. Aug. hochorange, saftvoll, angenehm süsssäuerlich.	
H.	10.	Grosse Frühe, ** (Gros précoce) gr., A.—M. Juli.	12.	Späteste Deegen. **! Oct., mgr. fein.	
H.	53.	„ rothe Frühe. ** s. gr. u. gut. Juli.	65.	Syrische, **! E. Juli mgr., Fleisch fest und schmelzend, gut vom Steine lösend, leicht mürkierter Geschm.	
	64.	Holländische, (de Hollande), eine gute und fruchtbare Sorte.	55.	Tachard, Juli.	
	41.	La Reine.	46.	Flor Ziran, kaukasische Sorte, E. Aug. sehr starkwüchsig und vollständig winterhart, Frucht klein, Haut fast schwarz, dünn s. leicht abzuziehen, Fl. orangegebl., von sehr angenehm gewürztem Geschmack. Höchst interessante und empfehlenswerthe Sorte, die ich aus Tiflis erhielt.	
	67.	Luizet's, **! E. Juli, s. gr. Fl. s. fein, orangegebl., zart u. schmelzend.	77.	Triomphe de Bussières, ** E. Juli Orangegebl., wollig, Fl. hochgelb, saftreich, fest und sehr angenehm gewürzt. Tragbar.	
	38.	Lübeck's Aprikose.	30.	Türkische, Rothgetüpfte, Mitte Aug., im Süden sehr beliebt.	
	3.	Mandel Aprikose, Ur- oder Stammart; (Armeniaca amygdalina.) Kern süss und essbar	19.	Tyrnaner, Grosse, Aug.	
	70.	Montgamet le gros, **† mgr. Ende Juli	H. M. 13.	Ungarische, Beste, **! E. Juni, s. gr., s. süss.	
	37.	Moorpark frühe, **† mgr. Aug.	63.	Viard.	
	15.	Muscat frühe.	69.	von Tours, ** M. Aug.	
	71.	Orange, **† gr. A. August. Schön orange-farbig, z. saftig nicht z. süss.			
	29.	„ Doppelte.			
H.	49.	„ Frühe, sehr gut zum Einmachen			
H.	11.	Pfirsichaprikose von Nancy, **! Juli gr.			
	51.	„ Frühe von Oullins, 8 Tage früher als die vorige, ausgezeichnet.			
	75.	Pourpré de Mazand.			

Mandeln (Amygdalus communis).

3.	Grossfrüchtige, (macrocarpa)	p. Stück M.	1,50
2.	Krach-Mandel, (fragilis)	„ „	1,50
4.	„ „ Zartschalige (à coque tendre)	„ „	1,50
5.	Süsse	„ „	1,50

Wallnüsse (Juglans regia).

9.	Fertilis, (praeparturiens), frühtragende Zwergwallnuss	p. St. M.	1,50 bis 2,50.
10.	Gewöhnliche, Hochstämme	„ „	2, — „ 5 —.
13.	Grossfrüchtige (macrocarpa)	„ „	1,50 „ 2,50.

Haselnüsse. Mispeln.

Haselnüsse (*Corylus Avellana*).

Gewöhnliche Wald-, p. St. 40 Pf., p. 100 St. M. 35.,

Lamberts- u. Zellernüsse (in den folgenden Sorten)
mehrfährige verpflanzte Ableger, sehr stark

Desgl. nach meiner Wahl, sehr stark 60 „ „ 100 „ „ 50, p. 1000 St. M. 400.
50 „ „ 100 „ „ 45, „ 1000 „ „ 350.

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| 8. | Badem Fundak. |
| 9. | Bandnuss. |
| 10. | Barcelonaer, eckige. |
| 21. | „ Gubener. |
| 13. | „ Loddiges. |
| 4. | Barr's Spanische. |
| 10. | Cobb-nut. |
| 12. | Corylus Avell. grandis. |
| 54. | Daviana. |
| 59. | Emperer. |
| 17. | Einzeltragende, kegelförmig. |
| 61. | Franendorfer, frühe. |
| 11. | Fruchtbare, a. Northhamptonshire. |
| 12. | Grandis. |
| 23. | Kugelnuss, Grosse. |
| 14. | Lambertsnuss, rothe. |
| 19. | „ weisse. |
| 15. | Lange, Downton's. |
| 34. | „ Landsberger. |
| 40. | Mogelnuss. |
| 60. | Multiferum. |
| 57. | Piemontesische. |
| 62. | Prolifique à coque serrée. |
| 26. | Riesennuss, Hallesche. |

- | | |
|-----|--|
| 80. | Römische Nuss. |
| 43. | Sämling, Ivess' langfruchtiger. |
| 30. | Wunder von Bollweiler. |
| 56. | Zellernuss, Althaldenslebener. |
| 1. | „ Bethe's. |
| 5. | „ Blumberger. |
| 6. | „ Burchard's. |
| 9. | „ Büttner's. |
| 8. | „ Cadetten. |
| 14. | „ Fichtwerdersche. |
| 18. | „ Grosse bunte Dresdener. |
| 21. | „ Gubener. |
| 50. | Gustav's. |
| 25. | „ Heynrich's. |
| 27. | „ Jahn's. |
| 31. | „ Italienische volle. |
| 29. | Kircheisen's. |
| 32. | Kunzenmüller's. |
| 33. | „ Liegef's. |
| 45. | „ Link's. |
| 36. | „ Ludolph's. |
| 37. | Minna's grosse. |
| 39. | „ Sickler's. |
| 45. | Truchsess's. |
| 47. | „ |

Mispeln (*Mespilus germanica*).



p. St. M. 0,75, p. 10 St. M. 6.

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|--------------------|
| 2. | Grossfrüchtige , sehr gut. | 5. | Königliche. |
| 3. | Holländische, monströse. | 4. | Nottingham. |
| 1. | Kernlose, (abortiva, sans pepins). | 6. | Riesen, (gigantea) |

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Quitten. Hagebutten Weinreben.

Quitten (Pirus Cydonia).

3. **Constantinopler.**

7. Metzger (aus Metz) Apfel-Quitte.

2. Muscat.

4. **Portugiesische Birn-**

5. Von Angers.

à St. M. 0,75.

10 „ „ 6 „

Von No. 4 u. 7 sind auch Hochstämme p. 8. 1,50 p. 10 St. 12 M. abzugeben.

Neue Einführung: 8. **Persische Zuckerquitte**, erhielt ich mit sehr guter Empfehlung aus dem Kaukasus

10. Red's Mammoth.

do.

do.

aus Amerika

p. 1 St. M. 1,25.

11. Champion.

do.

do.

„ Frankreich

p. 10 „ „ 10,—

12. De Bourgeant.

do.

do.

„

Hagebutten (Rosa villosa, R. pomifera).

Grossfrüchtige p. St. 60 Pf., p. 10 St. 5 M.

Weinreben.

Attest.

Unterzeichneter hat im Auftrage des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, Staatsminister Herrn Dr. Achenbach Excellenz, die Baumschulen des Königl. Oekonomierath Herrn L. Späth, zu Neu-Brütz bei Berlin eingehend auf Reblaus untersucht und bescheinigt hiermit, dass diese vollständig frei von solcher.

Neuer Garten-Potsdam.

October 1884.

Th. Nietner,

Kgl. Hofgärtner.

Tafeltrauben, Mehrjährige Pflanzen.

p. St. M. 1,25. p. 100 St. M. 100.

370 Alicant, blauer.

285. August blauer.

338. Barillet Deschamps.

133 Bidwill's seedling, Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Oct.

142. Blussard, weisser, (Blussard blanc).

13. „ blauer.

383. Bocksbeutel, grosser blauer.

177. Burgunder, früher.

134. Champion, Traube gross, Beeren blau-roth, vorzüglich. E. Sept.

376 Chasselas noir.

38 „ blanc musqué.

144. „ blanc royal.

130. „ courable de Hongrie.

82. „ de Montauban, Fr. gr., locker, B. weiss, Anf. Sept.

88. „ de Jerusalem.

384. „ de Vitry.

84. „ Jalabert, Fr. gr. locker, B. weiss, Sept.

81. „ doré de Seine et Marne.

83. „ Duhamel, früh weiss, grosstraubig.

92. „ gros blanc, Trb. gr., locker. Beeren weisslich grün, gr. I. Ranges. E. Aug.

89. „ musqué de Nantes, Traube gr., locker, Beeren weisslichgrün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Sept.

85. „ Vibert.

340. **Cypro**

5 **Diamant**, (Diamant-Gutedel, Perltraube), Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb. gr., eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. Sept.

14. Dolcedo.

367. Dr. Schmidmann's Zuckertraube, s. früh, Aug.—Sept. neu!

341. Duc de Magenta.

33. Elbling, Trb. gr., Beeren weisslich grün, sehr fruchtbar. Ende Sept.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Weinreben.

No.	
191.	Elbling, Rother.
379.	Faminger, blauer.
109.	Fénéron.
344.	Findinto.
346.	Fondant roux, Fr. gr., locker. B. gr. rosa. Sept.
347.	Forster's white seedling.
196.	Frankenthaler, violett.
76.	" blauer. (Black Hamburg), Trb. s. gr., Beeren dkl.-violett, vorzüglich! E. Sept.
132.	" de Coster, Trb. sehr schön, schwarz, früher als der gewöhnliche Frankenthaler.
365.	Früher von der Lahn.
75.	Golden Hambro, Fr. gr. Beeren gr., ganz vorzüglich.
369.	Gracian.
247.	Grosser Weiss.
246.	" " von Lang.
286.	Gros doré, gelb. mittelgr., M. Sept., neuere vorzügliche Tafeltraube,
111.	Gros Guillaume, Trb. gr., gedrängt. Beeren schwarz, gr., s. fruchtbar I. Ranges. Oct.
306.	Gulab, schwarzer.
8.	Gutedel, früher, (Perl).
71.	" früher rother , mgr., B. gedrängt, sehr zu empfehlen.
6.	" Muskat.
44.	" Pariser , (Chasselas de Fontainebleau), früh, weiss, A.—M. Sept., s. fruchtbar, sehr beliebt.
1.	" rother , Fr. ziemlich lang, hellroth, mittelfrüh.
2.	" weisser , Tr. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig und sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept.
348.	Hamburg-Mill-Hill.
349.	Joli blanc.
115.	Kientzheimer, früher weisser (Gelbe Seidentraube), grosse, weisse, etwas gedrungene Traube, Anf. Sept.
116.	" grossbeeriger (Jvanneno à gros grain).
117.	Kowes, Saug de Pierre.
107.	Lampar Fardevany, Tr. s. gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtbar. I. Rang. E. Sept.
11.	Leipziger, früher , (Früher weisser Malvasier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, s. süss und gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten; Aug.
28.	Lenné's Ehre, Trb. s. gr., locker, Beeren gelblich gewürzt, feinschalig. October.
157.	Madeleine Angevine, Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss, Eine der besten frühen Sorten . Rebe wenig empfindlich, und sehr fruchtbar.
128.	" précoce de Hongrie , Tr. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein, sehr fruchtbar. Sept.
106.	" royale, weiss.
10.	Malinger, früher , (Chass. précoce de Malingre), Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. August.
92.	Malvasier, blauer, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt, die beste und früheste der grossbeerigen blauen Sorten, auch sehr gut zum Trauben. Sept.
16.	" Fahrman's blauer, Sept.
368.	" Richter's, weiss, reichtragend, E. Aug.
12.	" rother, früher.
37.	Malvoisie Martina.
95.	Mataro, Beeren weiss, Anfang October.
96.	Miller.
97.	Milton, Tr. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem, parfümten Geschmack, fruchtbar. Sept., neu!
120.	Minestra, Trb. und Beeren mgr., locker, schwarz, m. früh.
355.	Mrs. Pince black muscat.
360.	Muscadine royale.
102.	Muscat blanc de Jésus, Traube mgr., locker, Beeren gelb, gross, fruchtbar. Anf. Sept.
100.	" de la mi-août, sehr früh, schwarz.
59.	" Lierval, schwarz.
103.	" précoce de Saumur , grün.
160.	" Primavis.
126.	Perle grosse noire, gross, schwarz.
3.	Portogieser, blauer, (Oporto-Traube.)
46.	Prinz Albert, weiss.
362.	Queen Victoria, schwarz.
45.	" " weiss.

No.	
188.	Riesling, weisser.
104.	Rouge de Cantal.
366.	Rother Ungar, Trb. mgr., lang, locker, wohlschn. Sept.—Oct.
61.	Solferino, mgr., weiss, mit röthlichem Hauche, reichtragend, Sept., sehr gut.
56.	Sweet water, Buckland's, gr., s. schön.
170.	Sylvaner rother, Trb. mgr., sehr dicht, süss. Sept.
110.	Szilva szule, gute ungarische Tafeltraube.
228.	Traminer, weisser, vorzügliche Tafeltraube.
65.	Trentham Black, Tr. gr., Beeren blan. gr., ausserordentlich saftig und süss, von eigenthümlichem Geschmack, reichtragend, Oct.

Folgende Sorten sind als tragbare Reben in Töpfen p. St. 3 Mk. zu haben:

133.	Bidwill's seedling.	383.	Bocksbeutel, gr. blauer.	381.	Chasselas de Vitry.
5.	Diamant.	367.	Doctor Schmidsmann's weisse.	14.	Dolcedo.
		191.	Frankenthaler, violetter.	365.	Früher von der Lahn.
		280.	Gros doré.	11.	Gutedel, Pariser.
		2.	Gutedel, rother.	1.	Gutedel, weisser.
		348.	Hamburg-Mill-Hill.	11.	Leipziger früher.
		32.	Malvasier, blauer.	10.	Malinge, früher.
		16.	Malvasier, Fuhrmann's blauer.	361.	Pitmaston's white cluster.
		360.	Rother Ungar.		

Griechische und Kaukasische Weinsorten.

p. Stück 1 Mk., 10 Sorten à 1 St. 9 Mk.

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus und werden gewöhnlich $\frac{3}{4}$ —2 Kilogr. schwer, dürften jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

No.		No.	
318.	Abzwaani, weiss.	316.	Kisil Jüssüm.
234.	Buddischuri, weisse Keltertraube.	318.	Mzwaani, weiss.
297.	Chamani nero, schwarz.	274.	Pechleri.
304.	Goruli, weiss.	331.	Tetri, weiss.
244.	Griechischer, gelber.	268.	Trappa.
302.	Göss Jüssüm.	331.	Tschumata.
235.	Kischuri, rothe Keltertraube.		

Amerikanische Sorten.

p. St. 1 Mk.; 10 Sorten à 1 St. 9 Mk.; p. 100 St. 75 Mk.

Da dieselben härter sind als unsere einheimischen Sorten, so eignen sie sich ganz vortreflich für Laubengänge und halten unsere Winter ohne Bedeckung aus.

Einige von ihnen werden in Amerika auch als Tafelweine geschätzt und zeichnen sich meist durch einen starken Muskatgeschmack aus, z. B. No. 74, 122, 138, 199, 282, 284, 287. Die hier nicht aufgeführten siehe bei den Ziergehölzen unter *Vitis*.

No.		No.	
138.	Alexandra, blan.	371.	York Madeira, sehr gute Sorte, reift auch in d. ungünstigsten Jahren vollständig.
281.	Canby's August, schwarz.	74.	Municipal red, roth.
122.	Clinton, dunkelviol. 100 St. 50 Mk.	183.	Narzissa.
311.	Creyeling, schwarz, früh.	287.	Northern Muscadine, hochroth.
312.	Diana, hellroth, früh.	282.	Rebecca, weiss.
181.	Elisabetha, weisslich grün, früh.	199.	Roger's Hybride, dunkelroth.
50.	Isabella, schwarzblau, 100 St. 50 Mk.		

Stachelbeeren.



Duck-wing.

Green Willow.

Englische.

Das folgende Sortiment enthält nur anserlesen gute und grossfrüchtigste Sorten.
 Sehr starke Sträucher mit Namen
 Schwächere, verpflanzte
 Sehr starke Sträucher, nach meiner Wahl in mehreren Sorten
 do. ohne Namen
 Hochstämme, ca. 1—2 Meter hoch mit mehrjährigen Kronen

p. St.	p. 100 St.
Mk.	Mk.
—40	35
—	20
—35	30
—30	25
1,50	125

No.	Rothe.
7.	Defiance, Leigh's.
8.	Emperor, Smith's.
13.	Free from.
11.	Goliath, Sproffon's.
1.	Jolly Miner, Greenhalgh's.
2.	(14) Jolly Printer.
5.	Monstruouse.
12.	Peace-Maker.
6.	Printer.
3.	Queen Mab, Williamson's.
4.	Roaring Lion, Farrow's.
10.	Sämling, Keen's.
9.	" Maurer's.
	Grüne
37.	Bang Europe, Leicester's.
28.	Duck-wing, Baerdsill's. (siehe Abbildung).
36.	Duke of Bedford, Yeat's.
30.	Esmeralda, Leigh's.
29.	Freecoast, Seaton's.

No.	
40.	Gabron green.
33.	Green Gage.
41.	Greenriver.
31.	Green Willow, Johnson's.
	Abbildung.
42.	Gretna green.
46.	Hearth of Oak.
32.	(44) Independent, Brigg's.
38.	Laurel, Parekinson's.
47.	L'impériale verte.
26.	Lord Douglas.
39.	Melon.
35.	Mertensis.
27.	Plain long green.
43.	Rough.
45.	Sämling, Baerdsill's.
34.	Pansner's.
25.	Smiling Beauty, Beaumont's.
	Gelbe
55.	Bumper, Thompson's.
64.	Bunker's Hill.
60.	Dublin.

No.	
22.	Golden Crown.
59.	Governess.
63.	High Sheriff, Clayton's.
54.	Jolly Farmer, Chapman's.
51.	" yellow.
61.	Marketmann.
58.	Pilot, Hill's.
56.	Plumper.
62.	Roaring Lion, yellow.
53.	Smuggler, Baerdsill's.
57.	Two to one, Whiteacker's.
50.	Yellow Lion, Ward's.
	Weisse
80.	Apollo, Gibston's.
77.	Balloon.
82.	Mister.
75.	Queen Mary, Morris.
79.	Sämling Pansner's.
76.	Sampson, Crompton's.
78.	Shanon, Hopley's.
81.	Sir Sidney Smith.

Stachelbeeren. Johannisbeeren.

Deutsche.

Diverse beste, grossfrüchtige Sorten in verschiedenen Farben, starke Sträucher
p. St. 35 Pf., p. 100 St. 30 M.

Amerikanische

Früchte klein, roth, blau beduftet, ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einmachen und zur
Bereitung von Stachelbeerwein; da sie eine grössere Menge von Saft liefern als die europäischen;
starke Sträucher p. St. 35 Pf., p. 100 St. 30 M.

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

Nach Wahl des Bestellers

Die mit „*neu*“ bezeichneten Sorten

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten

Weisse oder rothe oder schwarze im Rummel

Hochstämme in den mit **H.** bezeichneten Sorten

p. St. M.	p. 100 St. M.
— 30	25
— 50	
— 25	20
— 20	15
p. St. 1.25—	1.50 125

No.	
	Bunte.
59.	<i>Gloire de Sablons</i> , klein u. bunt.
H. 14.	<i>Gestreifte Perl-</i> , klein u. bunt.
	Rothe
H. 7.	<i>Buddeus' Hellrothe</i> , gr. spät.
H. 58.	<i>Eyat's Nova</i> , mgr., volltragend, (Aborn- blättrig) neu!
42.	<i>Ahornblättrige</i> , mgr. u. klein, neu!
H. 34.	<i>Chenonceau</i> , gr.
65.	<i>De Jonghe's rothe Dessert-</i> mgr., mgr.
71.	<i>Fay's neue frühe rothe-</i> , neu!
22.	<i>Frauentorfer, grosse</i> , Fr. gr.
53.	Fruchtbare (La Fertile) , gr. voll I.
63.	<i>Fruchtbare v. Angers</i> .
15.	<i>Gondouin</i> , mgr., gut.
37.	<i>Kaiserliche, rothe</i> , mgr.—gr.
13.	(47) <i>Kaukasische, rothe</i> , mgr. volltrag.
H. 21.	Kirsch-Johannisbeere, rothe , sehr gr. I.
23.	<i>Knight's Grosse, rothe</i> .
H. 5.	Langtraubige , (Red currant), gr. I.
38.	<i>Red grape, grosse</i> , neu!
17.	<i>Ringens</i> , zieml. gr., langtraubig, mfrüh I.
44.	<i>Rothe Englische</i> , mgr., früh.
H. 10.	„ <i>Holländische</i> , gr. I.
H. 48.	„ <i>Grosse</i> , gr. I., sehr fruchtbar.
46.	<i>Rouge admirable</i> , neu!
61.	<i>Ruby Castle</i> , mgr., zieml. voll, süss.
54.	<i>Schöne von St. Giles</i> , gr. u. mgr., voll, neu!
2.	<i>Süsse, rothe</i> , mgr. wohlschmeckend.
11.	<i>Versailler</i> , gr., reichtragend, sehr lange dichte Traube.
	Rosafarbige.
16.	<i>Champagner, Grosse fleischfarbige</i> .

No.	
12.	<i>Holländische, rosaroth</i> , gr., voll, gut I.
45.	<i>Rosafarbige, Gewöhnliche</i> , mgr., frucht- bar.
	Weisse.
H. 67.	Brandenburger, Gr. weisse.
32.	<i>Champagner, weisse</i> , mgr.
51.	<i>Durchsichtige</i> , mgr., zieml. voll.
50.	<i>Esperens, weisse</i> , ziemlich gross, sehr voll. I.
33.	<i>Grosse Weisse</i> , gr. I.
H. 20.	Holländische weisse , sehr gr. u. süss I.
H. 1.	<i>Kaiserliche, weisse</i> , s. gr., gelbl. I!
62.	<i>Weisse engl.</i> , s. gr.
60.	<i>Perle blanche</i> , mgr. süss, gut.
68.	<i>Kirsch, weisse</i> , neu!
70.	<i>Versailler</i> , grfr. weisse.
41.	<i>Weisse von Verrières</i> , mgr., zieml. voll.

Schwarze. (Ahlbeeren. Cassis.)

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind be-
sonders zur Bereitung von Johannisbeer-
saft und Johannisbeerwein zu empfehlen.
Sie werden aber auch als Tafelfrucht viel-
fach den rothen und weissen vorgezogen.

9.	Ambrafarbige , gr., gut.
H. 49.	<i>Bang up</i> , sehr gross, I. grösste neuere engl. Sorte, süss
28.	Gewöhnliche Schwarze.
56.	<i>Kentish hero</i> , gr.
H. 64.	<i>Lee's Black Currant</i> , neu!
H. 6.	<i>Neapolitanische, schwarze</i> , (Black- Naples) gr. I.
H. 29.	<i>Ogden's grosse I.</i>
H. 8.	<i>Merveille de la Gironde</i> , gr. I.
H. 3.	Victoria, schwarzfrüchtige , gr. I.

Himbeeren.

Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten . . . p. St. 0,15 M., p. 100 St. 10 M., p. 1000 St. 80 M.
 Nach Wahl des Bestellers . . . p. St. 0,25 M., p. 100 St. 20 M., p. 1000 St. 180 M.
 Die mit neu! bezeichneten Sorten . . . p. St. 0,50 M.

No.		No.	
1.	Antwerpener, gelbe, mgr.	44.	Knevelt's Riesen-, roth.
8.	Barnet, gr. roth.	81.	Lemercier, roth.
23.	Battler's Riesen, roth.	37.	Lindley, grfr. roth, sehr zu empfehlen, amerikanische Sorte.
14.	Bienenstock (beehive), gr., roth, voll.	49.	Malta, remont., gelb.
56.	Billard's immertragende, (Perpétuel de Billard), remont., roth.	18.	Merveille, neue gelbe, remontirend.
28.	Brinkle's Orange, orangegelb.	22.	Nonpareil, roth.
25.	Charters' Fruchtbare, roth, sehr gross und gut.	45.	Paragon, roth.
7.	Chili, rothe, (Riesen-H.), gr. voll.	42.	Philadelphia, braun, grossfrüchtig und reichtragend.
59.	Cuthbert, roth, gr., sehr reich tragend: vorzügliche Sorte, neu!	21.	Prinz von Wales, roth.
12.	Englische grosse rothe.	55.	Queen Victoria.
4.	Fasstolff, roth.	6.	Schöne v. Fontenay, remontirend.
19.	„ neue, remontirend, roth.	46.	Schwarze Herbst-, (Autumn black), ohne Ausläufer.
39.	Gardiner, schwarzfr., gr. glzd., sehr inter- essante, brombeerartige Himbeere.	48.	Semper fidelis, mgr., roth, sehr fruchtbar.
10.	Grosse gelbe, sehr gut.	57.	Stachelarme gelbe, (Sans épine à fruit, jaune), grossfr., gelb.
20.	Herrenhäuser, frühe rothe.	16.	Sucrée de Metz, gr. gelb, remontirend.
32.	„ immertragende rothe, remont.	17.	Surprise d'automne gelb, remontirend.
58.	Herzog v. Brabant, gr., roth, sehr reich- tragend.	30.	Vicepräsident French, roth.
47.	Hornet, roth.	5.	Vorsters Grosse, roth.

Brombeeren.



Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet. Die rankenden und die aufrechten haben meist schwarze, die himbeerartigen rothe Früchte. Die rankenden Sorten zieht man am besten am Spalier. Das 2jährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, muss entfernt werden.

No.		p. Stück Pf.	10 Stück Mk.	No.		p. Stück Pf.	10 Stück Mk.
39.	Allen's red polioe, aufrecht, himbeerartig	30	2	43.	Miners Trailing, rankend	50	4
3.	Arenarius , rankend	40	3	26.	Newman's Thornless, aufrecht	40	3
2.	Armenische , rankend	40	3	37.	Ohio black cap, aufrecht	30	2
23.	Dorchester , aufrecht	50	4	48.	Philadelphia, neue amerikani- sche Sorte	75	—
4.	Hybrid, fructu maximo, rankend	50	—	10.	Rubus arcticus	40	3
44.	Kittatiny , aufrecht	50	4	512.	" crataegifolius, weiss- dornbl. B.	50	4
7.	Lawton , (New Rochelle), aufr.	50	4	47.	Snyder	50	4
45.	Mammuth , aufrecht	50	4				

Erdbeeren.

Erdbeeren.

(Beste Pflanzzeit: August und September.)

Preise der Sorten nach meiner Wahl.

100 Stück der besten neuen in 4 Sorten	Mk.	100 Stück der besten älteren in 4 Sorten	Mk.
100 " " " " " 10 " "	10	100 " " " " " 10 " "	3
100 " " " " " 25 " "	15	100 " " " " " 25 " "	4
100 " " " " " 2 " "	20	100 " " " " " 10 " "	10
	2		12

A. Monatserdbeeren.

No.		p. St. 100	10 St. M	100 St. M
184.	Alexander , (Busse), grösste weisse	20	1,—	6
210.	Alpenerdbeeren , Frucht gross und schön, mit feinem, kräftigen Wohlgeruche, trägt ununterbrochen vom Frühjahr bis zum ersten Herbstfroste. Sehr zu empfehlen	40	3,—	20
216.	Belle de Montrouge , interessante Neuheit. Die einzelnen Früchte sind von den blätartig erweiterten Kelchblättern wie von einer Manchette umgeben. Trägt von Anfang Juni bis zu den Nachtrösten	30	2,—	10
217.	à fruit blanc . Dieselbe hat gleiche gute Eigenschaften, aber noch schöner sehen die weissen Früchte in der Manchettenform aus	30	2,50	15
144.	Blanche d'Orléans , weiss, sehr fein	20	1,—	6
145.	Brune de Gilbert , schwarzbraun, sehr aromatisch	15	1,—	6
158.	Double perpétuelle , roth	15	1,—	6
179.	Gloire de St. Denis , roth, sehr starkwüchsig und dankbar	15	—,75	3
203.	d'Orléans	25	1,50	10
146.	Janus gr., roth, oft fast doppelt	15	—,75	5
180.	Rankenlose, rothe , zur Einfassung von Rabatten recht gut	20	1,—	—
181.	weisse , do. do.	20	1,—	—
186.	Reine des quatre saisons , roth, rund, sehr tragbar	20	1,—	7
218.	Schöne Meissenerin , weiss, s. gross	20	1,50	—
147.	Trouillet , gr., roth, sehr tragbar	15	1,—	6

B. Scharlacherdbeeren.

192.	Beehive , (Bienenstock), mgr., scharlachroth, sehr reichtragend, früheste der Erdbeeren	20	1,—	6
183.	May-Queen , (Maikönigin), mgr., scharlach, allerfrüheste Erdbeere	20	1,—	6

C. Moschuserdbeeren (Vierländer.)

190.	Monstrous Hautbois , schwarzbraun, sehr aromatisch, grösste dieser Gattung	15	—,75	5
29.	Royal Hautbois , mgr., ausserordentlich aromatisch	15	—,75	5

D. Grossfrüchtige (Ananas-) Erdbeeren.

121.	Admiral Dundas , sehr gross, kräftig und reichtragend	15	—,75	6
174.	Alpha , gr., lebhaft roth, Fl. fest, blassroth, von köstlich erhabenem Geschmack. Sehr früh, vorzüglich zum Treiben	25	2,—	12
193.	Amy Robsart (Dr. Roden), s. frühe Treibsorte, sehr ertragr. u. aromatisch	30	2,50	—
98.	Askot Pine-apple , mittelfrüh	15	—,75	—
99.	Avenir , gr., eiförmig, glänzend hochroth	15	—,75	—
30.	Bijou , mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, spät, sehr fruchtbar	15	—,75	5
219.	Black Defiance , sehr gr., dkl.-roth, Fl. saftreich, fest und fein gewürzt; reichtragend. Eine ausgezeichnete amerikanische Varietät.	25	2,50	15
44.	Boule d'or , gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, glänzend orange, ziemlich tragbar, spät, vielleicht die schönste bek. Sorte	15	—,75	5
80.	British Sovereign , s. gr., mfrüh, s. reichtragend	20	1,—	—
137.	Brown's Wonder , neuere englische Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll, trägt hier nicht voll	15	—,75	6
220.	Captain Jack , gr., scharlachfarben, Fl. fest, guter Qual.; s. fruchtbare, m. frühe amerikanische Sorte	25	1,50	10

— 46 —

Erdbeeren.

No.		p. St. Pc.	10 St. M.	100 St. M.
115.	Carolina Superba , gr., orange; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren . . .	15	—,50	3
221.	Centennial Favorite , gr., dkl.-roth, fein gewürzt, eine späte amerikanische Varietät . . .	30	2,—	10
92.	Ceres , gr., dunkelroth, sehr saftreich, sehr tragbar . . .	15	—,75	5
91.	Charles Downing , herzförmig, Fl. rosa, s. spät . . .	30	2,50	15
101.	Châtelaine , gr., brillant-carmoisinroth, auffallend lang . . .	15	—,50	—
223.	Cinderella , gr., glänzend scharlachfarben, von feinem, aromatischen Geschmack; fruchtbare, schätzenswerthe amerikanische Sorte . . .	30	2,—	15
122.	Cockscomb , dick, kegelförmig, dunkelroth; sehr tragbar, spät . . .	15	—,50	3
224.	Continental gr., dunkelroth, Fl. fest, von guter Qual.; sehr fruchtbare und starkwüchsige amerikanische Sorte . . .	30	2,—	10
93.	Cornish Diamond , sehr gross, dunkelroth, spät, reichtragend . . .	20	1,—	7 1/2
222.	Crystal City , mgröss, kegelförmig, hell-carmoisin, guter Qualit., sehr früh; amerikanische Sorte . . .	30	2,—	10
209.	Crescent seedling . . .	30	2,—	10
171.	Deutscher Held , ziemlich gr., dunkelroth, niedrig . . .	20	1,—	6
170.	Deutsche Kaiserin , gr. oder sehr gr., carmoisinroth, mittelfrüh, fruchtbar . . .	20	1,—	6
191.	„ Perle , (Göschke), gr., glockenförmig, ähnlich der deutschen Kronprinzessin, weiss mit rosa Anhauch; früh . . .	20	1,—	—
86.	Director Fürer , sehr gross, hahnenkammförmig, mittelfrüh . . .	20	1,—	6




No.		p. St. Pc.	10 St. M.	100 St. M.
173.	Duc de Magenta , (s. Abbildung), ungeheuer gr., rund od. gelappt, kirschroth, ziemlich spät. Prachtvolle Dessert-Erdbeere . . .	30	2,—	10
84.	Duc de Malakoff , sehr gross, dunkelroth, reichtragend . . .	20	1,—	6
210.	Duchesse , eine der besten frühen; fruchtbar und starkwüchsig . . .	40	3,—	—
94.	Duke of Edinburgh , sehr gross und schön . . .	20	1,50	8
95.	Early prolific , gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben . . .	20	1,50	8
139.	Elisa Vilmorin , (Gloede), die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross, fruchtbar . . .	20	1,—	6
81.	Elton improved , mgr., lebhaft roth, etwas spät . . .	15	—,75	5
160.	Eppendorf , mgr., rund lebhaft rosa, mittelfrüh . . .	25	1,50	—
187.	Eugen Fürst , (Göschke), gr. oder sehr gr., dunkelbraun, Form veränderlich, dauerhaft, sehr voll tragend, mittelfrüh . . .	20	1,—	—
176.	Exquisite , gr., rundlich, lebh. zinnoberroth; kräftig, reichtragend, mittelfrüh . . .	25	2,—	10
117.	Fairy Queen , gross, von länglicher Form, glänzend orange, kräftig und sehr fruchtbar . . .	15	—,75	—
110.	Formosa , gr., herzförmig, carmoisinroth, fruchtbar . . .	15	—,75	—
167.	Freiherr von Stein , gr., roth, mittelfrüh, oft zusammengewachsen . . .	20	1,50	—
97.	Germania , gr., oval, kräftig, frühreifend . . .	15	—,50	3

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Erdbeeren.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
225.	Glendale , gr., schön, lebhaft roth, Fl. fest, etwas säuerlich; werthvolle amerikanische Marktfrucht.	40	3,—	20
67.	Globe , gr., von schöner und ovaler Form, carmoisinroth reichtragend . . .	15	—,50	3
226.	Golden Defiance , mgr.—gr., dkl.-roth. Fl. zart, guter Qual.; ausserordentlich fruchtbar, soll oft Büschel von 12—15 Früchten bringen u. eine der besten und fruchtbarsten späten amerikanischen Varietäten sein . . .	30	2,50	20
85.	Graf Bismarck , von bedendender Grösse, regelmässig, glänzend carmoisin bis dunkelpurpur, mittelfrüh . . .	15	—,75	—
172	Graf Moltke , sehr gr., breit kanunförmig, dunkelbraun, fruchtbar, spät . .	15	1,—	8
215.	Gräfin Schaffgotsch , (Göschke), neu! s. gr., ovalherzförmig, glänzend, zinnoberroth, Fl. saftig, süss u. sehr gewürzreich; Pfl. starkwüchsig u. sehr reichtragend, mfrüh. I. Qual.!	30	2,—	15
199.	Great American , gr., glänzend dunkelroth, v. gutem Geschmack, starkwüchsig; neuere amerikanische Züchtung . . .	20	1,50	10
50	Gweniver , schön gr., lebhaft orange, sehr fruchtbar, zum Treiben geeignet .	15	—,75	6
124	Haquin , sehr dick, oval konisch, dunkelroth ausgezeichnete späte Fr. . .	15	—,75	5
192.	Helvetia , (Göschke), gr., lang kegelförmig, lebhaft zinnoberroth, reichtragend, mittelfrüh . . .	40	3,—	—
195.	Hundredfold , (Dr. Roden), mgr., dunkelroth, kegelförmig, früh, sehr ergiebig	25	1,50	10
153.	James Carter , gr., regelmässig rund, hell kirschroth, mittelfrüh . . .	15	—,75	5
103.	Veitsch , sehr gr., lebhaft roth, fruchtbar, früh . . .	15	—,75	—
118.	John Powell , mgr. od. gr., eiförmig, orangeroth . . .	15	—,75	—
125.	Jucunda , gr., roth, spät, gedeiht in jedem Boden . . .	15	—,50	3
238.	Juliette , gr., roth, guter Qual., enorm fruchtbar. Als späte Marktfrucht zu empfehlen . . .	30	2,50	—
211.	Kerr's prolific , (Kerr), eben so schön wie Jucunda, aber besserer Qualität und ganz besonders fruchtbar . . .	20	1,50	10




König Albert von Sachsen.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
213.	König Albert von Sachsen , (Göschke) (s. Abbildung), enorm gr., breit oval, glänzend orange-kirschroth Fl. rosa, prachtvoll aromatisch; ausserordentlich fruchtbar, mfrüh . . .	25	2,—	15
4	La Constante , spät, ziemlich regelmässig, roth, Fl. fest . . .	20	1,—	6
61.	La Robuste , gr., rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar frühreifend . . .	15	—,50	3
25.	Lucida perfecta , gr., regelmässig rund, lebhaft ziegelroth, ausserordentlich fruchtbar, spät; ganz vorzügliche Chili-Erdbeere . . .	20	1,—	3
196.	Maréchal Mac-Mahon , s. gr., hochroth, sehr festfleischig . . .	15	1,—	—

Erdbeeren.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
241.	Mammoth , sehr gross und schön	30	2,50	15
188.	Matador , sehr gross, oft enorm, zinnoberroth regelmässig länglich, von angenehmi süss-säuerlichem Kirschgeschmack, sehr fruchtbar, mittelfrüh.	20	1,50	—
227.	Miner's Great Prolific , gr. — s. gr., carmoisinroth guter Qual. und fruchtbar; vielfach empfohlene amerikanische Varietät	20	1,50	8
228.	Monarch of the West , gr., schön lebhaft roth, ausgezeichneter Qualität, mittelfrüh; amerikanische Sorte	30	2, —	15
197.	Monsieur Dupanloup (Dubois), neu! s. gr., länglich kegelförmig, bisweilen abgestumpft, scharlach, voll, schmelzend; sehr parfümirt, mfrüh, hält sich lange; sehr kräftig und sehr fruchtbar.	30	2, —	15
198.	„ Fournier , neu! s. gr., abgestumpft, glänzend dunkelroth; Fl. fest, voll, schmelzend, ganz roth, von sehr angenehmem Geschmack; zum Treiben noch besser als Prince royal und Marguerite	25	2, —	—
14.	Monstreuse de Rubine , gr., kegelförmig, roth, sehr gut!	15	—,50	4
57.	Napoléon III. , spät, sehr reichtragend, sehr gross und schön	20	1, —	—
229.	Nicanor , mgr., kegelförm., hell-scharlach, guter Qualität, früh reifend und lange tragend, s. starkwüchs. u. fruchtbar; amerikanische Sorte	30	2, —	15
201.	Phénomène , (Mulié), neu! s. gr., 2—3 lappig gespalten, gleichend einer Doppelfrucht, scharlach; sehr robust, trägt früh und reich	30	2, —	15
230.	Philadelphia , mgr., kegelförm., hell-scharlach, Fl. ausgezeichnet, fest und saftig, kurz nach „Nicanor“ reifend; Pfl. starkwüchs. und fruchtbar; amerikanische Sorte	30	2, —	15
111.	Président , gr. oder sehr gr., rund und lappig, roth, kräftig, fruchtbar	15	—,60	4
231.	„ Lincoln , gr bis s. gr., unregelmässig gef., glänzend roth; Fl. ziemlich fest, bester Qual., Pfl. starkwüchsig und fruchtbar; amerikanische Sorte	25	2, —	15
105.	„ Wilder , gr. schön konisch oder oval karmoisinroth	15	—,60	—
112.	Prince impérial , mittelgr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	—,60	—
205.	Princess Alice , frühe fruchtbare zum Treiben beliebte Sorte	25	1, —	5
104.	„ Dagmar , veränderlich lebhaft rosa, früh	15	—,75	—
202.	Professor Burvenich , (Mulié) neu! gr., rundlich hahnenkammförmig, dunkel lackroth; Fl. dunkelrosa, zuckerig, saftvoll; ausserordentlich tragbar mittelfrüh	40	2,50	—



No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
214.	Professor Dr. Liebig , (Göschke) (s. vorst. Abbild.) neu! s. gr. schön regelm. ründ, glänzend roth, von sehr gewürzreichem, den Moschus-Erdbe. ähnl. Geschmack; mfrüh. Wegen d. fest. Fl. besonders als Marktf. zu empfehlen	30	2, —	—

— 49 —

Erdbeeren. Moosbeeren.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
203.	<i>Professor Pynaert</i> , (Mulié), neu! ausserordentl. gr., schön roth, hahnenkammförmig, abgeplattet, saftig, mfrüh. Sehr werthvoll	25	2,—	—
237.	<i>Progrès</i> , gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpur, fest, reichtragend und früh. Sehr zu empfehlen!	15	—,50	3
237.	<i>Prouty's Seedling</i> , soll eine der besten neueren Sorten und von enormer Fruchtbarkeit sein.	30	2,—	15
68	<i>Réus van Zuidwyk</i> , s. gr. länglich u. hahnenkammförmig, zinnober, etwas spät	20	1,—	8
245	<i>Roseberry Maxima</i> , gr. reichtragend, dunkelroth	20	1,50	—
106	<i>Rubis</i> , gr., rund, glänzend roth, mittelfrüh	15	—,75	—
204	<i>Sanct Lambert</i> , reichtrgd., z. Treiben u. z. Marktverk. ganz vorzüglich, empf.	15	—,60	—
140	<i>Savoureuse</i> , mgr., ründlich kegelförmig, scharlach, fruchtbar, mittelfrüh .	15	—,75	5
232	<i>Sed Boyden</i> , gr., lebhaft karmoisinroth, s. saftig und ausgezeichnet fein gewürzt, mfrühe bis späte, reichtragende amerikanische Sorte	30	2,50	15
233.	<i>Sharpless' Seedling</i> , s. gr., unregelmässig geformt, glänzend hellroth, mfrüh bis spät, wird v. den Herren Ellwanger & Barry in Rochester, Ver. Staaten, als die beste der von ihnen kultivirten Erdbeeren empfohlen	30	2,50	20
126	<i>Sir Charles Napier</i> , schön und gross, herzförmig, orangeroth glänzend, sehr fruchtbar	15	—,50	3
5	<i>Sir Harry</i> , gr., rund, scharlachroth, mfrüh, von enormer Fruchtbarkeit . .	25	2,—	—
162	<i>Sir John Fallstaff</i> , sehr gross, glänzend orange; kräftig und sehr fruchtbar	20	1,—	—
236	<i>Somers Ruby</i> , gr., fein gewürzt, fest-fleischig, sehr reichtragend	40	2,50	20
119	<i>Souvenir de Kieff</i> , gr., kegelförmig, zuweilen abgeplattet, fruchtbar, mittelfrüh	15	—,60	4
141.	<i>Succès</i> , gr., herzförmig, orange, sehr reichtragend, auf starken Stielen . .	25	1,50	10
189.	<i>Surpasse Bijou</i> , gr., lebhaft zinnoberroth, regelmässig rund, sehr reichtragend	15	1,—	—
120	<i>Topsy</i> , mgr. oder gr., meist lang, lebhaft roth, fruchtbar, mittelfrüh . . .	15	—,60	—
175.	<i>Traveller</i> , s. gr., fest, spät, glzd. roth	30	2,50	—
156.	<i>Unser Fritz</i> , gr., regelmässig, lebhaft carmoisinroth; sehr fruchtbar, mfrüh	15	—,75	6
108	<i>Victoria Ovata</i> , gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth, kräftig u. fruchtbar	15	—,60	4
166	<i>Waltham Seedling</i> , gr., glänzend kirschroth, ziemlich spät	20	1,—	—
234.	<i>Wilsons Albany</i> , mgr. —gr., dklroth; soll in Nordamerika am weitesten verbreitet und überall sehr geschätzt sein	20	1,50	10
235.	<i>Windsor Chief</i> , gr., rund, dkl-karmoisinroth, Fl. fest von gutem Gewürz, reichtragend, in Nordamerika als die beste späte Marktfrucht geschätzt	30	2,50	—
65.	<i>White-pine-apple</i> , gr., regelmässig rein weiss, fruchtbar, sehr zu empfehlen	15	—,50	3

E. Grossfrüchtige Remontirende.

Sie tragen 2mal, nur wenn alle Ranken sorgfältig entfernt werden.

37.	<i>Ananas perpétuelle</i> , mgr., kegelförmig oder oval, scharlach	15	1,—	6
-----	--	----	-----	---

Amerikanische Moosbeere.

(Vaccinium macrocarpum, Cranberry).

Mit dieser grossfrüchtigen, der Preisselbeere im Geschmack ähnlichen Moosbeere, werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns sind bereits glückliche Versuche gemacht, und ist diese Pflanze auch hier auf feuchtem Moor- und Sandboden sehr ertragreich . . .

25	2,—	—
----	-----	---

Rosen.



Mein Rosensortiment umfasst circa 700 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Die mit **h** bezeichneten sind als Hochstämme vorrätig; die mit **m** bezeichneten als Mittelstämme, die mit **n** bezeichneten als niedrige auf den Wurzelhals veredelte oder wurzelächte.

Die eingeklammerten Zahlen hinter dem Namen bezeichnen das Jahr in dem die Sorte zuerst in den Handel gegeben wurde.

Allgemeine Preise.

Hochstämme	von 1,00—1,60 m Höhe	M. 1,50 bis
Mittelstämme	" 0,60—0,90 m "	" 0,75 "
Niederstämme	" 0,30—0,50 m "	" "
Niedrig veredelte oder wurzelächte	Remont, Bourbon, Moos u. diverse Sorten	
Desgl.	Thee- und Noisette-Rosen	
Trauerrosen	1,70—2,25 m hohe Stämme	M. 2,50 bis
Kletter- oder Rankrosen	" "	" 0,50 "

p. St.	100 St.
M.	M.
2,—	125
1,25	60—90
—,70	—
—,45	40
—,60	55
4,—	—
—,75	45—70

NB. Hochstämmige Thee- und Noisetterosen sind 40 Pf. pr. St. theurer falls sie besonders verlangt werden.

Rosen.

Für Handelsgärtnereien.

Rosen zum Treiben

aus dem Lande in 1-2jährigen Veredlungen auf dem Wurzelhals,
pr. 100 St. 30 Mk., pr. 1000 St. 250 Mk. *netto* in folgenden Sorten:

No.		No.		No.	
445.	Alfred Colomb.	61.	Docteur Andry.	391.	Madame Lacharme.
205.	Anna Alexieff.	97.	Fisher Holmes.	333.	„ Victor Verdier.
26.	Anna de Diesbach.	452.	François Michelson.	439.	Mademoiselle Eng. Verdier.
2.	Auguste Mic.	7.	Général Jaqueminot.	204.	Marie Baumann.
30.	Aurore boréale.	6.	Gloire de Dijon.	67.	Mistress Bosanquet.
405.	Baron Bonstetten.	549.	Horace Vernet.	721.	Monsieur Boncenne.
31.	Baronne de Rothschild.	640.	Jean Liabaud.	421.	Paul Néron.
34.	Baronne Prévost.	226.	John Hopper.	773.	Paul Ricaut.
533.	Captain Christy.	132.	Jules Margottin.	399.	Président Thiers.
148.	Catherine Guillot.	137.	La France.	150.	Souvenir de la Malmaison.
228.	Charles Lefebvre.	14.	La Reine.	139.	Triomphe de l'exposition.
59.	Comtesse d'Oxford.	56.	Louise Odier.	127.	Victor Verdier.

Per 100 Stück 40 Mark *netto*:

No.		No.		No.	
796.	Duchesse Mathilde.	868.	Reine Marie Henriette.	708.	Perle de Lyon.
829.	Lamarque.	814.	Mélanie Willermoz.	709.	Safrano.
417.	Madame Falcot.	553.	Perle des jardins.	182.	Souvenir d'un ami.
307.	Maréchal Niel.				

Rosen in Töpfen.

1) Remontant-, Bourbon- und Thee-Rosen.

(Starke Wurzelhalsveredlungen.)

pr. 1 St. 75 Pf., pr. 10 St. 6½ Mk., pr. 100 St. 60 Mk.

No.		No.		No.	
445.	Alfred Colomb.	132.	Jules Margottin.	67.	Mistress Bosanquet.
205.	Anna Alexieff.	137.	La France.	721.	Monsieur Boncenne.
405.	Baron Bonstetten.	56.	Louise Odier.	773.	Paul Ricaut. (Portl. Rose.)
533.	Captain Christy.	417.	Madame Falcot.	139.	Triomphe de l'exposition.
148.	Catherine Guillot.	391.	„ Lacharme.	127.	Victor Verdier.
228.	Charles Lefebvre.	439.	Mlle. Eugénie Verdier.		

2) Monats-Rosen.

p. Stück 40 Pf., p. 10 Stück 3 M., p. 100 Stück 25 M.

No.		No.		No.	
843.	Abbé Moilan.	855.	Capreolata odoratissima.	64.	Hermosa.
842.	Alfred Aubert.	339.	Cramoisi supérieur.	336.	Lawrenceana rosea.
844.	Beau Carmin du Luxembourg.	411.	Ducher.	675.	Nemesis.
345.	Bengalensis.	847.	Fellemborg (syn. Belle Mar-	850.	Prince Eugène.
341.	„ purpurea.		seillaise.)	746.	Sanglant.

Rosen Neuheiten für 1885.

No.		
967.	Empereur Alexandre III. (Rem.) Sehr kräftig, schöne Belaubung, sehr hart gegen Frost. Bl. s. gr., gut gefüllt, schöne Form und gute Haltung. Farbe dunkel-centifolien-rosa mit carn. nancirt. Sehr wohlriechend. Neuheit I. Ranges. p. St. Mark 3.00.	
966.	Madame Fanny Pauvels. (Thee —) Bl. mgr. gef. leuchtld. gelb, mit hellgelb nancirt. Centr. dottergelb, bisweilen goldröthlich. Diese herrliche Rose ist eine der reichblühendsten Sorten und z. Treiben vorzüglich. p. St. Mark 2.50.	
965.	Princesse Julie d'Arenberg. (Thee —) Bl. gr. gefüllt, schöne Form, flach auch becherförmig. Farbe hellgelb m. dklgelb nancirt. Centr. dkl. canariengelb mit grünlichem Schimmer. Varietät I. Ranges. p. St. Mark 3.00.	

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Rosen Neuheiten 1884^{er}.

- | | |
|-------|---|
| No. | |
| 983. | Aline Rozey. (Noisette —) Kräftig, Bl. mgr. gefüllt, dachziegelartig übereinander, von vollkommener Form, fleischfarbig weiss colorirt, in rein weiss übergehend, sehr reichblühend. p. St. Mark 2,50. |
| 979. | Duc de Marlborough. (Rem. —) Sehr starkw. Blatt dklgrün, Bl. gr. voll, gut gebaut, lebhaft carminroth. Sehr gut remontirend I Ranges. p. St. Mark 2,50 |
| 984. | Gaston Chandon. (Thee. —) Kräftiges Wachstum. Hybr. der „Gloire de Dijon“. Bl. mgr. gut gefüllt, kirschroth; rosig angehaucht, im Grunde kupfergelb, p. St. Mark 3,00 |
| 985. | Général Appert. (Rem. —) Stranch kräftig, abstammend von „Souvenir de William Wood“, grbl. gefüllt, vorzüglich purpurroth, sammetartig schwärzlich, zuweilen einfarbig lebhaft roth. Gut remontir. p. St. M. 2,50. |
| 1033. | Gloire Lyonnaise. (Rem. —) Bl. s. gr., gefüllt, s. gr. gebaut, breite Petalen, blüht aufrecht auf jedem Zweige, gute Haltung; Farbe schön chromgelb. Umfangsblätter breit reinweiss berandet. Geruch der Theerosen. Varietät extra! p. St. M. 2,50. |
| 980. | Laurent de Rillé. Stark wachsend, Bltt. blaugrün, grbl. schön gefüllt und gut gebaut, Farbe leuchtend kirschroth, in fleischfarbig übergehend. Sehr reichblühend. p. St. M. 2,50. |
| 981. | Madame Francis Buchner. (Rem. —) Laub leucht. grün. Bl. schön gefüllt, leuchtend hellrosa, Centr. verwaschen m. dklrosa. Sehr gut remontirend. p. St. Mark 2,50. |
| 986. | Madame Massicault. (Rem. —) Mittelm. Wuchs, abstammend von „Baronne de Rothschild“, Zweige fast vollständig ohne Stacheln. Grbl. gefüllt, schön geformt, lebhaft fleischrosa mit silberfarbenem Reflex, fleischfarbig weiss, übergehend in zart rosa. Gut remontirend. p. St. Mark 3,00. |
| 982. | Président Jaquin Crespo. (Rem. —) Starkwüchsig, mit hängenden, dunkelgrünen Blättern, grbl. gefüllt, kugelig, lebhaft rosa oder prächtig fleischfarben. Sehr gut remontirend. p. St. Mark 2,50. |
| 977. | Princesse Amélie d'Orléans. Kräftig, mit weitstehenden, blaugrünen Blättern, s. grbl., gefüllt, kugelig, äusserst schön gebaut, rosa fleischfarben, atlasartig, lebhaft frisch. p. St. Mark 2,50. |
| 978. | Princesse de Bearn. Gut gebaut, grbl. kugelig, gefüllt, von ausgezeichnete Form, hochroth in's schwärzliche übergehend und lebhaft scharlach beleuchtet. Blume I. Ranges. p. St. Mark 2,50. |
| 987. | Victor Hugo. (Rem. —) Bl. mgr., fast gefüllt, glänzend carminroth mit purpurrother Schattirung. Aussehen erregende Färbung. p. St. M. 2,50. |

n) Remontant-Rosen (Oefterblühende).

- | | |
|----------|--|
| No. | |
| h. m. | 412 Abbé Brametel (72), gr., schön gebaut, carmin, braun-purpur nüancirt, reich in Büscheln blühend. |
| h. m. n. | 515. (666) Abel Carrière (76), gr., stark gef. und sehr gut gebaut, sammtig, schwärzlich purpur-violett, Centrum feurig roth. |
| h. m. | 499. Albert Payé (74), gr., fleischfarbig, rosa geflammt. |
| h. m. n. | 445. Alfred Colomb. gr., centifolienförmig, glänzend feuerroth, sehr wohlriechend. |
| h. m. | 11 Alpaide de Rotalier , gr., schön hellrosa. |
| h. m. | 563. Amélie Hoste , gr. incarnatrosa, oder zart fleischfarbig rosa. |
| h. m. | 344 Amiral Gravina , mgr. schwarzpurpur in amaranthroth übergehend, kugelf. |
| h. m. n. | 205. Anna Alexieff , gr., hell lachrosa, s. kräftig, wenig rem. |
| h. m. n. | 26 Anna de Diesbach (58), gr., schön schalenförmig, rosa mit leuchtend carmin; extra! |
| h. m. n. | 565 Antoine Mouton (75), s. gr., centifolienförmig, prächtig lebhaft rosa, Rückseite heller; schön belaubt, l. |
| h. m. n. | 2 Auguste Mie , (51), gr., rosa, leicht aufblühend, kräft., l. |
| h. m. | 27 „ Neumann , gr. ponceau m. violett schattirt u. feurigem Reflex. |
| h. m. n. | 30. Aurore boréale , glänzendroth, gr. |
| h. m. n. | 405. Baron Bonstetten (72), s. gr., schwarz samt.-crim.; kräftig. |
| h. m. n. | 460 „ Chaurand , gr., sammtig-scharlach, innen schwarzpurpur nüancirt, becherförmig. |
| h. m. | 435 „ Hausmann (67), gr., stark gefüllt, prächtig carminroth, in Dolden blühend, s. schön! |
| h. m. | 288 Baronne de Maynard , mgr. rein weiss. |
| h. m. n. | 34. „ Prévost , s. gr., rosa, schön gefüllt, s. kräftig. |
| h. m. n. | 31 „ de Rothschild (68), gr., zart rosa m. w. nüancirt, schöne Blume! |
| h. m. n. | 533 Captain Christy (74), s. gr., s. zart fleischfarb. rosa, Centr. dunkler. |
| h. m. | 454. Chamois , mgr. gef. gelb, bisweilen in kupfergelb übergehend. |
| h. m. | 50. Charles Lee , mgr., dkl. zinnoberroth m. viol. Anhauch, schalenförmig, kräftig. |

Rosen.

h. m. n.	228.	<i>Charles Lefèvre</i> (62), s. gr., schön purpur-violett mit leuchtend rothem Schein, voll, extra!
h. m. n.	451.	" <i>Margottin</i> , gr., blendend erm., Centr. leuchtend feuerroth.
h. m.	52.	" <i>Turner</i> , gr. glzd. roth.
h. m. n.	691.	Cheshunt-Hybride (74), gr., becherförmig, dunkelcarminroth, Rückseite heller.
h. m.	481.	Climbing Victor Verdier (72), gr., centifolienrosa m. lehtd. erm., kletternd.
h. m.	523.	Comtesse de Brsson (74), gr., Centrum rosettförmig, leuchtend hell-rosa, weisslich gerandet.
h. m. n.	59.	(768). " d'Oxford (70), gr., leuchtend carmin mit roth nancirt; schön belaubt.
h. m.	568.	" de Sérénie (75), s. gr., centifolienförmig, zart rosa m. erm. schattirt.
h. m.	657.	" Vally de Sérénie (76), gr., gut gebaut, amarant-carminroth.
h. m. n.	385.	Coquette des blanches (73), mgr., centifolienförmig, rein weiss mit grünlichem Schein, in Dolden blühend; kräftig, schön!
h. m.	243.	Deuil du Prince Albert, gr., dkl.erm. mit schwarz schattirt. Ctr. feuerroth, hängende Haltung.
h. m.	617.	Dingée Conrad, gr. gef., s. schöne Form, prächtig glzd. hochroth.
h. m. n.	61.	Docteur Andry (65), gr., dkl.-roth mit leuchtend carminroth, schalenförmig.
h. m.	49.	" Arnal, mgr., leuchtend roth.
h. m.	496.	" Brechemier (74), gr., gut gebaut, fast kugelförmig, leuchtend carmoisin.
h. m.	184.	" Buschpler, gr. s. gef. s. kräftig.
h. m.	538.	" Wilhelm Neubert (74), gr., centifolienförmig, dunkel-kirschroth mit purpur-violett und carmin nancirt.
h. m. n.	807.	Duc d'Anjou gr., dunkelcarminroth.
h. m. n.	222.	" de Cazes, (61), gr., leuchtend purp. erm. kugelförm., mkräft., rem. gut I.
h. m.	654.	" de Montpensier (76), gr., regelmässig gebaut, sammtig-roth, braunroth nancirt; bis in den Spätherbst blühend, ausgezeichnet!
h. m. n.	208.	" de Rohan, gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkräft., I.
h. n.	411.	Ducher, mgr. gef. rein weiss, sehr reichblühend.
h. m.	591.	Duchesse de Vallembrasa, gr., gefüllt, zart rosa, Centrum dunkelrosa in weiss-rosa übergehend.
h. m. n.	72.	Duke of Edinburgh (69), gr., erm. m. leicht erm. schattirt, reichblühend.
h. m.	74.	Edouard Morren (70), s. gr., zart carminrosa, schön gebaut.
h. m. n.	466.	Elise Boelle, gr. schöne Form, weissl. rosa in rein weiss übergehend.
h. m. n.	353.	Elisabeth Vignerot (65), s. gr., schalenförm. frisch rosa; kräftig; schöne Belaubung, ausgezeichnet!
h. m. n.	185.	Empereur du Maroc, mgr., sammt. purp., in schwärzl. übergehend, mkräft., I.
h. m. n.	78.	Enfant de France, sehr gross, weissfleischfarbig mit dunklerem Herz.
h. m. n.	503.	Ernest Herger (74), gr., dkl. purp., leuchtend nancirt.
h. m.	474.	Etienne Level, gr., gef., gut geb., prächtig carm. roth, s. schön und blühbar.
h.	247.	Eugène Appert (61), gr., blendend sammtigcarmin, Holz und Laub dunkel; schön!
h. m. n.	588.	(637.) Eugène Fürst (67), gr., Petalen breit, glänzend sammtig dunkelviol. u. lackroth.
h. n.	830.	Exposition de Brie-Comte Robert, gr. gef., vollendet schön geformt, blendend roth, sehr effectvoll.
h. m.	86.	Felix Genéro (67), schön geformt, violett-rosa, sehr gut remontirend.
h. m.	95.	Fen brillant, mgr., leuchtend feuerroth.
h. m. n.	97.	Fisher Holmes, gr., blendend scharlach, zieml. gef. I.
h. m.	105.	François d'Arago, mgr., sammt-amarantroth, dunkel nancirt, reichblühend.
h. m.	500.	" Courtin, gr. dachziegelf. purp. kirschroth, Rückseite rosa, Blätter des Cirs. kurz. Rand weiss.
h. n.	452.	" Michelson, gr., gefüllt, centifolienförmig, schön dunkelrosa.
h. m.	832.	Gaston Lévêque, lebhaft carmin, mit braunroth, zinnober, purpur und feuerroth nancirt, remontirt s. gut.
h. m.	642.	Général de Cisse (76), gr., gut gebaut, kugelförmig, leuchtend scharlachroth.
h. m.	494.	" Dumourier, gr. lehtd. kirschroth, Rückseite seidenartig rosa; dankbar in Büscheln blühend.
h. m.	598.	" Duc d'Anmale (76), gr., lebhaft dunkel-kirschroth, schalenförmig, gut gefüllt.
h. m. n.	7.	" Jacqueminot, (53), gr., feurig roth m. Sammt, zieml. gef. kräft., rem. gut I.
h. m.	131.	" Washington, s. gr., leuchtend roth, kräftig.
h. m.	117.	Gloire de Ducher, gr. Centr. purpur, aussen bläulich viol. dkl. belaubt.
h. m. n.	138.	" de Santenay, gr., lebhaft dunkelpurpur, feste Petalen kugelförmig.
h. m.	572.	Hippolyte Jamain, s. gr. centifolienfarbig, leuchtend rosa mit carmin schattirt.
h. m. n.	549.	Horace Vernet (67), gr., breite Petalen, sammtig purpur-roth mit dkl.-carmoisin nancirt.

Rosen.

h. m. n.	No.	Hortense Mignard (74), Petalen breit, lehtd. kirschroth. Rückseite fleischfarben, in Büscheln blühend.
h. m.	126.	Jacques Lafitte , gr., dunkelcarmoisin roth, Rand heller, kräftig.
h. m. n.	507.	Jean Balmis (74), s. gr., schön gebaut, veränderlich rosa.
h. m. n.	294.	" Goujon (63), s. gr., schalenförmig, hellroth mit lila; kräftig.
h. m. n.	640.	" Liabaud (76), s. gr., sammtig crms. mit schwarz.
h. m. n.	719.	" Rosenkranz , gr., leuchtend korallenroth, von ausgezeichneter Schönheit.
h. m.	618.	" Souper , gr. gef. s. schöne Form, sammet. purp. imbricirt.
h. m. n.	226.	John Hopper , gr., lebhaft crms.-rosa, schöner Bau, sehr gef., kräftig.
h. m. n.	132.	Jules Margottin , gr., lebhaft kirschroth, dachziegelartig, reichblühend, gut rem.
h. m.	677.	Kaiser Wilhelm I. , s. gr. gef. feurig purp. m. hellpurp. u. viol. nūanc.
h. m.	360.	Kate Hausburg , mgr., lehtd. rosa.
h. m.	298.	L'Abondante , gr., leucht. feuerroth.
h. m. n.	237.	La Brillante , mgr., durchsichtig hellerm., in Rispen blühend, mkräft.
h. m.	589.	La Mignonne , mgr. scharlach carminroth, in chinesischroth übergehend.
h. m. n.	14.	La Reine , s. gr., rosa mit etwas lila, schalenförm., reichblühend, ähnlich einer Centifolie, gut rem. kräft., I.
h. m.	810.	La Syre , gr., amarantpurpur, in violett übergehend.
h. m.	803.	Lena Turner , gr. gef. kirschroth m. schieferfarben nūanc.
h. m. n.	155.	Léopold I., roi des Belges , s. gr., dkl. crms., s. gef. kräft.
h. m. n.	361.	" Hausburg , (64), gr., carmin mit braunroth und dklpurpur.
h. m.	609.	L'Étincelante , s. gr., gef. schön scharlach roth, einzig in ihrer Art.
h. m.	816.	Lord Beaconsfield , sehr gross, gefüllt, dunkelcarmoisin.
h. m.	416.	Louis Corbie , gr. gef. gut geb. lehtd. carm. rosa, sehr reichbl. u. wohlriechend.
h. m. n.	159.	Louis van Houtte , (64), carminrosa, feurig nūancirt.
h. m.	668.	" Späth , (76), chinesisch rosa mit weiss nūancirt und berandet.
h. m. n.	157.	Louisa Wood , gr., schön leuchtend rosa, leicht gefüllt.
h. m.	258.	Madame Alfred de Rougemont (63), mgr., centifolienförmig, weiss mit leicht rosa; sehr reich in Büscheln blühend, eine der schönsten Weissen.
h. m.	635.	" Alphonse Aubert , gr., hellroth mit carmin nūancirt, gut gebaut.
h. m.	164.	" Boll , s. gr., kugelf., lehtd. rosa, s. wohlriechend, sehr kräftig.
h. m.	165.	" Charles Crapelet , gr., kirschroth, silberfarben schattirt, schöne Form.
h. m.	811.	" Charles Wood , s. gr., gefüllt, blendend roth in dunkelroth übergehend.
h. m.	620.	" Ferdinand Jamain (76), sehr gr., schalenförmig, dkl.-carmin-rosa.
h. m.	545.	" Furtado , gr., s. gefüllt, lebhaft carminrosa, schalenförmig, gut gebaut.
h. m.	453.	" George Schwartz , s. gr., gef. gut geb., Hortensienrosa, in glacirosa übergehend, extra.
h. m.	593.	" Herivaux , Bl. gr. gef. schön johannisbeerroth.
h. m. n.	391.	" Lacharme , (73), s. gr., centifolienförm., Centrum weiss, leicht rosa schattirt, in rein weiss übergehend.
h. m. n.	119.	" Louise Carrique , mgr., lehtd. dklroth, reichblühend in Büscheln, kräft.
h. m.	493.	" Marie Finger , (74), gr., voll, kugelförmig, leuchtend fleischfarbig-rosa, Centrum dunkler, reich in Büscheln blühend. Extra!
h. m.	433.	" Moreau , s. gr., schalenförmig, leuchtend roth mit violett-nūancirt.
h. m.	511.	" Nachury (74), sehr gr., voll, prachtvoll seidenartig rosa.
h. m.	393.	" Soubeyron , kl., s. schöne Farbe, prächtig rosa, s. wohlriechend, einzig in ihrer Art.
h. m.	20.	" Rivers , (50), mgr., blass-rosa; extra!
h. m. n.	392.	" Scipion Cochet , (73), s. gr., dachziegelförmig, lehtd. kirchrosa, silberig gerandet.
h. m. n.	333.	" Victor Verdier , gr., lehtd. crm. schalenförmig; Blumen auf starken Zweigen, I.
h. m. n.	305.	Mademoiselle Amélie Halfen , gr., schöne Form leuchtend crms., mstark.
h. m.	608.	" Anne Marie Côte , gr., kugelförmig, rein weiss, bisweilen lila rosa schattirt.
h. m.	195.	" Annie Wood , mgr., leuchtend, reichbl. feine Form.
h. m. n.	647.	" Berthe Sacavin , gr., voll, kugelförmig, schön seidenartig rosa, Centrum heller.
h. m. n.	439.	" Eugénie Verdier , (70), mgr., voll, incarnat-rosa in weissrosa übergehend; I. Ranges.
h. m. n.	508.	" Eugénie Wilhelm (74), mgr., dunkelamarant-purp. mit schwärzlich und feuerroth nūancirt.
h. m.	644.	" Léonie Giessen , gr. centifolienrosa m. weiss.
h. m. n.	772.	Maréchal Vaillant , gr., leuchtend purpur, Prachtsorte, für Gruppen und zur Topfkultur.
h. m. n.	492.	Marguerite Jamain , gr., gut gef., schön gebaut, Ctr. frisch fleischfarben rosa.
h. m. n.	204.	Marie Baumann , gr. lehtd. roth, voller als „Général Jacqueminot“ reichblühend, I.

Rosen.

h. m.	No. 488.	Marquise de Castellane, (70), s. gr., s. regelmässig gebaut, leuchtend rosa, *ausgezeichnet.
h. m. n.	212.	<i>Maurice Bernardin</i> , gr., lehtd. hell zinnoberroth, kugelförmig, in Büscheln blühend, I.
h. m.	539.	Miller Hayes (74), gr., becherförmig, carmin mit sammtartig blendendem hochroth, Centrum leuchtender; schön!
h. m. n.	721.	<i>Monsieur Bonceune</i> , gr., sammtig, schwarz-purpur.
h. m.	582.	Mr. E. Y. Thaes, gr., blendend dkl. kirschroth.
h. m.	330.	Pauline Talabot (74), gr., blendend dkl. rosa oder erm., sehr blühbar.
h. m.	524.	Pauline Lancezeur, mgr. scharlach cam., im Verblühen violett.
h. m. n.	421.	<i>Paul Néron</i> (70), s. gr., schöne Form, dkl.rosa, extra I.
n.	773.	„ Ricaut, gr., carmin, sehr gute Treibrose.
h. m.	254.	Pavillon de Pregny, mgr., weissbl. rosa in lila übergehend.
h. m.	534.	Perfection des Blanches, mgr., centifolig, ausgez. reinweiss, sehr blühbar.
h. m. n.	397.	<i>Perte des blanches</i> (73), mgr., schöne Form, rein weiss, leicht geröthet, I.
h. m. n.	365.	<i>Pierre Notting</i> , (64), gr., schwärzlich purp., tief schalenförmig, reichblühend, I.
h. m.	398.	„ Seletzki, gr., dkl. purpur m. schieferfarb. Reflex., schöner Bau.
h. m. n.	399.	<i>Président Thiers</i> (73), s. gr., ausgezeichnet gebaut, feuerroth; extra.
h. m. n.	242.	<i>Prince Camille de Rohan</i> (61), gr., sammtig dkl. erms. m. hochroth, kräft.
h. m. n.	216.	„ de Porcia (66), gr., gut gebaut, dkl. zinnoberroth.
h. m.	312.	„ Eugène de Beaumont, mgr., schöne Form, glänzend, feuerroth mit purp. in Büscheln blühend.
h. m.	29.	„ noir, mgr., fas. gef., schwarz-purpur.
h. m.	529.	„ Paul Demidoff (74), s. gr., hell carmin-rosa, mit weisslichen Rändern.
h. m.	818.	Princesse Louise Victoria, s. gr. viol. lehtd. fleischfärb. rosa.
h. m. n.	218.	„ Paëbla, gr., s. feurig roth, becherförmig, I.
h. m.	613.	Queen of Waltham, gr., gut gebaut und gefüllt, lebhaft roth mit carmoisin schattirt.
h. m. n.	874.	<i>Reynolds Hole</i> , (74) gr., kastanienrothbraun, glänzend purpur nancirt, s. schön, schalenförmig, Prachtrose I. R.
h. m.	367.	Rouge marbré, gr., sammetrosa m. erm. s. kräftig.
h. m. n.	225.	<i>Sénateur Favre</i> , gr., lehtd. roth, rund gebaut.
h. m. n.	144.	„ <i>Faisse</i> , s. gr., voll und gut gebaut, dunkelcarmoisinroth.
h. m.	648.	Sir Garnett Walseley, gr., zinnoberroth, m. carm. nancirt.
h. m.	624.	Souvenir d' Arthur de Sansal, mgr., schön geformt, lebhaft rosa, sehr wohlriechend.
h. m.	229.	„ de Charles Montaut, glühendsammtig, scharlach, schöne Form, gute Haltung
h. m.	632.	„ de David d'Angers, gr., dklroth, m. purpurviol. nancirt.
n.	774.	„ <i>de la reine d'Angleterre</i> , s. gr., gef., schalenförmig, Blumenblätter fest, feurig hellcarminrosa
h. m.	477.	„ <i>de l'exposition de Darmstadt</i> (72), gr., voll, gut geformt, schwärzlich sammet dkl. violett mit blutroth; Laub s. dunkel.
h. m.	101.	„ <i>de Leweson-Gower</i> , s. gr. dkl. rubinroth, in hell übergehend.
h. m.	488.	„ <i>de Madame Alexis Michau</i> (74), gr., leuchtend dkl. rosa.
n.	833.	„ <i>de Poiteau</i> , gr., becherförmig, leuchtend lachsrosa.
h. m. n.	402.	„ <i>de Romain Desprez</i> (73), gr., fleischfarbig rosa mit schieferfärbener Nüance, Centrum leuchtender; schöne Haltung
h. m. n.	490.	„ <i>de Spa</i> , (74), gr., dklrth mit feuerroth erhellt, prächtig.
h. m. n.	244.	„ <i>de William Wood</i> , gr., schwarz-purpur mit feuerroth, schalenförm., dunkelste der bis jetzt bekannten Rosen.
h. m. n.	245.	„ du Dr. Jamain, (66), gr., voll, bläulich, schwarz-violett; eigenthümliche Färbung, schön.
h. m.	423.	„ du Général Douai, gr., fast gef., schön lehtdrosa.
h. m.	817.	Star of Waltham, gross, gefüllt, recht schöne Form, hellrosa.
h. m. n.	725.	Sultan of Zanzibar, mgr., kugelf., schwärzlich.
h. m.	576.	<i>The Shah</i> (75), gr., voll, schön gebaut, leuchtend roth; s. reine, schöne Färbung!
h. m. n.	504.	<i>Thomas Mills</i> (74), s. gr., blendend carm., weissl. berandet, becherförmig, sehr blühbar.
h. m. n.	724.	Tournefort (68), gr., schön voll, mohr-roth.
h. m.	230.	<i>Triomphe de Caën</i> (62) gr., kugelförmig, sammtig-purpur, feuerroth schattirt.
n.	594.	„ <i>de France</i> , s. gr., gefüllt, schöne Form, prächtig leuchtend, carmin rosa.
h. m. n.	139.	„ <i>de l'exposition</i> , (52), gr., sammt, dkl. erms., gut rem., mkräft. I.
h. m.	317.	Vainqueur de Goliath, gr., lehtd., feuerroth, kugelfg., kräftig.
h. m. n.	127.	<i>Victor Verdier</i> , gr., ermsosa., schöne Form, rem. gut, mkräft.
h. m. n.	262.	Vulcain, (62), mgr., leicht gefüllt, sammtig purpur violett mit schwarzem Schein; reichblühend.
h. m. n.	779.	<i>Xavier Olibo</i> , gr., gut gef., schwärzlich sammet mit feuerroth und amarantroth. Preisrose!

Rosen.

b. Bourbon-Rosen.

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formenschönheit, reiches Blühen und Remontiren aus

	No.	
h. m. n.	740.	<i>Baron Gonella</i> , (59), sehr gross, leuchtend violett, rosa.
h. m. n.	45.	<i>Boule de neige</i> , (68), mgr., rein weiss, rund wie ein Schneeball, gut rem. I.
h. m. n.	148.	<i>Catherine Guillot</i> , lebhaft rosa, Form vollendet, kräftig.
h. m.	114.	<i>Guiletta</i> (60) mgr., fleischfarb.-weiss, flach, regelmässig gebaut.
h. m. n.	137.	<i>La France</i> (65) s. gr., silberrosa, Centr. lilafarbig, äussere Petalen leicht umgebogen, reichblühend, sehr elegant, mkräft., I.
h. m. n.	56.	<i>Louise Odier</i> , (51), mgr., rosa, kräftig, vollendete Centifolienform. Gute Treibrose I.
h. m.	561.	<i>Madame Valtou</i> , mgr., leicht. chinesisch rosa.
h. m. n.	809.	<i>Michel Bonnet</i> , gross, gefüllt, leuchtend rosa.
h. m. n.	67.	<i>Mistress Bosanquet</i> , mgr., weiss, Centr. zart fleischfarbig, schalenförmig, sehr reich und lange blühend, kräftig. Gute Treibrose, I.
h. m.	692.	<i>Paxton</i> (52), gr., leuchtend rosa, feuerroth schattirt.
h. m. n.	381.	<i>Reine Victoria</i> (73), gr., schöne Form, leuchtend rosa, gut remontirend.
h. m.	270.	<i>Révérènd H. Dombraïn</i> (63), gr., voll, glänzend rosa, Centrum carmin; sehr schön!
h. m.	678.	<i>Robusta</i> , mgr., gef. sammtig, feuerroth, in purpur übergehend, im Bouquet blühend.
h. m.	382.	<i>Souvenir d'Adèle Launay</i> , gr., gut gef., schön geb. hoch rosa, öffnet sich leicht.
h. m. n.	150.	<i>de la Malmaison</i> , (43), s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb. atlasartig, reichblühend, kräftig. Gute Treibrose, I.
h. m.	234.	<i>de Nemours</i> (70) mgr., frisch leuchtend rosa, Rückseite blassrosa.
h. m.	320.	<i>du Président Lincoln</i> , mgr., gut gefüllte, carmoisinroth, schwärzlich schattirt.

c. Noisette-Rosen.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grossen Blumen etwas hängend.

n.	342.	<i>Adélaïde Parie</i> , mgr., leuchtend-hellrosa in weiss übergehend.
h. m. n.	343.	<i>Aimée Vibert</i> , mgr., rein weiss, sehr dankbar und lange blühend; Laub glänzend dunkelgrün.
h. m.	264.	<i>America</i> , gr., weissgelb, Centrum lachsgelb.
h. m. n.	376.	<i>Bouquet d'or</i> (73), gr., schön gebaut, dkl. gelb, Centrum leicht kupferig, wohlriechend reichblühend; prächtig.
h. m. n.	231.	<i>Celine Forestier</i> gr., flach, gelbl., Centrum dunkler, kräft. I.
h. m. n.	70.	<i>Chromatella</i> (43), gr., leuchtend gelb, in hellgelb übergehend; kräftig.
n.	829.	<i>Lamarque</i> , Bl. weiss, Centr. canariengelb.
h. m. n.	378.	<i>Madame Caroline Küster</i> (73), gr., orange, kugelförm., reichblühend.
h. m.	558.	<i>Eugène Mahé</i> , mgr., rosa, Grundfarbe kupferig gelb.
h. m. n.	636.	<i>Molan Carvath</i> , gr., dunkelschwarzgelb, (stammt von Cloth of Gold).
h. m. n.	48.	<i>Plantier</i> , mgr., reinweiss mit gelbl. Schimmer, sehr reichblühend in Büscheln.
h. m.	479.	<i>Mlle. Favart</i> .
h. m.	275.	<i>Noisette d'Anjou</i> , mgr., milchweiss, s. reichblüh. in gr. Büscheln, sehr kräftig.
h. m.	559.	<i>Reine des massifs</i> , mgr., lachsgelb zuweilen kupferig.
h. m. n.	447.	<i>Réce d'or</i> (70), stark gef., breit gebaut, dkl. gelb bisweilen heller.
h. m. n.	55.	<i>Solfatara</i> (43), gr., gelblich weiss, Centrum dunkelgelb, s. wohlriechend; Laub glänzend; kräftig.
h. m. n.	277.	<i>Triomphe de Rennes</i> , canariengelb, Centr. leuchtendgelb.
h. m.	738.	<i>Unique jaune</i> , mgr., roth, kupferig, gelb.

d. Theerosen.

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben und hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

h. m. n.	812.	<i>Adrienne Christophle</i> , gr. s. voll, kupferfarben, aprikosengelb, pfirsichrosa nuancirt.
h. m. n.	287.	<i>Alba rosea</i> , (63), gr., weiss, Centrum rosa; s. wohlriechend.
h. m. n.	372.	<i>Anna Olivier</i> (73), fleischfarbig-rosa, Rückseite rosa, voll, gut gebaut; reichblühend.
h. m.	756.	<i>Beauty of Stapleford</i> , s. gr. schöne Form, blass nelkenrosa, Centr. dunkelrosa.
h. m. n.	456.	<i>Belle Lyonnaise</i> , (70) gr. dkl. canariengelb.
h. m. n.	703.	<i>Clothilde</i> , Bl. hortensienrosa, bisweilen violett, rosa oder roth, sehr variirend, sehr gross.
h. m.	795.	<i>Cornelia Kach</i> , gelb in weiss übergehend, in Amerika sehr viel kultivirt, zum Schneiden der Knospen.
h. m.	352.	<i>Duc de Magenta</i> (60), mgr., stark gef., kupferig fleischfarben; reichblühend.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Rosen.

h. m. n.	No.	Duchesse de Mecklembourg, dunkelrosa, strohfarben, gr., locker gefüllt, schalenförmig.
h. m. n.	838.	Enfant de Lyon, gr., gelb in strohgelb übergehend.
h.	798.	Homère, mgr., fleischf. w., lebhaft rosa gerandet.
h. m. n.	278.	Jean Ducher, lachsgelb, Centrum pfirsichroth, gr., gefüllt, kugelförmig, reichblühend.
h. m.	836.	Jean d'Arc, mgr., gef., hellgelb.
h. m. n.	410.	Gloire de Dijon, (58), gr., lachsgelb, s. reichblühend, s. gut rem., kräft. I.!
h. m. n.	6.	Helvetia, gr., lachsrosa, Centr. pfirsich-rosa.
h. m. n.	585.	Kaiserin Augusta, gr., gefüllt, zuweilen centifolienförmig, hellgelb mit dunkelgelb nüancirt.
h. m. n.	815.	Le Pactole, gr. gelbl. rahmweiss.
h. m.	704.	Letty Coles, lebhaft rosa, Wuchs kräftig.
h. m.	837.	Madame Azélie Imbert (72), gr., lachsgelb, s. schön.
h. m. n.	499.	" Bérard (71), gr., hell rosa, s. schön.
h. m. n.	540.	" Camille (72), gr., kirschroth mit weisslichen Reflexen.
h. m.	425.	" Céline Noirey (69), gr., zart rosa, Rückseite purpurroth.
h. m.	449.	" Charles, gr., gut gefüllt, schwefelgelb, in der Mitte dottergelb, sehr reichblühend.
h. m.	813.	" Damazain, flachsfbg., incarn., gr. voll, reichblühend, der Rose „Homère“ ähnlich.
h. m. n.	821.	" Denis, gr., schöne Form, w., leicht schwefelgelb.
h. m. n.	374.	" Descilligny, s. gr., gef., äussere Blumenbl. fleischfarben weiss, Centr. leuchtend, lachsfarbig nüanc.
h. m.	489.	" de Vetry, gr., dkl. rosa, sehr angenehm riechend.
h. m. n.	419.	" Doré, gr., gef., hellrosa.
h. m.	432.	" Emilie Dupuy (72), gr., schön schalen- oder centifolienförmig, gelb mit lachsfarbenrosa; ausgezeichnet!
h. m. n.	436.	" Falco, gr., nankinggelb in hellgelb übergehend; s. schön.
h. m.	417.	" John Taylor (76), s. gr., kupferig weiss.
h. m.	601.	" Jules Margottin, gr., vollkomm. Form, zart rosa mit lebergelb, Centr. dunkelroth.
h. m. n.	516.	" Levé, gelb, aussen lachsrosa nüancirt, gr., s. gef.
h. m.	824.	" Margottin, mgr., citronengelb m. pfirsichrosa im Centrum.
h. m.	430.	" Maurin, gr., gefüllt, weiss mit lachsrosa.
h. m. n.	459.	" Trille, gr., eigelb, in lachsgelb übergehend.
h. m. n.	707.	Mademoiselle Antonia Decarly (74) mgr., kapuzinergelb; ausgezeichnet!
h. m.	505.	" Marie Berton, (76), s. gr., strohgelb in weiss übergehend.
h. m. n.	655.	" Maréchal Niel, s. gr., dklgelb, becherförm., blüht spät, Holz nicht kurz zu schneiden. I.!
h. n.	307.	Marie Henriette, Bl. schön kirschroth, gr., gef., gut gebaut.
h. m. n.	868.	Mélanie Willermoz, sehr gross, voll und schön gebaut, weisslich gelb, carmin schattirt.
h. n.	814.	Mystère, gr., becherförm., rosa, netzfg. dkl. marmorirt.
h. m.	700.	Nyphetos, gross, fast gefüllt, rein weiss, beste weisse Winter-Treibrose, niedrig à St. I M.
h. m. n.	680.	Olympe de Freginay, mgr., hell schwefelgelb.
h. m.	513.	Perle des jardins, strohgelb, gr. zuweilen dunkel kanariengelb.
h. m. n.	553.	" de Lyon, gr., dunkelgelb, zuweilen aprikosengelb.
h. m.	708.	Safrane, glänzend, aprikosenfarben.
h. m. n.	709.	Sombrenil, weiss mit rosa und lachsfarben, gross, gefüllt, kräftig wachsend und in Dolden blühend, hart.
h. m. n.	869.	Souvenir d'un ami, s. gr., lachsfarben-rosa, schalenförmig, wohlriechend, reichblühend, kräftig.
h. m. n.	182.	Sulfureux, mgr., schwefelgelb.
h. m.	712.	Therese Loth, zart rosa, Centr. leuchtend.
h. m. n.	557.	Tantine, (75); gr., hellkirschroth in solferinroth übergehend.
h. m.	555.	Zilia Pradel, mgr., milchweiss.
h. m. n.	214.	

e. Moosrosen, Remontirende.

h. m. n.	502.	Deuil de Paul Fontaine, gr., dunkelpurpur mit feuerroth nüancirt.
h. m. n.	635.	Madame Landeau, mgr., schön hellroth, weiss punktirt, s. blühb. kräftig.
h. m. n.	414.	" Soupert (72), mgr., lehtd. kirschroth, s. bemoozt, s. blühbar.
h. m. n.	139.	Salet (Mad. Salet), gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.
h. m. n.	403.	Soupert et Notting, Blume sehr gross, leuchtend hellrosa, Centrum rosa.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Rosen.

f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

pr. St. 35 Pf. 100 St. 22,50 Mk.

No.	
843.	Abbé Miolan, purpurroth, mgr., leicht gefüllt, kugelig.
842.	Alfred Aubert.
845.	Bengalensis, mgr., leicht gefüllt, als Knospe recht schön.
841.	Bengalensis purpurea, mgr. dunkelpur.
339.	Cramoisi supérieur, leuchtend carmoisinroth.
411.	Ducher, mgr., gefüllt, rein weiss, sehr reichblühend.
335.	Eugène de Beaumais, mgr., purpur.
847.	Felleberg, carminrosa.
870.	Lawrenceana minima, (Caprice des Dames) kl., rosa, s. zierlich, reizende kleine Blume.
336.	" rosea, sehr klein, gefüllt, carmoisinrosa.
675.	Nemesis, schwärzlich purpur.
848.	Noisette.
850.	Prince Eugène, mgr., sammtig dunkelpurpur.
746.	Sanglant, gr., veränderlich roth, zuweilen nuaucirt.

Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt oder sind nur auszuschneiden.

g. Moosrosen.

	No.	
h. m. n.	193.	<i>A long peduncule</i> , mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Centifolienform, auf langen Stielen stehend, kräft.
h. m. n.	286.	Arthur Young, gr., dkl., purp., becherförmig.
h. m. n.	698.	Cristata, gr., schön rosa, mit gefranzten, kammartigen Kelchblättern, sehr schön!
h. m. n.	295.	(189) <i>Gewöhnliche</i> , gr., rosa, schön! wurzelicht.
h. m. n.	196.	Gloire des moussens, gr., fleischfarb. rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, stark bemost.
h. m. n.	42.	Marie de Blois, gr., hellrosa m. lilaschimmer, kugelförmig.
h. m. n.	694.	Weisse doppelte, (Blanche double).

h. Kletter- oder Prairierosen (R. rubifolio, arvensis etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben oder an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in der Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

	No.	
n.	521.	Amanda.
n.	520.	American Maid.
h.	n.	152. <i>Beauty of the prairies</i> , mgr., leicht gef., lilarosa. I.
h.	n.	347. Belle de Baltimore, kl., milchweiss mit gelbl. Schein.
h.	n.	522. Dundée Rambler, mgr., weiss mit röthlichem Rand, halb gef., in Dolden blühend.
n.	690.	Fanny.
n.	349.	Gracilis, (Boursaulti gracilis), mgr., leucht. rosa.
h.	n.	366. Grosse Rankrose, gr., hellrosa.
n.	519.	Linnean Hill Beauty.
n.	687.	Praesident, klein, hoch rosenroth, compact gefüllt.
n.	689.	Pride of Washington, lilarosa, sehr schön.
h.	n.	154. <i>Rouge</i> , gr., s. gef., mit weissl. Streifen, s. kräft. u. reichblühend. I.
h.	n.	69. <i>Ruga</i> , mgr., schalenförm., hell fleischf., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; sehr kräft., I.
n.	518.	Russels de Cottage.
n.	686.	Scandens, mgr., weiss mit fleischfarbenem Scheine; in Büscheln blühend.
n.	370.	Triomphe de la Duchère, mgr., weissl., rosa, flach, gut gef.
n.	688.	Triumphans.

i. Diverse.

	No.	
n.	671.	Maidenblush, weisse Centifolie.
n.	683.	Bicolor, (R. lutea), leuchtend orangeroth. Rückseite gelb. Alte bekannte Kapuzinerrose.
n.	338.	Burgundiana rubra, kl. dunkelviolet, rosa.
n.	684.	Braeteata. (R. lutea.)
n.	310.	Centifolia major, gr., rosa.
n.	311.	" minor, kleine Centifolie

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Rosen. — Ziergehölze.

	No	
n.	679.	Cinnamomea, Zimmetrose; roth, sehr früh blühend.
n.	685.	Fortune's double yellow, (R. lutea) gummiguttgelb m. erm. und lachsgelb.
n.	679.	Kaiserin des Nordens, (R. rugosa purpurea pl.) (s. Abbildung) gr., gef., purpurviolett; hübsche eigenthümlich mattgrüne Belaubung.
h. m. n.	48.	Madame Plantier, (R. hybr.) mgr., rein weiss, reichblühend I.
n.	658.	Pâquerette , kl. rein weiss, gef., von der Form eines Gänseblümchen's (Bellis perennis); Strauch zwergig, reichblühend; allerliebste!
h. m. n.	44.	Persian yellow, (R. lutea) , mgr., goldgelb, blüht nur an d. Spitzen d. vorjährigen Zweige.
n.	682.	Rugosa, (s. Abbildung) gr., einf., carmoisin rosa, remont. grosse Früchte, herrliches Laub.
n.	783.	„ alba, mgr., weiss.



Rosa rugosa.



Rosa rugosa purpurea plena,
„Kaiserin des Nordens.“

Sortiment der Ziergehölze.

Die Sortimente gelten nach meiner Wahl und sind die gewöhnlichen Sorten nicht inbegriffen.

Besonders starke und schöne Exemplare werden zu erhöhten Preisen verkauft.

Weniger als 10 Stück werden zu Partiepreisen nicht abgegeben.

Was hundertweise vorrätbig ist, ist hinter der Preiskolonne mit * bezeichnet und wird nach dem 10 Stückpreise berechnet.

Abkürzungen:

h. = halbbüchtrig (weiss, gelb, roth oder silbergrau).
h. i. = halbhimmgrün.
i. = immergrün.
P. = Pyramide.
T. = Trauerbaum.
§ = Schlingpflanze.

* = Pflanzen, die etwas geschützten Stand verlangen.
☞ = Pflanzen, die empfindlich sind und im Winter trocken bedeckt werden müssen.
I, II, III, IV = Baum 1ter, 2ter etc. Grösse.
V, VI, VII, VIII = Strauch 5ter, 6ter etc. Grösse.

A. Laubhölzer.

(Siehe auch *Alleebäume* und *Gehölzsämlinge*.)

Acer *l.* *Ahorn* 1 Sortiment v. 12 Sorten a 1 St. M. 10.



Acer Ginnala.

Erste Gruppe.

Nr.	Acer Ginnala.	perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
10	circinatum, Pursh., Rundblättriger A. VI.	1,—	—	—
11.	Ginnala , Max, (A tataricum laciniatum. Rgl.) s. Abbildung) mit weit ausgezackten Blättern, aus Sibirien. Sehr elegant V 1—2 m. hoch Hochstämme	—,80 1,75	7 16	+ —
34.	italum , Lauth (= opulifolium, Vill.), schön u. umsomehr zu empfehlen, als er unsere kältesten Winter aushält	1,—	—	—
12.	marcophyllum, Prsh, Grossblättriger, von schönem Effect, N. Amer. III.	—,60	5	—
13.	pennsylvanicum L., (-striatum) Lam Pennsylvanischer Ahorn Mit hellgrüner, weiss gestreifter Rinde.	1,—	9	—
1.	Pseudoplatanus, L. Stumpfblättriger (Weisser oder Platanen-Ah.) II. (s. auch Alleebäume)	—,50	4	+
b. 2.	bicolor , Späth, weissbunt gefleckt und marmorirt, eine hier entstandene sehr schöne Varietät.	1,—	9	—
	Hochstämme	1,75	16	—
b. 103.	corstorphinensis , Hrt. angl, s. Neuere Gehölze	1,50	—	—
4.	erythrocarpum , S. L. Rothfrüchtiger. III, die grossen rothen Früchte heben sich sehr effectvoll von dem dunkelgrünen Laube ab	1,—	9	—
	Hochstämme M 2 bis	4,—	—	—
55.	euchlorum , Späth, wie die Krimmlinde (Tilia euchlora) unter den Linden, so zeichnet sich diese Varietät unter den Ahornsorten durch die herrlich dunkel- grüne Farbe der älteren Blätter, die überdies noch grösser und weniger eingeschnitten sind, als die der Stammart, aus, während die jungen Blätter leuchtend hellgrün sind	—,80 1,75	7 16	— —
7.	insigne , Späth, s. Neuheiten. 1 jährige Veredlungen	1,—	—	—
	mehrfährige	2,—	—	—
	Hochst.	2,50	—	—
58.	fol. atropurpureis , Späth, s. Neuheiten. 1 jähr Veredlungen	1,—	—	—
	2—3jähr. Hochstämme	2,50	—	—
b. 5.	fol. purpureis , Hrt., purpurblättriger, auf der Unterseite der Blätter roth, macht Effect, besonders als Hoch- stamm II., III (s. auch Alleebäume) 1—2 m. hoch	—,75	6	+

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

[illegible]

Ziergehölze.

No.		perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrähig
Aesculus.				
b. 6.	Hippocastanum Memmingeri, Memminger's mit punktirten Blättern	1,—	9	—
5.	" umbraeulifera, Hrt., Schirmartige	2,50	20	—
32.	pumila fl. pl., Gefüllte Zwerg-K.	3,—	—	—
7.	rubicunda , Lodd., (carnea Willd), Rothblühende: blüht jünger und 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III. IV. (s. auch Alleebäume)	2,—	—	—
9.	" coccinea; dunkelroth	1,—	9	"
33.	" flore purpureo , purpurrothe	3,—	—	—
	" flore purpureo , purpurrothe	2,—	—	—
b. 8.	" fol. marg. Hrt., Blätter schön gelb gerandet	3,—	—	—
	" fol. marg. Hrt., Blätter schön gelb gerandet	1,50	—	—
b) Pavien (Pavia)				
14.	mit meist glänzenden Blättern und schwächerem Wuchse			
15.	glabra, Willd., Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer. IV. V.	1,—	9	—
16.	" Ohioensis, D. C., Glattblättrige von Ohio	2,50	—	—
17.	" pallida, Willd., Glatte weissliche	1,25	10	—
18.	humilis, Lodd. (= pumila Willd.), niedrige Blüthen rosa mit gelb	1,—	9	—
19.	hybrida, D. C., (= discolor. Prsh.) gelblich rosa, Kelch dunkelroth	1,25	10	—
20.	lutea , Wangerh. (Pavia flava, Münch), Gelbblühende; V	1,50	6—10	"
28.	Lyoni, Hrt. Pavie von Lyon	2,50	9—22	—
	macrostachia , Mchx. (parviflora, Walt.), Strauch-P., blüht in grossen weissen Rispen im Hochsommer	1,50	12	—
21.	rubra, Poir., Blätter dunkelgrün, rothblühend	1,—	9	—
23.	marylandica, Bth. C., P. von Maryland	1,—	9	—
24.	Pavia astrosanguinea, Dunkelblutrothe P.	1,25	10	—
25.	" coriacea, Hrt., Lederblättrige P	1,25	—	—
27.	" mutabilis, Spach., Veränderliche P; Kelch rosa, Krone gelb versicolor, verschiedenfarbig blühend, Kelch lebhaft roth	1,—	—	—
	" versicolor, verschiedenfarbig blühend, Kelch lebhaft roth	1,25	—	—
Ailanthus, Desf., Götterbaum.				
1.	glandulosa, Desf., Aechter; m. sehr grossen, gefiederten Blättern, schö- ner Baum IV	—,50	4	"
Akebia, Dne., Akebie.				
S. 1.	quinata (Rajania), Thunb., ein feinblättriger, lianenartiger Kletterstrauch mit violetten Blüthen, hat hier seit vielen Jahren ohne Winterdecke im Freien ausgehalten	1,50	5½	"
2.	Ainus, Gärtz., Erle, (Else) 6 Sorten à 1 St. M. 6			
4.	barbata, C. A. Mey., Bärtige; von den einheimischen Arten sehr ab- weichend, hübsch, III	1,—	—	—
6.	cordata (Betula) Lois., Herzblättr. E; Italien IV	1,—	9	—
b. 7.	glutinosa, L., Roth-E.; II, III	—,40	3½	"
9.	" fol. var., Gelbbuntblättrige R.-E.	1,—	9	—
	" imperialis , Hrt. Kaiserlich R.-E., sehr zierlich geschlitz- IV	2,—	6—18	"
11.	" quercifolia Willd., Eichenblättrige E.-R.	1,50	—	—
35.	" rubrinerva Hort., Rothnervige Erle, junge Triebe braun	1,—	—	—
29.	" sorbifolia, Hrt., ebereschenblättrig; s. hübsch	1,25	—	—
30.	" tinctoria, Hort., Färber-Erle	1,25	—	—
14.	incana, Willd., Weiss-Erle, Nordische Erle, III (s. auch Alleebäume) 2½—3 m. h.	—,75	6	—
17.	" laciniata Hrt., Geschlitzte W.-E. wohl die schönste aller Erlen, III	2,—	6—18	"
33.	" monstrosa , Späth, s. Neuheiten, 1jährige Veredlungen mehrfährige	1,—	—	—
19.	" plicata, Hrt., faltigblättrig	2,—	—	—
20.	" sublaciniata Hrt., halbgeschlitzte	1,50	—	—
13.	japonica, S. & Z. Harinoki E. niedrig, Blätter glänzend, länger und schmäler als bei den übrigen Sorten	1,25	—	—
32.	macrophylla, Desf., sehr schöne grossblättrige Erle	1,50	—	—
28.	Oregona , Nutt., Oregon-Erle; hübsche Belaubung	1,25	—	—
23.	ovata , Hrt. nec Lodd., eiförmige mit kleiner, rundlicher, zierlicher Be- laubung	1,25	—	—

Ziergehölze

No.	Alnus.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
24	<i>rugosa</i> (Bet.) Ehrh. (= serrulata Willd) rauhe	1,—	—	—
25.	<i>sibirica</i> , Fisch., sibirische F.	1,25	—	—
	Amelanchier, Med. Felsenbirne.			
1.	<i>alnifolia</i> (Aronia). Nutt., Erlenblättrige F.	1,25	—	—
2.	<i>canadensis</i> , (Mespil), L., (Amel. Botryapium, D. H.), Kanadische F; im Herbst schön rothblättrig V	—,60	5	—
4.	<i>rotundifolia</i> (Crataeg.), Lam. (Mespil-Amelanchier, L.); Gemeine F.; blüht sehr früh, V, VI	—,30	2 1/2	—
	Amorpha, L. Uniform; alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, und werden ziemlich hoch			
8.	<i>fruticosa</i> , L., Strauchartig; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr schönen Effect, gedeiht auch auf schlechten Sandboden gut VI, VII stark	—,30	2 1/2	—
	Ampelopsis, Mex., Jungfernwien.			
5.	<i>hederacea</i> , Hrt., Aechter Klimmer, braucht nicht angebunden zu werden, sondern klimmt wie der Epheu an Mauern	—,60	5	—
11.	" <i>minor</i> , Hrt.	—,60	5	—
1.	<i>hirsuta</i> , Donn., Rauher Jungfernw., s. schön dunkelgrün, grossblättrig M 0,40 bis	—,75	3—4	—
2.	<i>quinquefolia</i> , Mex., Wüder Wein, extra starke, ca 2 Mtr. lange Pflanzen mit 5-7 Ranken schwächere, ca. 1 m hoch	—,75 —,30	6 2 1/2	—
3.	" <i>dissecta</i> , Hrt., hübsche, zierliche Belaubung	—,75	6	—
10.	" <i>serrata</i> , Hrt scharf gezähnt	,75	6	—
12.	<i>virginiana</i> , herzförmig gel. Blätter, sehrzierend. Virginien	1,—	9	—
	Amygdalopsis, siehe Prunus triloba.			
	Amygdalus L., Mandel, Pfirsich.			
510.	<i>communis</i> fl. pl. Gemeine, gefüllt blühende, hart, mit reizenden Blüten	1,—	9	—
b 507	" <i>fol</i> var, Hrt. gemeine buntblättrige	2,—	—	—
508	<i>georgica</i> , niedrig bleibend	1,—	9	—
509.	<i>persicoides</i> , Ser., Pfirsich-Mandel	1,25	10	—
515.	<i>Persica Davidiana alba</i> , Hrt, s. neuere Gehölze.	2,—	—	—
* 502.	" <i>dianthiflora</i> pl., Gef. nelkenblüthige Pf.	2,—	15	—
500.	" <i>fl. pl.</i> , Gefülltblühende Pf.; die härteste Sorte mit grossen hübschen röschenähnlichen Blumen.	1,50	13	—
506.	" <i>fol. purpureis</i> , Purpurbllättrige, Pf. hart u. recht constant. Die Farbe bleibt auch im Sommer purpurroth, die Früchte sind ganz dunkelroth M. 1,50 bis	2,—	13	—
* 503.	" <i>rosaeflora</i> pl, Gef. rosenblüthige Pf	1,50	13	—
	Aralia, L., Aralie.			
1	<i>chinensis</i> , L., (japonica. Hrt. = <i>Dimorphanthus mandschuricus</i> , Max.) M. 1 bis	1,50	9	—
4.	<i>Maximowiczii</i> , v. H., (<i>Acanthopanax ricinifol.</i> Dec et Planch) . . .	2,—	—	—
	Aristolochia L., Osterluzei Pfeifenwinde).			
1.	<i>Sipho</i> L'Her., Grossblättrige M 1 bis	2,—	9—18	—
	Armeniaca , s. <i>Prunus Armeniaca</i>			
	Atrophaxis lanceolata , L., (Rgl)	2,—	—	—
	Aukuba japonica in Töpfen			
21.	<i>angustifolia</i> 14 <i>longifolia dentata</i>			
22.	<i>arborea</i> 24. " " varieg			
6.	<i>dentata</i> varieg 11. <i>macrodontha</i> "			
5.	<i>fol. aur marg</i> 7. <i>maculata</i>			
20.	<i>grandidentata</i> varieg 16. <i>punctata</i>	1,25	10	—
10	<i>hermaphrodita</i> 9. <i>pygmaea</i>			
3.	<i>himalayca</i> 8. <i>salicifolia</i>			
2.	<i>latimaculata</i> 17. <i>viridis femina</i>			
1.	<i>longifolia</i> 4. " <i>vera</i>			
	In schönem Rummel	1,—	8	—
	Aronia, s. Sorbus.			
	Azalea, L., Azalee.			
	<i>mollis</i> , Bl. (A sinensis Lodd.), sehr schöne harte Species! In ge- mischten Farben, starke Pflanzen M. 1,50 bis	2,50	10—20	—

Ziergehölze.

No.	Azalea.	perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
	<i>pontica</i> , L., Pontische A. starke Pflanzen in den schönsten Farben, weiss, gelb und roth gemischt M. 1.25 bis	2,50	10—20	*
	Berberis , L., <i>Berberitze</i> (Sauerdorn), 8 Sorten à 1 St. M. 5.			
	a) Mahonien fiederblättrig, immergrün.			
i. 1.	<i>Aquifolium</i> , Prsh., Gemeine M. VII. ein sehr zierender und harter Strauch mit grossen gelben Blüthentrauben, starke Pflanzen, auch zu feinen Zierhecken empfehlenswerth M. 0.40 bis	—,75	8 $\frac{1}{2}$ —6	*
	b) Aechte Berberitzen.			
10.	<i>amurensis</i> , Rgl., vom Amur	1,25	—	—
14.	<i>coriacea</i> , Hrt., kleinblättrige B.	1,25	—	—
15.	<i>cretica</i> , L., Kretaische B. feine, zierliche Belaubung	1,50	—	—
37.	<i>heteropoda</i>	1,—	9	—
17.	Jacquin, Hrt., Jacquin's, B.	1,—	—	—
3.	<i>japonica</i> (Hlex Thieb., Berberis Beali Fort.) Japanische B., als Solitair- pflanze auf Rasen von reizendem Effect	1,50	—	—
39.	<i>integerrima</i> , Bge., aus Turkestan, mit auffallend schöner Belaubung, graugrün, glänzend	1,50	—	—
20.	<i>macrophylla</i> , Hrt., Grossblättr. B., sehr glänzendes Laub	1,—	9	—
21.	<i>microphylla</i> , Förster (= <i>dulcis-buxifolia</i>) buchsblättrige B., sehr schön	—,75	6	—
h. i. 35.	" <i>serrata</i> , Hrt., Gesägt-kleinblättr. B., wohl die zierlichste aller Berberitzen mit kleinen, scharfgesägten Blättern und orange gelben Blüthen	1,25	10	—
h. i. 22.	<i>Neuberti</i> , Hrt. Bolbr., Neubert's B., sehr schön grossblättrig mit glänzenden, elegant gezähnten Blättern, Bastard von Berb. <i>Aquifolium</i>	1,—	—	—
24.	<i>sinensis</i> , Desf., (B. <i>monosperma</i> , H.) Chinesische B.	—,75	—	—
25.	<i>vulgaris</i> , L., Gemeine B. VI, VII. Die rothen Beeren werden zum Einmachen benutzt	—,25	2	*
b. 26.	" <i>fol. atropurpureis</i> , Hrt., Purpurblättrige B., mit sehr dunkel- purpurfarbigen Blättern, schön, VI, VII, auch zu Hecken zu empfehlen	—,40	3	25
	Betula , L., <i>Birke</i> . 10 Sorten à 1 Stück M. 8			
1.	<i>alba</i> L., (B. <i>odorata</i> , Bechst.), Gemeine Weiss-B., III, s. auch Allee- bäume	—,40	3	*
P. 7.	" <i>fastigiata</i> , Hrt. Bolbr., Pyramiden-W-B. , streng pyra- midal wie die Italienische Pappel	2,—	—	—
T. 21.	" <i>laciniata</i> , Hrt., Geschlitzblättrige W-B., eine ausserordent- lich zierliche Art mit etwas hängenden Zweigen	1,25	10	—
	Hochstämme	2,—	—	—
b. 40.	" <i>purpurea</i> , Hrt., Purpurblättrige W-B., eine der besten Neuheiten , die in den letzten Jahren in den Handel kamen. Sie ist von hervorragendem landschaft- lichen Werth und ersetzt in den Gegenden, wo die Blutbuche nicht gut gedeiht, dieselbe vollständig Hbst. u. Pyramiden ca. 1—2.50 m. hoch M. 0.75 bis	2,50	6—22	100
	Hochst. M. 1.50 bis	3,50	12—30	150
6.	<i>excelsa</i> Ait., hohe B., starkwüchsig schön, II	2,—	—	—
8.	<i>fruticosa</i> , Pall., (B. Gmelini, Bge.), Strauchartige B., VI. M. 0.75 bis	1,50	6—12	—
	Hochstämme	2,—	—	—
34.	<i>humilis</i> , Schrank, niedrige Birke	1,25	—	—
11.	<i>macrophylla</i> , Hrt., Grossblättrige B.	1,50	—	—
15.	<i>papyracea</i> , Ait., Papier-B.	1,50	—	—
16.	" <i>grandis</i> , Bth. C., Grossblättr. Papier-B., starkwüchsig, II, III.	1,25	10	—
31.	<i>persicaefolia</i> , Bth. Cat., pfirsichblättrige B. Die Belaubung schöner als die der meisten übrigen	1,50	—	—
19.	<i>pirifolia</i> , Bth. C., Birnblättrige Papier-B., mit dunklem Laube	1,—	—	—
20.	<i>populifolia</i> , Ait., Pappelblättrige B.	—,75	6	—
22.	<i>pubescens</i> , Ehrh., Brocken-B.	—,75	—	—
23.	" <i>asplenifolia</i> , Hrt., Bl. ungleich scharf gesägt (Farnbl.)	1,25	—	—
42.	" <i>fol. var.</i> , Hrt., weissbuntblättrig, 1—2 m.	2,50	—	—
36.	<i>Soccołowi</i> , Hrt., in der Art wie <i>fruticosa</i>	1,—	—	—

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Ziergehölze.

No.		perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Betula.				
T. 27	<i>tristis</i> , <i>Hrt.</i> , Trauer-B., alte Rinde weiss, eine gut hängende Sorte; III, IV. M. 0,75 bis	2,50	—	—
32	<i>ulmifolia</i> , <i>S. et Z.</i> , (= <i>costata</i> Trautv.), Japan, Mandschurei, schöner Baum mit braunrothem Stamme, gegen Kälte nicht empfindlich	1,25	10	—
T. 29	<i>verrucosa pendula</i> , <i>Hrt.</i> , warzige Hängebirke M. 1,00 bis	1,50	—	—
Bignonia s. <i>Catalpa</i> und <i>Tecoma</i>				
Borya , <i>Willd.</i> , (Forestierra), Borya oder Forestiere				
1	<i>ligustrina</i> (<i>Adelia</i>) <i>Mex.</i> , Rainweidenblättrige B.	—,50	4	35
Broussonetia , <i>Vent.</i> , Papierbaum				
* 1	<i>papyrifera</i> (<i>Morus</i>) <i>L.</i> , Aechter, mit feigenähnlichen, graugrünen Blättern, schöne Decorationspflanze, VI, VII, 1—1,50 m. hoch, M. 0,60 bis	1,25	5—10	—
Buddleja , <i>L.</i> , Buddleie				
5	<i>curviflora</i> , <i>Hook et Arn.</i> , krummblüthige B.; Japan, sehr reichblühend	—,50	4	—
3	<i>insignis</i>	1,25	—	—
1	<i>Lindleyana</i> , <i>Fort.</i> , niedriger Strauch mit lila Blüthen	—,50	4	—
Buxus , <i>L.</i> , Burbaum.				
i. 1	<i>arborescens</i> , <i>Lam.</i> , (<i>B sempervirens</i> , <i>L.</i>), Ge- meiner baumartiger B., VI, wird trotz seiner sehr zierenden Eigenschaft noch viel zu wenig angepflanzt. Die in der hiesigen Baumschule vermehrte Varietät leidet selbst bei — 24° R. nicht. Für grosse Städte besonders auch zu empfehlen, da er gegen Rauch und Staub unempfind- lich, auch im Schatten und hoch um- bauten Gärten gut gedeiht . M. 0,30 bis 1,00 m. hoch M. 0,75 bis 0,50—1,50 m. hohe schöne Pyramiden , M. 1,75 bis	3,—	7—27	(60—250)
	Hier von sind schön und gleichmässig geschnittene Pyramiden zu Tausenden vorräthig.	6,—	15—55	140—500
i. b. 2	" <i>fol. arg. marg.</i> , Weissrandiger, VII	1,—	9	—
i. 8	" <i>Handsworthii</i> , <i>Hrt.</i> , B. von Handsworth	1,—	9	—
9	" <i>latifolia bullata</i> , 1jähr. in Töpfen	—,75	6	—
10	Buxbaum-Pyramide , " <i>nova</i> , neuer, breitblättriger B., 0,20—0,60 m. hoch M. 1,25 bis	2,—	10—18	—
24	<i>arborescens</i> <i>ledifolia</i> , junge Pflanzen in Töpfen	1,—	9	—
i. 3	" <i>macrophylla</i> , <i>Hrt.</i> , Grossblättriger, 0,30—1,50 m. h. Pyr. M. 1,— bis	5,—	9—45	—
i. 23	" <i>glauca</i> , 40—50 cm. hoch M. 1,50 bis	2,—	12—18	—
i. 4	" <i>myrtifolia</i> , Myrtenblättriger, sehr hübsch, für Winter- Bouquets anstatt Myrten zu verwenden, 0,50—0,90 m. hoch, M. 1,75 bis	5,—	16—45	—
12	" <i>pyramidalis</i> , 0,10—0,30 m. hoch M. 1,00 bis	1,50	9—13	—
13	" <i>salicifolia elata</i> , junge Pflanzen	1,—	9	—
15	" <i>undulaefolia</i> , "	1,—	9	—
20	<i>balearica</i> , junge Pflanzen in Töpfen	1,—	9	—
i. 16	<i>Fortunei macrophylla</i> , 0,40—0,50 m. hoch M. 1,50 bis	2,—	—	—
i. 18	<i>microphylla</i> , kleinbl. B., 20—50 cm. hoch M. 1,— bis	2,—	9—18	—
19	" <i>fol. arg.</i> , junge Pflanzen in Töpfen	1,50	—	—
i. * 6	<i>subglobosa</i> , <i>Hrt.</i> , Kugelförmiger B., bleibt niedrig M. 0,75 bis	1,50	7—13	—
i. 5	<i>suffruticosa</i> , <i>Willd.</i> , Gemeiner standiger B., beliebt zu Einfassungen, p. laufenden Meter (aus 1 m. lassen sich ca. 3 m. legen)	—,75	6	—
15	" <i>aurea</i> , junge Pflanzen	1,—	9	—
21	" <i>thymifolia</i> , junge Pflanzen	1,—	9	—
Callicarpa , <i>L.</i> , Schönfrucht.				
	<i>japonica</i> , <i>Thunb.</i> , Japanische Sch., im Juli weissblühend	30	5	—
Calophaca , <i>Fisch.</i> , Schönlinse.				
	<i>wolgarica</i> , Wolgarische Sch. (<i>Cytis. wolg. L.</i>) Blüthen schön karmoisin- roth, hübsche Steppenpflanze, junge Mittelstämme	1,50	12	—



Ziergehölze

No.		perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
	Calycanthus, L., Gewürzstrauch.			
1.	floridus, L., Reichblühender, die braunen Blüten haben einen starken, melonenähnlichen, herrlichen Geruch	1.—	9	—
	Caprifolium, s. Lonicera.			
	Caragana, Lam., Karagane (Erbsenbaum) 10 Sorten à 1 Stück M. 8.			
	Alle besitzen zierliche gelbe Schmetterlingsblüthen im Früh-Sommer.			
1.	arborescens, Lam., Baumartige K., V starke Sträucher.	—,30	2	*
2.	" nana, Hrt., Niedrige K., kugelförmig VII., VIII.			
	Hochst. und Mittelstämme	1,50	—	—
T. 3.	" pendula, Hrt., Trauer-K., 1½—2 m. hohe Stämme M. 1,25 bis	2,50	11—20	*
12.	" " starke über 2 m. hohe Stämme mit starker Krone M. 2 bis	3,50	18—30	—
4.	Chamlagu, Lam., Chinesische K. Hochstämme	1,50	12	—
6.	glomerata, Hrt., Büschelblättrige K., Laub dunkel, VII . . . M. 0,50 bis	1,25	—	—
9.	microphylla, Lam., kleinblättrige K., VII M. 1 bis	1,50	—	—
T. 11.	pygmaea arenaria, Fisch., (gracilis, Hrt.) Hochst. M. 1,25 bis	1,50	—	—
12.	" mollis, Bess., (C. frutescens mollis, D. C.), Weichhaarige Zw.-K., Hochstämme M. 1 bis	1,50	—	—
13.	Redowski, D. C., Redowski's K., mit langestielten Blüten M. 1 bis	1,50	—	—
14.	spinosissima (Robinia), Lam., (C. spinosa; D. C.), Dornige K., Hochstämme M. 1 bis	1,50	—	—
	Carpinus, L., Weissbuche (Hainbuche), s. auch <i>Ostrya</i> .			
1.	americana, Willd., amerikanische W.	1,—	9	—
2.	Betulus, L., Gemeine W. (s. auch unter Heckenpflanzen), Pyramiden ca. 1½—2 m. hoch	—,50	4	—
3.	" Carpinizza, Kit., Karpinizza-W. M. 1 bis	2,50	9—18	—
9.	" fastigiata, Hrt., Pyramiden-W. M. 1 bis	1,50	9—13	—
b. 4.	" fol. arg. var., Hrt., Weissbuntblättrige W., Pyramiden M. 1 bis	2,50	—	—
5.	" fol. purpureis, Hrt., Purpurröthliche W., Pyramiden M. 1 bis	2,—	9—18	—
6.	" quercifolia, Desf., (C. B. fol. incisis, Desf.), Eichenblättrige W.; zierlich M. 1 bis	1,50	9—13	—
T. 7.	" pendula, Hrt., Trauer-W. M. 1 bis	2,50	9—18	—
	Carya, Nutt., Hickory , werden alle ziemlich hoch, machen gerade Stämme und haben schön gefiedertes Laub.			
3.	amara, Nutt.	0,50	4	*
5.	olivaeformis, Mrrsh. (Jugl. illinoensis Wangh.)	0,50	4	*
6.	porcina, Nutt. (Jugl. glabra Mill.)	0,50	4	*
8.	sulcata, Nutt. (Jugl. cordiformis Wangh.)	0,50	—	—
9.	tomentosa, Nutt., (Jugl. alba, Mill.), Vexir-H. M. 0,75 bis	1,25	—	—
	Castanea, Mill., Essbare Kastanie (Marone)			
4.	vesca, Gärtn. (C. sativa, Mill.), Aechte Kastanie	—,75	—	—
b. 14.	" albo marginata, sehr schön weissberandete Varietät	2,—	—	—
8.	" dissecta, Hrt., zerschlitztbl., sehr zierlich	1,50	—	—
12.	" heterophylla filipendula, verschiedenartige, fadenförmige Blätter, sehr originelles Aussehen	1,50	—	—
3.	pumila, Willd., Zwerg- oder Chincapin-Kast., blüht schon als junge Veredlung sehr dankbar und trägt reichlich Früchte	1,50	—	—
	Catalpa, Scop., Trompetenbaum.			
5.	Bungei, C. A. May, Bunge's T., gedrungener als C. Kämpferi, sonst sehr ähnlich	—,75	—	—
3.	Kämpferi, S & Z Japanesischer	1,—	—	—
2.	" nana Hrt. (= Wallichii Hrt.)	1,—	—	—
7.	speciosa, Neuheit aus Nordamerika, wird auch als Waldbaum empfohlen und hält unsere Winter gut aus, sehr stark, M. 0,50 bis	1,50	4—12	*
	" Hochstämme, sehr effectvoll einzelne auf Rasen	1,75	—	—
1.	syringaeifolia, Sims., (C. biguonioides, Walt.), herrliche, grossblättrige Dekorationspflanze, vorzüglich schön, wenn sie im August mit ihren grossen rostkastanienähnlichen Blütenrispen geziert ist. Sehr starke Büsche M. 0,50 bis	1,50	4—12	—
	" Hochstämme, sehr effectvoll	1,75	—	—
4.	" aurea, Hrt., mit goldgelben Blättern, prachtvoll. M. 1 bis	2,—	9—18	—
8.	Thunbergi, Hrt., Thunberg's T., ähnlich No. 5	—,75	6	—

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
	Ceanothus, L., Säckelblume, alle blühen im Sommer sehr reich, wunderschöne Bouquetblume!			
1.	americanus, L., Amerikanische, VII, blüht silbergrau	— 30	2	+
3.	„ Arnouldi, Hrt., hellblau	1,—	—	—
6.	roseus, rosafarben	1,—	—	—
	Celastrus, L., Baummörder.			
1.	scandens, L., Kletterader B., Stark wuchernde Schlingpflanze, sehr stark M 0,60 bis	1,—	5—9	+
	Celtis, L., Zürgelstrauch, gedeihen am besten halbschattig.			
1.	Audibertiana, Spach,	1,—	9	—
2.	australis, L., Südlicher Z., IV. V.	— 50	4	—
4.	occidentalis, L., Nordamerikan. Z.	— 60	5	+
	Cephalanthus, Kopfblume.			
1.	occidentalis L., Abendländische K.	— 75	6	—
	Cerasus s. Prunus			
	Cercis, L., Judaslinde			
1.	canadensis, L., N. Amerika	— 75	6	—
2.	Siliquastrum, L., Gemeine J.	— 60	5	—
	Chaenomeles s. Cydonia japonica.			
	Chamaecerasus s. Lonicera			
	Chionanthus, L., Schneeflocke.			
1.	virginica, L., Virginische S., mit grossen, weissen Blütenrispen im Juni; muss jung bedeckt werden, VII. sehr zu empfehlen . .	1,—	9	+
	Cladrastis, Raf., Gelbholz (Virgilie).			
1.	amurensis, (Maackia) Rupr. M 0,75 bis	1,50	—	—
2.	lutea (Virgilia), Mchx., Aechtes G., VI., zierlich belaubt . . M. 0,75 bis	2,50	6—20	—



Clematis-Bouquet.

Ziergehölze.

No		Clematis,		
		per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
14.	<i>appiifolia</i> , DC.; weiss, wächst sehr üppig	—,75	6	—
16.	<i>brasiliensis</i> , hell-lila m. weissem Band, oft gef.	1,—	—	—
18.	<i>coerulea odorata</i> , Hrt., kl. röthlich-violett, ausserordentlich reich- blühend von prächtigem Wohlgeruch; nicht rankend	1,50	13	125
177.	<i>Flammula fragrans</i> , Ten., in Rispen dankbar weiss blühend, wenig rankend, mit lanzettlichen, gefiederten Blättern. Voll- kommen winterhart	—,75	6	50
6.	<i>fusca</i> , Turcz., eigenthümliche, graubraune Färbung, glockenförmig	—,60	5	—
26.	<i>Hendersoni</i> , Hrt. (Chandleri, Hrt. brit.), klein, glockenförmig, blau	—,50	4	35
29.	<i>integrifolia</i> , L., dunkel-veilchenblau, glockenförmig, Staude	—,50	4	—
30.	<i>intermedia</i> , blau, nicht rankend	—,50	4	35
37.	<i>montana</i> , Ham., Himalaya-Gebirge. Sehr stark rankend	—,50	4	—
104.	" <i>grandiflora</i> , weiss, sehr starkwüchsig zur Bekleidung von Häusern und Lauben zu empfehlen	—,50	4	35
111.	<i>paniculata</i> , Thunb. (<i>Vitalba japonica</i>), weiss, wohlriechend; blüht im September	—,75	6	—
10.	<i>songarica</i> , Bnge. (soongarica Jackm.), weiss, feine, hellgrüne Be- laubung, nicht rankend; <i>selten!</i>	1,—	—	—
8.	<i>stans</i> , Sieb. et Zucc., Straudenartige C. Mit sehr breiten, dunkel- grünen, gedrehten Blättern; mit hell-lila, röhrig-glocken- förmigen Blüthen	1,—	9	—
3.	<i>Vitalba</i> , L., Gemeine Waldrebe, weiss	60,—	5	45
4.	<i>Viticella</i> , L., Italienische Waldrebe, blau, sehr reichblühend, glocken- förmig M. 0,50 bis	—,75	4—6	35—50
5.	" <i>rubra</i> , röthlich	—,75	6	—
2.	<i>virginiana</i> L., vollkommen winterhart, wächst noch schneller u. wird grösser als die gemeine Waldrebe C. <i>vitalba</i> , der sie in der Blüthe ähnlich ist, Zur Bekleidung von Häusern zu empfehlen.	—,50	4	35

Grossblumige Varietäten.

Vorrath 50000 Stück.

Das hiesige Sortiment dieses schönen, noch viel zu wenig verbreiteten Schlingstrauches, ca. 200 Sorten umfassend, ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die mannigfaltigsten, besten und neuesten Varietäten.

Die angeführten Preise gelten für mehrjährige Veredlungen in Topf- und Freilandpflanzen.

Extra starke, ca. 1½—2 m. hohe Freilandpflanzen p. Stück M. 0,50, p. 10 Stück M. 4,— theurer.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Stück 9 M.

100 Stück nach meiner Wahl in 10—15 Sorten M. 70.

50 " " " " " 10—15 " " 40. } In Topf- u. Freilandpflanzen,
25 " " " " " 10—15 " " 22½. } Frühjahrs- u. Sommerblüher.

No				
		per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
	Rummel , starke Landpflanzen, aus den besten, grossbl., dankbar blühenden Varietäten	—,75	6	50
162.	<i>Alba magna</i> , reinweiss, wohl die zarteste der frühen Lanuginosa- Varietäten	2,—	18	—
131.	<i>Albert Victor</i> , lavendelblau m. hellerem Rande	—,75	6½	50
145.	<i>Alexandra</i> , hell röthlich violett	1,25	—	—
146.	<i>André Leroy</i> , glänzend violett, 14 cm. breit, schöne Form	2,—	18	—
171.	<i>Angelina</i> , gefüllt, hellblau	2,50	—	—
15.	<i>Aureliana</i> , porzellanblau, grbl.	1,—	9	—
101.	<i>Bélisaire</i> , hell violett m. breiten hellen Bändern, sehr hübsch	1,25	11	—
163.	<i>Blue Gem</i> , blassblau, in tief seidenviolett übergehend	1,50	12	100
100.	<i>Candidissima plena</i> , weiss	1,—	9	—
159.	<i>Claude de Lorrain</i> , dunkelviol. fast gefüllt, kugelförmig	1,50	12	—
167.	<i>Coccinea</i> , aus Texas eingeführt, Blumenglockenförmig, brillant hochroth	2,—	18	—
139.	<i>Duchess of Edinburgh</i> , rein weiss gefüllt, die beste gefüllte weisse C.	2,50	20	—
108.	<i>Duke of Buccleugh</i> , tiefblau, im Verblühen blass lila, runde Blume	—,75	6	50
125.	" <i>of Edinburgh</i> , reich dkl. purp.-viol; eine der prächtigsten blauen	1,25	11	100

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
Clematis.				
154.	Duke of Norfolk, tiefblau, mit breiten, hellen Bändern; neu!	1,50	13	—
157.	Duchesse de Cambacères, himmelblau, gross und schön	1,25	11	—
158.	Edith Jackmann, weiss m. zart violettblau, grossblumig; neu!	1,25	11	100
115.	Fair Rosamond, rosaweiss	—,75	7	60
116.	Fairy Queen, hell fleischfarben, gr., schön	1,50	13	—
86.	<i>floribunda</i> , weiss m. blass lila-rosa Bändern, grbl.	—,75	6	50
19.	Florida, rahmweiss	1,50	—	—
102.	" <i>pallida</i> milchweiss, Ränder leicht violett	—,75	6½	50
21.	<i>Fortunei</i> , weiss gefüllt	—,75	7	60
22.	<i>Frankfurtensis</i> , dkl. violett, sehr reichblühend	—,75	6½	50
	starke Pflanzen a. d. freien Lande	1,—	9	80
23.	<i>fulgens</i> , dkl. sammtig purpur	1,—	—	—
68.	<i>Gem.</i> lavendelblau, gross, schön geformt	1,—	9	80
117.	Gipsy Queen, leuchtend dunkel-purpur, spät blühend	1,50	13	—
69.	<i>Henryi</i> rahmweiss mit lila Schein; gross	1,50	13	—
31.	<i>Jackmanni</i> , dkl. violett, 11—12 cm. breit, sehr dankbar blühend, eine der beliebtesten Sorten p. 1000 St. M. 450	—,75	6	50
70.	Jeanne d'Arc, weisslich grau	1,50	—	—
32.	John Gould Veitch, lavendelblau gef., s. hübsch	1,25	11	—
129.	John Murray, dunkel-purpur	1,50	—	—
71.	Lady Bovill, hellgrau-blau, anhaltend blühend, tassenförmig, neu!	1,25	—	—
72.	" Caroline Nevill, milchweiss mit hellblauen Bändern	1,25	—	—
99.	" <i>Londesborough</i> , silberig violett, hübsch	—,75	6½	50
138.	" Stratford de Redcliffe, dunkel lila, schön!	—,75	6½	50
33.	<i>Lanuginosa</i> , blaugrau	1,25	11	—
97.	" <i>nivea</i> pl., weiss gefüllt	1,25	11	—
74.	<i>Lawsoniana</i> , hell purpur-violett, schön geformt, s. gross	1,25	11	100
75.	<i>lilacina</i> pl., hell lila, stark gefüllt, dankbar blühend, s. hübsch	1,—	9	—
118.	<i>Lord</i> Derby, hell lavendelblau, Staubbeutel röthlich-purpur	1,—	9	75
109.	" Henry Lennox, hübsch hellblau m. milchweissen Mittelbändern	1,—	9	80
105.	" <i>Londesborough</i> , tief bläulich-lila mit kupferig purpurnen Bändern	1,—	9	—
119.	" Mayo, dunkel rosalila	1,25	—	—
76.	" Napier, dunkel lilafosa m. roth	—,75	6	50
77.	Lucie Lemoine, rein weiss, stark gefüllt, Staubb. hellgelb	1,—	9	80
158.	Madame Emilie Sorbet, Blatt ungetheilt, Blume prächtig glänzend hell- blau, Staubbeutel schwefelgelb	1,50	—	—
78.	" <i>Grangé</i> , herrlich leuchtend purpur-carmin, prächtig!	2,50	22	200
79.	" <i>von Houtte</i> , weiss in bläulich übergehend, sehr gross und schön gebaut	1,25	11	100
161.	Mlle. Elisa Schenk	2,—	—	—
80.	<i>Magnifica</i> , reich purpur mit carmoisin schattirt	—,75	7	60
141.	Maiden's blush, bläulich weiss	—,75	6½	50
81.	Marie Lefebvre, graublau mit dunklen Bändern	1,25	11	100
82.	<i>Miss Bateman</i> , milchweiss, gut geformt, reichblühend und schön, sehr empfehlenswerth! pr 1000 St. M. 450	—,75	6½	50
164.	Mistress George Jackmann, seidenweiss, sehr reichblühend	1,50	—	—
174.	" Guilter, gr., schön weiss, gefüllt	1,25	11	—
142.	" Hope, seidenartig lavendelblau, dunkler bandirt, gross	1,—	9	80
106.	" Howard Vyse, weiss, an den Rändern lila gezeichnet	1,—	9	80
85.	" James Bateman, dkl. röthlich-lila in hell-lavendelblau über- gehend, 13—15 cm. breit, schön	2,50	—	—
127.	" Melville, weiss mit schwach rosa	1,25	—	—
130.	" S. C. Baker, lilaweiss m. weissen Bändern	—,75	6½	50
107.	" Villiers Lister, weisslich rosa	—,75	7	60
143.	Morikata Oké, seidenweiss mit hell-lila	1,25	11	—
84.	<i>nigricans</i> , dkl. violett, reichblühend	1,—	9	—
113.	Otto Fröbel, weisslich grau, in rosa-lila übergehend, s. gross	2,—	—	—
38.	<i>patens amethystina</i> pl., weiss gefüllt	1,—	—	—
98.	" <i>candida</i> , milchweiss	1,—	—	—
39.	" <i>candidissima</i> pl., reinweiss, halbgefüllt	—,75	7	60
41.	" Helena, weiss	—,75	7	60
42.	" <i>insignis</i> , violett	—,75	6½	55

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Ziergehölze.

No.	Clematis.	per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
43.	patens Louisa fl. pl., rahmweiss	1,25	—	—
44.	„ Marie, purpur-blau	—,75	7	—
45.	„ monstrosa, rein weiss, halb gefüllt	—,75	7	—
170.	„ Sieboldi , prächtig, grau-blau	1, —	9	80
46.	„ Sophia, hell-violett	1, —	—	—
47.	„ Sophia, fl. pl., hell-violett, gefüllt	1, —	9	—
49.	Perfecta, fast rein weiss, atlasartig, 12—14 cm. breit	1,25	—	—
50.	Prince of Wales , tief purpur-violett, ausserordentlich reichblühend, s. starkwüchsig, recht empfehlenswerth	—,75	6 1/2	55
89.	Princess Mary, hellrosa mit weissen Bändern	—,75	6	50
155.	„ of Wales, dkl. tiefblau m. reichem Seidenglanz	2, —	18	—
87.	Queen Guinevere , violett-blau, schön gebaut, reichblühend	—,75	7	60
51.	Reginae, hell violett-blau, schön gebaut, gross	—,75	6	—
165.	Reine Blanche, bläulich-weiss, Sepalen gefranzt	1,25	11	—
90.	Renaulti coerulea grandiflora , schön dkl.-violett mit purpurem Bande, 4—6 cm breite, rundliche Sepalen, gross, schön geformt	2, —	18	—
144.	Robert Hanbury, bläulich-lila	2,50	—	—
52.	Rubella , dkl. sammtig roth-violett, herrliche runde Blume, sehr reich- blühend	—,75	6	50
66.	Rubro-violacea , violett, 12—13 cm	1, —	9	—
156.	Samuel Manson, violett-blau mit röthlichen Bändern. Sehr gross- blumig und reichblühend	1,50	12 1/2	—
91.	Sensation , schön grau-blau, gute Form, gross, reichblühend	1,50	13	—
121.	Sir Garnet Wolseley, blau mit broncefarb. Reflex	1, —	9	—
54.	Splendida, dkl. kastanienbraun-purpur	—,75	6	50
55.	Standishi , dkl.-violett mit metallischem Glanz, schön geformt, sehr reichblühend	—,75	6	50
92.	Star of India , röthl. pflaumenfarb m. purpur-brann Band, reichblüh. 132. Stella, leicht violett m. deutlichen, dkl.-pflaumenrothen Mittelländern	—,75 1,25	6 —	50 —
75.	Sylph	2, —	—	—
122.	The Queen, bläulich-lila, reichblühend	—,75	6	50
128.	Thomas Tennent, reinweiss, grossblumig	1,50	—	—
112.	Thunbridgensis, dkl. röthlich purpur, 4—6 cm. breite Sepalen, gut ge- formt, reichblühend	1,50	13	—
56.	Van Houttei, weiss mit violettem Schein	1, —	9	—
106.	Velutina purpurea, schön schwärzlich purpur, 13—15 cm, sehr reich- blühend; eine der dunkelsten Cl.	1,25	—	—
57.	venosa , röthlich-purpur, heller geadert, mit hellerem Rande, sehr reichblühend	—,75	7	—



Clematis-Topf.

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
Clematis.				
133.	Vesta, weiss, 7 Sepalen	1,—	9	80
103.	Victor Lemoine, blau-violett	1,—	9	—
168.	Viticella alba, neue, sehr schön weissblühende Var.	2,—	—	—
63.	" modesta, hell purpur-violett, dunkler geadert, ausserordentlich reichblühend	—,75	7	—
64.	" purpurea, ähnlich Jackmanni	1,—	8	—
166.	William Kennet, tief lavendelblau	1,25	11	—
Colutea, L., Blasenstrauch.				
1.	arborescens, L., Baumartiger B., blüht gelb, den ganzen Sommer hindurch, V. VI.	—,30	2 1/2	+
2.	" crispa, Hrt., Kransblättriger B.	—,75	—	—
4.	istria, Mill., (C. Halepica Lam.), Istrischer B., m. braungelben Blüten, VI.	—,50	4	—
3.	" pygmaea, Hrt., Istrien, Holz bräunlich orange, Blätter blaugrün, compact	—,60	5	—
6.	orientalis, bräunlich orange, heller als No. 4	—,40	3	—
Comptonia, s. Myrica.				
Corchorus, s. Kerria.				
Cornus, L., Hartriegel.				
11.	alba, L., (C. stolonifera, Mch.), Weisses H., V., Holz braunroth im Winter, Blüthe und Beeren weiss	—,25	2	+
b. 15.	alba fol. arg. marginatis, Blätter weiss gerandet, constant u. schön	—,70	6	50
21.	alba var. Spaethi, Wittmack, s. Neuheiten, Starke 1-3-jährige Veredlungen	5,—	—	—
1.	alternifolia, L., wechselblättr. H.	—,60	5	—
2.	Amomum, Mill., (C. coerulesc., Lam., C. fastigiata, H.), Bläulicher H., V. VI.	—,35	3	+
3.	" sericea Hrt., Seidenhaariger H.; VI., VII.	—,50	—	—
5.	australis, C. A. Mey	—,60	5	—
8.	mascula, Dur., (C. mas, L.) Kornelkirsche, blüht schon im März, V., VI	—,35	3	+
b. 16.	" aureo-elegantissima, Hrt., Ein neuer bunter C. aus Holland, der kaum im Handel sein dürfte. Die schön gezeichneten Blätter sind von ausserordentlicher Farbenpracht	2,50	20	—
	Hochstämme	3,—	—	—
b. 14.	" fol. arg. marg., Blätter weiss gerandet, constant u. schön (auch höchst. veredelt) M. 0,50 bis	1,—	4-9	+
19.	pauciculata, Lher., Rispenblüthiger H.	—,75	6	—
9.	sanguinea, L., Gemeiner H., V. VI	—,30	2	+
b. 10.	" fol. var., H., Buntblättriger gem. H., VI	—,50	4	+
b. 17.	" fol. arg. var. elegans, zierlicher buntblättr.; eine sehr hübsche Varietät, noch schöner als No. 15 M. 0,75 bis	1,25	6-10	+
12.	sibirica, Hrt., (C. tatarica, Mill.), Sibirischer H., mit korallenrothem Holze, sehr zierend, VII	—,50	4	35
Coronilla, L., Kronenwicke				
1.	Emerus, L., Scorpions-K.	—,40	3	—
Corylopsis, S. et Z., Scheinhasel				
1.	spicata, S. et Z., Gemeine Sch., gelbblühend	1,50	12	—
Corylus, L., Hasel, (s. auch Obst)				
500.	americana, Walt., Amerik. H.	—,60	5	—
501.	Avellana, L., Gemeine H., IV. V	—,40	3 1/2	—
b. 502.	" atropurpurea, Hrt., Blut-H., Blätter dunkelpurpur, s. schön	—,75	6	55
b. 503.	" aurea, H., goldblättrige H., noch neu!	2,—	18	+
	Hochstämme sehr zierend	4,50	—	—
513.	" fol. medio-purpureis, Hrt.	1,—	8	—
504.	" laciniata, H., Geschlitzte H., sehr zierend	—,60	5	40
T. 505.	" pendula, H., Trauer-H., noch neu!	1,50	12	—
	Hochstämme	3,50	30	—
506.	" quercifolia, Hrt., Eichenblättrige H.	—,75	6	—
510.	rostrata, Ait., (= cornuta Hrt.) Verein-Staaten, Canada Schnabelhasel	—,75	6	—
508.	Coturna, L., Byzantinische Baum-H., IV., V., stets baumartig und pyramidal, schöne Pyramiden M. 0,50 bis	5,—	4-15	+
	Cotinus s. Rhus			
Cotoneaster, Med., Zwergmispel.				
10.	borealis, Hrt., Fr. korallenroth	—,75	6	—
2.	lucida, Schlecht., Blätter glänzend, Fr. schwarz	—,60	5	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Cotoneaster.				
i. * 3.	microphylla, <i>Wall.</i> , Kleinblättrige Z., VIII. Blüten myrtenähnlich, Fr. roth	—,60	—	—
	Hochstämme, sehr schön	1,50	—	—
4.	nigra, <i>Wahlb.</i> , (<i>C. laxiflora</i> , <i>Jacqu. fl.</i>), Schwarzfrüchtige Z., VII, VIII.	—,50	4	—
12.	mammularia, <i>F. et M.</i> , Fr. roth	—,60	5	—
* hi. 7.	Simmondsi , <i>H.</i> , Simmonds Z., VI. sehr hübsch, mit korallenrothen Beeren, bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche <i>Mespilus pyracantha</i>	—,60	—	—
8.	sinensis, <i>Hrt. gall.</i> , Fr. schwarz	—,60	5	—
9.	tomentosa (<i>Mesp.</i>), <i>Ait.</i> , Belaubung graugrün, Fr. roth	—,75	6	—
	Crataegus , <i>L.</i> , Dorn , 20 Sort. à 1 St. M. 10, 10 Sort. à 1 St. M. 5.			
	a) Scheinmispeln (<i>Calpodendron</i>), baumartig, grossblumig.			
20.	grandiflora, <i>Sm.</i> , (<i>Cr. stipulosa</i> , <i>Hrt.</i>), Grossblumige Scheinm. M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
	Hochstämme	2,—	—	—
21.	leucophloeos, <i>Much.</i> , (<i>Cr. piriifolia</i> , <i>Ait.</i>), Urnenfrüchtige Sch., Fr. orange	1,50	5—13	—
	M. 0,60 bis	2,—	—	—
	Hochstämme			
70.	punctata, <i>Ait.</i> , Punktirfrüchtige Sch., Fr. glänzend dunkelroth, schwärzlich punktirt	—,75	6	—
	b) Beerenmispeln (<i>Microcarpae</i>), Sträucher mit sehr vielen gelb-rothen Früchten			
23.	populifolia, <i>Wall.</i> , (<i>cordata</i> , <i>Mill.</i>), Fr. korallenroth	1,—	—	—
	c) Dornmispeln (<i>Parvifoliae</i>), niedrige Sträucher, sparrig, kleinblättrig, mit langen Dornen und grünlichen Früchten.			
24.	flava, <i>Ait.</i> , (<i>flexispina</i> , <i>Much.</i>), Glatte Dornen	1,—	—	—
25.	uniflora florida, <i>Lodd.</i> , Reichblühender einblumiger Dorn, merkwürdig durch die auffallend langen Dornen, Zweige fein, ruthenförmig; sehr zierlich	—,75	—	—
	d) Scharlachdorn , (<i>Coccinae</i>), starke Sträucher, Früchte roth und gross			
27.	coccinea, <i>L.</i> , Gewöhnlicher Scharlachdorn M. 0,50 bis	—,75	4—6	—
	Hochstämme	2,—	—	—
29.	glandulosa <i>Ait.</i> , (<i>purpurea</i> <i>Hrt.</i>), Frucht gross, roth, apfelförmig	—,75	—	—
66.	rotundifolia, <i>Much.</i> , Rundblättriger Purpurdorn	—,60	5	—
	e) Hahnsporndorn , (<i>Crus Galli</i>), starke Sträucher mit grossen, glänzenden Blättern und rothen Früchten, alle sehr schön.			
33.	Crus galli <i>L.</i> , (<i>Crat. pyracanthifolia</i> <i>H.</i>), Gemeiner H.	—,50	3	—
34.	ovalifolia, <i>Hrt.</i> , Breitblättriger H. M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
28.	Douglasi , <i>Lindl.</i> , (<i>glandulosa</i> , <i>Mönch.</i> , <i>Crus galli ovalifolia</i> , <i>Hrt.</i>), sehr schön belaubt, langdornig	1,—	9	—
37.	Fontanesiana , <i>Steud.</i> , (<i>-badia</i> , <i>Hrt.</i> , — <i>Bosciana</i> , <i>Hrt.</i>), Fr. braunroth, M. 0,60 bis	1,50	—	—
69.	linearis, <i>Hrt.</i> , schmalblättrig M. 0,60 bis	1,—	—	—
38.	prunifolia , <i>Poir.</i> , (<i>Crat. Crus galli splendens</i> , <i>Hrt.</i>), Pflaumenblättr. H. sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife M. 0,50 bis	1,75	4—13	—
	Hochstämme	1,50	12	—
39.	salicifolia , <i>Med.</i> , Weidenblättriger H., Fr. braunroth	—,60	—	—
	(Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der alten Welt an)			
	f) Dunkelfrüchtiger Dorn (<i>Nigrae</i>).			
	Sträucher von graugrüner Belaubung und dunklen Früchten.			
40.	Celsiana, <i>Hrt.</i> , Cels' Dorn, sparrig, schwarzfrüchtig	1,—	—	—
41.	melanocarpa, <i>Bieb.</i> , Schwarzfrüchtiger Dorn, a. d. Kaukasus M. 0,60 bis	1,50	—	—
42.	nigra, <i>H. u. K.</i> , Ungarischer Schwarzdorn, die Blüten verändern sich allmählig von weiss in dunkelroth, blüht früh, M. 0,60 bis	1,50	—	—
43.	sanguinea, <i>Pall.</i> , Blattdorn, <i>Sibirica</i>	—,50	4	—
54.	trigyna, <i>Hrt.</i> , Ungarn	1,—	—	—
	g) Azarol-Dorn (<i>Azaroli</i>), mit filzigen Blättern und kleinen Apfeln ähnlichen, grossen Früchten			
60.	Azarolus , <i>L.</i> , ächter Azaroldorn	—,75	6	—
65.	pectinata, <i>Bosc.</i> (<i>pteridifolia</i> , <i>Lodd.</i>), Orient	—,75	6	—
76.	Heldreichi, Griechenland	1,25	—	—
44.	tanacetifolia, <i>Poir.</i> , Rainfarneblättriger D.	1,25	10	—

Ziergehölze.

No.	Crataegus.	perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
	h) Weissdorn (Oxyacanthae)			
45.	mit kleinen, gelappten Blättern und kleinen, meist rothen Früchten			
74.	<i>brevispina</i> H. C. L., Kurzdorniger W.; buschig, sehr stachelig M. 0,60 bis	1 50	5	—
	<i>Oxyacantha</i> , L. Gemeiner Weissdorn. Da es ausserordentlich			
	schwierig und für den Gärtner unwichtig ist, die beiden			
	Species des Weissdorns — den 1 grifflichen (<i>Cr. monogyna</i> ,			
	Jacq.) und den 2 grifflichen (<i>Cr. Oxyacantha</i> , L.) — und ihre			
	folgenden Abarten getrennt zu halten, so führen wir sie			
	alle unter den gebräuchlichsten Namen auf (s. auch Hecken-			
	pflanzen).	—,30	2½	*
72	" <i>filicifolia</i> , Hrt. farnblatttrig M. 0,60 bis	1 50	5	—
48.	" <i>fl. albo pl.</i> , Gefüllter W; im Verblühen rosa M. 0,60 bis	2,—	5-13	*
	Hochstämme	1,50	13	125
73.	" <i>fl. candido pl.</i> , Blüthe bis zum Abfallen stets rein weiss			
	bleibend M. 0,60 bis	1,50	5-13	—
	Hochstämme	1,50	13	125
49.	" <i>fl. kermesino pl. (Paul's New Scarlet), Dunkelroth ge-</i>			
	<i>füllter</i> W., prachtvoll in der Blüthe, starke Pyramiden			
	M. 0,60 bis	1,50	5-11	—
	Hochst. pr. 1000 St 1000 M., 1 St 1 bis	2,—	9-18	*
	Der allgemein bekannte gefüllte Rothdorn sieht gegen			
	diesen neueren rosa aus und bleibt im Effect weit hinter			
	ihm zurück. Als Alleebaum, abwechselnd mit grösseren			
	Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von über-			
	wältigender Wirkung.			
57.	" <i>fl. puniceo</i> , Hrt., einfach dunkelroth	—,75	6	—
T. 51.	" <i>fol. arg. var.</i> , sehr schön weissbunt M. 0,60 bis	1 50	5-13	—
71.	" <i>fr. luteo</i> Hrt., gelbfrüchtiger W. M. 1,— bis	1,50	9-13	—
50.	" <i>fl. rubro pleno</i> , (Gumperi bicolor), dunkelrosa gefüllt			
	M. 0,60 bis	1,50	5-13	—
	Hochstämme	1,50-2	13-18	*
T. 52.	" <i>horrida</i> Carr., Abschreckender W., ausserordentlich stachelig,			
	merkwürdig M. 0,75 bis	1,50	—	—
T. 53.	" <i>pendula</i> (reginae, Loud.), sehr zierlich hängend, mit Früchten,			
	auch blühend schön M. 0,75 bis	2,—	6-18	—
	Hochstämme, stark	2 50	20	—
T. 63.	" <i>fl. roseo</i> , einfach rosa, hängend M. 0,60 bis	1,50	5-10	—
	Hochstämme	1,75	15	—
75.	" <i>salisburiaefolia</i> , Hrt.,	1,—	—	—
78.	" <i>semperflorens</i> , s. <i>Neuere Gehölze</i>	1,—	—	—
	Cydonia, Tana., Quitte.			
120.	<i>japonica</i> , Pers., (<i>Pirus japonica</i> , Thunb.), Japanische Qu., blüht feuer-			
	roth im April, oft auch im Herbst. Einer der schönsten			
	Blüthensträucher. VI. M. 0,40 bis	—,75	5	45
132.	" <i>alba picta</i> , beim Aufbrechen weiss, später roth gefleckt . .	—,75	—	—
128.	" <i>atrosanguinea pl.</i> , Hrt. gefüllt, schön	—,75	—	—
103.	" <i>Baltzi</i> , Späth, s. <i>Neuheiten</i> , Kräftige Veredlungen . . .	3,—	25	—
124.	" <i>cardinalis</i> , feurigroth	—,75	6	—
121.	" <i>fl. carneo</i> , fleischfarbig	—,60	5	—
	Hochstämme M. 1,25 bis	2,—	—	—
126.	" <i>fl. kermesino</i> , hell carmoisin, vollblühend	—,60	5	—
107.	" <i>fl. roseo pleno</i> , rosafarb., gefüllt	—,60	5	—
122.	" <i>fol. rubris</i> , Triebe braunroth, Bl. roth, zahlreich . . .	—,75	—	—
113.	" <i>marmorata</i> , weiss, rosa marmorirt in dunkelrosa übergehend,			
	Habitus aufrecht	—,75	—	—
123.	" <i>macrocarpa</i> , grossfrüchtig	—,75	—	—
104.	" <i>Mallardi</i> , Hrt., Japan, schön dunkel-scharlach . . .	1,25	—	—
131.	" <i>Maulei</i> , mennigroth, kleinblumig, reichblühend, sehr hübsch,			
	<i>neu!</i>	1 —	9	—
105.	" <i>Moerloosi</i> , weiss mit carmin getuscht	—,75	—	—
127.	" <i>nivea intus kermesina</i> , innen dklrosa gefleckt, hängend . .	—,60	5	—
112.	" <i>sanguinea multiflora</i>	1,25	—	—
111.	" <i>semitpl.</i> , dunkelroth, halb gef.	—,75	—	—

Ziergehölze

No.		per Stück M	10 Stück M	hundert- weiser vorräthig
106.	Cydonia			
	<i>japonica</i> umbilicata, rosa	—,60	5	—
109.	„ <i>versicolor</i> , <i>Hrt.</i> , schwach rosa, junge Triebe braunroth, aufrecht	1,25	—	—
115.	<i>vulgaris</i> , <i>Pers.</i> , Gemeine Qu., Frucht sehr wohlriechend	—,40	3	—
	Cytisus , <i>L.</i> , <i>Gaisklee</i> (s. auch Laburnum).			
2	<i>elongatus</i> , <i>W. u. K.</i> , Ruthenförmiger G.: die Zweige der ganzen Länge nach mit Blüthen besetzt, VII.	—,85	3	—
3.	<i>hirsutus</i> , <i>L.</i> , (<i>C. triflorus</i> , <i>Lam.</i>), Rauher G., VII.	—,35	3	—
	Daphne , <i>L.</i> , <i>Seidelbast</i>			
1.	<i>Laureola</i> , <i>L.</i> , Lorbeer-S.	1, —	—	—
2.	<i>Mezerium</i> , <i>L.</i> , Gemeiner S.	—,60	5	—
	Deutzia , <i>Thunb.</i> , <i>Deutzie</i> , alle blühen weiss oder weisslich			
3.	<i>crenata</i> , <i>S. u. Z.</i> , Gekerbte D., die bekannteste, VI, VII	—,40	3	—
5.	<i>crenata fl. pl.</i> , weiss gefüllt, aussen lila-rosa, sehr vollblühend, die schönste von allen Deutzien, VI, VII	—,40	3	—
b. 11	„ <i>foliis albo punctatis</i> , <i>Hrt.</i> , Blätter weiss punktiert, (nicht constant)	—,50	4	—
17.	„ <i>fol. var.</i> , <i>Hrt.</i> , s. Neuere Gehölze	1, —	—	—
14.	„ <i>purpurata</i> , schön, purpurrothe Blüthen	—,30	5	—
15.	„ <i>Pride of Rochester</i>	—,75	6	—
6.	<i>Fortunei</i> , <i>Hrt.</i> , <i>Fortune's D.</i> , rein weiss, VII.	—,50	4	—
4.	„ <i>fl. pl.</i> , <i>Hrt.</i> , (<i>creu. candidissima pl. Hrt.</i>), gefüllt, rein weiss	—,50	4	—
7	<i>gracilis</i> , <i>S. u. Z.</i> , zierliche D., VIII.	—,30	2 1/2	—
	Treibpflanzen per 100 Stück M. 20.			
	Diervilla , <i>Müll.</i> , <i>Diervilla</i> (siehe auch Weigela)			
1.	<i>canadensis</i> , <i>Willd.</i> (<i>D. Lonicera</i> , <i>Müll.</i>), Kanadische D., VII, gelbblühend	—,40	3	—
2.	<i>splendens</i> , <i>Curr.</i> (<i>sessilifol.</i> , <i>Schattler</i>), Glänzende D., VII, mit bräun- lichen, glänzenden Blättern	—,50	4	—
	Dimorphanthus , siehe <i>Aralia</i>			
	Diospyros , <i>L.</i> , <i>Lotuspflaume</i> (Dattelpfl.).			
1.	<i>Lotus</i> , <i>L.</i> , Italienische L.	—,75	6	—
2.	<i>virginiana</i> , <i>L.</i> , Virginische L., im Vaterlande essbar	—,75	6	—
3.	Diplopappus <i>chrysophyllos</i> , Neuseeland, Immergrüner Strauch mit hübsch goldgelben Zweigen und weissen Blüthen	1, —	9	—
	Elaeagnus , <i>L.</i> , <i>Oelweide</i> (Oleaster)			
b. 1.	<i>argentea</i> , <i>Pesh.</i> (<i>E. macrophylla</i> <i>Hrt.</i> , <i>Shepherdia argentea</i> , <i>H.</i> , Silber- Oelw.); VII. Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz	—,30	5	—
b. 2.	<i>angustifolia</i> , <i>L.</i> (<i>E. argentea</i> , <i>Hrt.</i>), Gemeine Oelw., Blätter unten grauweis, junges Holz silbergrau, VI.	—,40	3	—
5.	„ <i>hortensis</i> , Blätter schön, mehr silberweis als No. 2	—,30	5	—
6.	„ <i>latifolia</i> , <i>Späth.</i> , grossblättrig	—,75	6	—
7.	„ <i>pyramidalis</i> , <i>Späth.</i>	—,75	6	—
8.	„ <i>rotundifolia</i> , <i>Späth.</i>	—,50	—	—
10.	<i>edulis</i> , <i>Hrt.</i> , Essbare Oelw.	—,30	5	—
4.	<i>orientalis</i> , <i>L.</i> , Morgenländische Oelw., Blätter gelblich grün	—,60	5	—
	Erica , <i>L.</i> , <i>Heide</i> , à Stück 0,50 M. in folgenden Sorten:			
	1. <i>mediterranea</i> glauca.	5	<i>vagans</i> alba	
	2. „ <i>nana</i>	6	<i>tetragona</i>	
	3. „ <i>stricta</i> .	7	<i>herbacea</i> carnea.	
	4. <i>vagans</i> multiflora.			
	Evonymus , <i>L.</i> , <i>Spindelbaum</i> (Pfaffenhütchen).			
20.	<i>alata</i> , <i>Thunb.</i> , geflügelter S.	M. 0,75 bis	1,25	—
1.	<i>americana</i> , <i>L.</i> , Amerikanischer S.; grossblättr., dunkelgrün, VII, 0,75 bis Hochstämme	1,25	6	—
		1,50	13	—
2.	<i>angustifolia</i> <i>fol. purpureis</i> , <i>Pesh.</i> , Schmalblättr. mit brauner Herbst- färbung	—,75	5	—
		1,25	10	—
4.	<i>europaea</i> , <i>L.</i> , Europäischer S., VI., durch seine rothen Früchte sehr zierend, für grössere Gebüsch-Partien geeignet, doch nicht unmittelbar an den Wegen	—,60	2 1/2 — 5	—
		1,25	10	—

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Ziergehölze.

No.	Evonymus.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weisse vorräthig
b. 5.	<i>europaea</i> fol. var., Weissbuntblättriger S.	M. 0,75 bis	1,—	—	—
6.	" fr. albo, <i>Hrt.</i> , weissfrüchtig	Hochstämme	1,50	13	—
3.	" fruct. atropurp.	Hübsche Hochstämme	—,75	6	—
23.	<i>japonica</i> arg. marg., weiss berandet		1,—	—	—
21.	" macrophylla, Aus Japan, grossbl. Art		1,—	9	—
22.	" maculata, Gefleckte S., aus Japan		1,—	9	—
10.	<i>Maacki</i> , <i>Hrt.</i> , Maack's S., m. glänzenden Blättern, hübsch		—,60	—	—
11.	<i>nana</i> , <i>Hieb.</i> (E. <i>nana</i> rosmarinifol. <i>Hrt.</i>), Zwerg-S., VIII, wird nur fusshoch	Hochstämme	1,50	13	—
8.	<i>pendula</i> , <i>Wall.</i>	1—1,50 m. hohe veredelte Stämme M. 1.— bis	—,50	—	—
b. 12.	<i>radicans</i> fol. arg. marg., <i>Hrt.</i> , hübsch	Hochstämme	1,75	9—16	—
b. 19.	" fol. arg. var., <i>Hrt.</i> , schön weiss marmorirt und gerandet		1,50	—	—
i. 13.	" viridis, <i>Hrt.</i> , Grüner wurzelnder S.; kriechend		—,50	—	—
14.	<i>verrucosa</i> , <i>Scop.</i> , Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön dunkel belaubt		—,30	2 1/2	—
	"	Hochstämme	1,50	—	—
Fagus, L., Buche (Rothbuche)					
2.	<i>ferruginea cochleata</i> (sylv. cochl. <i>Hrt.</i>), Köffelblättrige, rostbraune B.		1,25	—	—
3.	<i>sylvatica</i> , L., Gemeine B., Rothbuche; I, II		—,50	4	—
4.	" <i>asplenifolia</i> , <i>Hrt.</i> , farnblättrige B.		1,—	9	—
b. 5.	" <i>atropurpurea</i> , <i>Hrt.</i> , Blut-Buche, purpurblättrig		1,—	9	—
b. 6.	" " " " " " " " " " " "	Pyramiden M. 2 bis	15,—	—	—
21.	" " " " " " " " " " " "	Brocklesby, <i>Hrt.</i> , Blut-B. v. Brocklesby, neu	2,—	18	—
22.	" " " " " " " " " " " "	<i>nana pendula</i> , <i>Hrt.</i>	1,50	13	—
7.	" " " " " " " " " " " "	<i>pendula nova</i> , <i>Hrt.</i> , neue Hänge-B.	3,—	13—25	—
8.	" " " " " " " " " " " "	M. 1,50 bis	1,25	—	—
9.	" <i>circinata</i> , <i>Hrt. Goll.</i> , kreiselblättrig		1,25	10	—
10.	" <i>comptoniaefolia</i> , <i>Hrt.</i> , comptonienblättrige B. mit fein geschlitztem Laube, zierlich		1,25	—	—
12.	" <i>cristata</i> , <i>Hrt.</i> , (-crispa), Hahnenkamm-buche, von monströsem Wuchse		1,25	13	—
13.	" fol. arg. varieg., <i>Hrt.</i> , weissbunte B.		1,50	10	—
T. 15.	" <i>grandidentata</i> , <i>Hrt.</i> , grosszählige B., m. stark eingeschnittenen Blättern		1,25	—	—
b. 20.	" <i>heterophylla</i> , <i>Hrt.</i> , verschiedenblättr. B.		1,25	12—20	—
17.	" <i>pendula</i> , <i>Hrt.</i> , Trauer-R-B.	M. 1,50 bis	2,50	—	—
18.	" " " " " " " " " " " "	Hochstämme	5,—	—	—
	" <i>purpurea latifolia</i> , <i>Hrt.</i>	M. 1,25 bis	3,50	11—30	—
	" <i>quercoides</i> , <i>Bth. Cat.</i> , eichenblättrige B.	M. 1 bis	1,50	9—13	—
	" <i>Remillyensis</i> , <i>Hrt.</i> , hängende, von Remilly		1,25	—	—
Fontanesia, Labill., Fontanesie.					
1.	<i>Fortunei</i> , <i>Hrt.</i> , ein äusserst zierlicher, dem Liguster ähnlicher Stranch		—,50	4	—
2.	<i>phillyreoides</i> , Labill.		—,50	4	—
Forsythia, Lindl., Forsythie, blühen schon Ende März, gelb					
1.	<i>Fortunei</i> , Lindl., Fortune's F., von kräftigem, aufrechten Wuchse, VI.		—,40	3 1/2	—
4.	<i>Sieboldi</i> , <i>Hrt.</i> , scheint noch stärker zu hängen als No. 2		—,40	3 1/2	—
2.	<i>suspensa</i> (Syringa), Thunb., Ueberhängende F., stark hängend, VI zum Bekleiden von Mauern geeignet		—,40	3 1/2	—
3.	<i>viridissima</i> , Lindl., Dunkelgrüne F., schön, VII		—,40	3 1/2	—
5.	" fol. arg. varieg., <i>Hrt.</i> , buntblättrige, dkl. grüne F.		—,75	6	—
Fraxinus, L. Esche. 12 Sorten à 1 Stück 10 M.					
Die Eschen zeigen eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit in der Belaubung, im Wuchs und in der Herbstfärbung der Blätter; sind landschaftlich sehr wirkungsvoll und begnügen sich selbst mit ärmeren Bodenarten.					


Ziergehölze.

No.	Fraxinus.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
a) Eschen der alten Welt.				
65.	<i>angustifolia pyramidalis</i>	1,25	—	—
22.	<i>argentea</i> , <i>Hrt.</i> , eine sehr schöne, helllaubige E., wahrscheinlich Abart von <i>excelsior</i> M. 0,80 bis	2, —	—	—
b. 51.	<i>edentata</i> fol. var., <i>Hrt.</i> , Blätter sehr schön ausgerandet u. weissbunt	1,20	—	—
62.	<i>Elonza</i> , <i>Hrt.</i> , <i>Elonza-Esche</i>	1, —	—	—
1.	<i>excelsior</i> , <i>L.</i> , Gemeine E. I. ca. 2 1/2 — 3 m. h. (s. auch Allee-bäume)	—,50	4	*
2.	" <i>aspleniifolia</i> , <i>C. Koch</i> , (<i>F. linearis</i> , <i>Hrt.</i>) Farnblättrige E.; zierlich M. 0,80 bis	1,50	7	—
3.	" <i>aurea</i> , <i>Willd.</i> , Gold-E., junges Holz goldgelb . . . M. 0,80 bis	2,25	—	—
T. 37.	" <i>pendula</i> , Traueresche mit goldgelbem Holze	2, —	18	—
h. 5.	" <i>concarvaefolia</i> fol. var., <i>Hrt.</i> , Bunte, hohlblättrige E., Blätter fast weiss im 2ten Triebe M. 0,80 bis	2, —	7—18	—
6.	" <i>crispa</i> , <i>Loud.</i> , Krausblättrige E., Blätter schwarzgrün und sehr kraus, von niedrigem, langsamen Wuchse M. 0,80 bis	2, —	7 18	—
	" Starke Hochstämme	2, —	—	—
27.	" <i>encullata</i> , <i>Hrt.</i> , Hohlblättrige E., Blätter nahe beisammen stehend, kräftiger als Nr. 6, ca. 2 1/2 m. h . . .	1,50	12	—
	" Hochstämme	2, —	—	—
25.	" <i>elegantissima</i> , <i>Hrt.</i> , Blätter sehr zierlich getheilt, ausser- ordentlich schön Hochstämme	2, —	18	—
42.	" fol. <i>aur.</i> , s. Neuheiten, 1jährige Veredlungen	1,50	10	—
	" Hochstämme	3, —	20	—
8.	" <i>heterophylla</i> , <i>C. Koch</i> , (<i>F. monophylla</i> , <i>H.</i>), hat meist unge- fiederte Blätter Starke Hochstämme M 2 bis	2,75	18—25	—
T. 9	" <i>pendula</i> , <i>Ait.</i> , Trauer-E., Hochstämme mit starken Kronen M. 1,50 bis	3, —	12—25	*
	" extra stark	4, —	35	—
20.	" <i>polemoniifolia</i> , (<i>F. polem.</i> , <i>Poir.</i>), Kugel-Esche. Besonders werthvoll für nördliche Gegenden wo die Kugel-Akazie nicht gedeiht	— 80	7	—
	" Hochstämme	2, —	18	150
11.	" <i>simplicifolia laciniata</i> , <i>A. M.</i> , Einfachblättrige geschlitzte, sehr eigenthümlich M. 0,80 bis	2, —	—	—
	" Hochstämme	2, —	—	—
53.	" spec. Taschkent, <i>Hb. Petrop.</i>	2, —	—	—
P. 28.	" <i>spectabilis</i> , <i>Hrt.</i> , im Wuchs ähnlich der italien. Pappel M. 0,80 bis	2, —	18	—
	" M. 1,75 bis	3, —	15—25	—
	" Hochstämme	—	—	—
52.	<i>jaspidea</i> , <i>Hrt.</i> , (excl. <i>jaspid.</i> <i>Willd.</i>)	1,50	—	—
T. 14.	<i>lentiscifolia pendula</i> , <i>Arb. Musc.</i> , (<i>parvifolia pendula</i> , <i>Hrt.</i>), eine sehr fein belaubte und stark hängende Trauer-E. M. 1,00 bis	2,50	—	—
68.	<i>longicauspis</i> , <i>S. et Z.</i> , Spitzblättrige Blüthenesche	1,50	—	—
	" Hochstämme	2, —	18	—
17.	<i>mandschurica</i> , <i>Rupr.</i> , Blätter grösser und gelblicher als bei <i>excelsior</i> M. 0,60 bis	1,75	5—15	*
	" Hochstämme	2, —	18	—
12.	<i>oxyphylla</i> , <i>Bieb.</i> (<i>oxycarpa</i> , <i>Willd.</i>), Spitzfrüchtige E., in allen Theilen kleiner als „ <i>excelsior</i> “ M. 0,60 bis	1,50	5—13	*
	" Starke Hochstämme	2, —	18	*
43.	<i>acuminata</i> , spitzblättrige E. M. 0,80 bis	2, —	—	—
b) Amerikanisch-japanische Eschen.				
	mit grossen Blättern und glänzendem Laube.			
15.	<i>alba</i> , <i>Marsh</i> (= <i>americana</i> , <i>L.</i> , = <i>pubescens</i> , <i>Hrt.</i> , = <i>rotundifolia</i> ? <i>Hrt.</i>). Weisse Esche, ein grossblättriger, herrlicher, hochwachsender Baum mit grauer Rinde (s. auch Allee-bäume). M. 0,60 bis	3, —	5—27	*
16.	<i>americana</i> , <i>Willd.</i> , Blätter oben dunkelgrün, unten grau-grün	—,80	6	—
67.	" <i>macrophylla</i> , sehr grosse Blätter	1,25	—	—
21.	<i>arbutifolia</i> , <i>H. S.</i> (= <i>pennsylvanica latifolia</i> , <i>C. Koch</i>), Blätter auf der Unterseite stark grau-filzig, ca. 2 m. h.	1,25	10	—
	" Hochstämme	2, —	18	—

Ziergehölze.

No.	Fraxinus.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
b. 36.	<i>aucubaefolia</i> , <i>Hrt.</i> , hübsch gelbbunt M. 1,00 bis Hochstämme	2,— 1,75	9—18 15	—
26.	<i>Bosci</i> , <i>Hrt.</i> , frisch grün belaubt, ähnlich No. 16	—,80	—	—
48.	<i>californica</i> , Californische E.	1,—	9	—
61.	<i>cinerea</i> , <i>Bosc.</i>	1,25	—	—
20.	<i>Novae Angliae</i> , <i>Hrt.</i> , sehr hübsche, glänzend dklgrüne Belaubung, M. 1 bis Hochstämme	2,— 1,75	9—18 15	—
59.	<i>Oregona</i> , <i>Nutt.</i> , Oregon-E.	1,25	—	—
66.	fol. pulverul., <i>Hrt.</i> , Bestäubtblättrige vom Oregon	1,25	—	—
7.	<i>pubescens</i> fol. <i>arg. marg.</i> , <i>Späth</i> , s. Neuheiten; 1jähr. Veredlungen mehrfähr. Veredl., Halb- u. Hochstämme	1,50 2,50	12 20	—
39.	longifolia M. 0,75 bis	1,25	6—10	—
55.	<i>pennsylvanica</i> , Pennsylvanische Colorirt im Herbste prächtig violett	1,—	9	—
34.	<i>quadrangulata</i> , <i>Mehr.</i> , Blau-E., junge Zweige schwach vierkantig . .	—,60	5	—
34.	<i>sambucifolia</i> , <i>Lam.</i> , (= <i>nigra</i> , <i>Marsh.</i>), Schwarz-E., von den nord- amerikanischen Arten am meisten ähnlich unserer ein- heimischen E., wird aber nicht so hoch	1,— 1,50	9 13	—
19.	<i>crispa</i> , <i>Lodd.</i> (<i>nigra crispa</i> , <i>Hrt.</i>), Krause Schwarz-E., dunkel- grün, krausblättrig, wird nicht hoch	1,—	—	—
c) Ornus, Manna-Esche (Blüthen-Esche).				
23.	<i>Ornus</i> , <i>L.</i> , Gemeine Manna-Esche, schönblühend, IV, V	—,60	5	—
32.	rotundifolia, <i>Hort.</i> , Rundblättrige Manna-E., blüht vorzugs- weise reich	1,—	9	—
Geblera.				
1.	<i>suffruticosa</i> , <i>F. et M.</i> , (<i>Securinega</i> <i>Juss.</i>)	—,75	6	—
1.	Genista tinctoria , <i>L.</i> , Färbeginster	—,25	2	*
Gleditschia, Clayt., Gleditschie , (Christusdorn)				
12.	<i>caspica</i> , <i>Desf.</i> , Kaspische Gl. s. Neuere Gehölze	1,50	—	—
T. 11.	<i>excelsa pendula</i> , sehr zierend	2,—	—	—
1.	<i>ferox</i> , <i>Desf.</i> , (? Gl. <i>sinensis</i> , <i>Lam.</i>), Wilddornige Gl.	1,75	16	—
4.	<i>macracantha</i> , <i>Hrt.</i> , oft mit 8—10 cm. langen Stacheln M. 0,80 bis	1,75	7—16	—
2.	<i>monosperma</i> , <i>Walt.</i> , (Gl. <i>inermis</i> , <i>Mill.</i>), Einsamige Gl. M. 0,75 bis	1,25	6—10	*
6.	<i>sinensis</i> , <i>Lam.</i> , (Gl. <i>horrida</i> , <i>Willd.</i>), Chinesische Gl. mit glänzendem Laube M. 0,75 bis	1,25	6—10	*
8.	<i>triacanthos</i> , <i>L.</i> , (Gl. <i>latisiliqua</i> , <i>Hrt.</i>), Dreidornige Gl., 2—2½ m. h. Hochstämme, s. Alleebäume	—,60	5	*
10.	Bujeti (= <i>Bugeoti pend.</i> , <i>Hrt.</i>), dornenlos	2,—	—	—
9.	<i>inermis</i> , <i>C. Koch</i> (Gl. <i>tr. laevis</i> , <i>Hrt.</i>), unbewehrte drei- dornige Gl.	—,80	7	*
	Hochstämme	1,75	16	—
Alle Gleditschien sind schöne Bäume mit lichter Krone und hell- grüner Belaubung.				
Gymnocladus, Lam., Geweihbaum (Schusterbaum)				
1.	<i>canadensis</i> , <i>Lam.</i> , Aechter G., IV, merkwürdiger Baum mit sehr langen, doppelt gefiederten Blättern, 1—1½ m. h. M. 1 bis	2 50	9	—
Halesia, L., Halesie.				
1.	<i>tetraptera</i> , <i>L.</i> , Vierflügelige H. mit weissen, glockenförmigen Blumen	1,—	—	—
Halimodendron, Fisch, Salzstrauch.				
1.	<i>argenteum</i> (<i>Carag.</i>), <i>Lam.</i> , Silbergrauer S., sehr hübscher, grau be- laubter Strauch mit hell violetten Schmetterlingsblüthen. Halb- u. Hochstämme M. 0,80 bis	1,75	7—16	*
Hamamelis, L., Zaubernuss.				
1.	<i>virginica</i> <i>L.</i> , virginische Z., im Herbste bilden die tiefdunkelgrünen Blätter, die zahlreichen gelben Blumen u. die eigenthümlich gestalteten, vorjährigen Früchte ein sehr interessantes Ge- sammtbild	—,75	6	—

Ziergehölze.

No.				per Stück M.	10 Stk.-k M.	hundert- st.-k von 100 Stk.
	Hibiscus, L., Eibisch.					
	In nachstehend, besten veredelten Sorten p. St. M. 0,75 p. 10 St. M. 7.					
9	<i>syriacus albus luteolus plenus</i>	13	<i>syriacus fl. carneo pl.</i>			
16.	" <i>ardens.</i>	19	" <i>grandifl. superbus.</i>			
17.	" <i>aurantiacus plenus.</i>	14	" <i>paeoniifl. plenus.</i>			
10.	" <i>bicolor hybridus.</i>	20	" <i>pulcherrimus plenus.</i>			
11.	" <i>coelestis.</i>	8	" <i>punicus plenus.</i>			
18.	" <i>coeruleus plenus.</i>	22	" <i>spectabilis fl. pl.</i>			
12.	" <i>flore albo pleno.</i>	15	" <i>totus albus.</i>			
	Hippophaë, L., Sanddorn.					
1.	<i>Rhamnoides L., Gemeiner S., VII</i>	1—2 m. h.	M. 0,40 bis	1,—	3 1/2—9	—
	Hydrangea, L., Hortensie.					
18.	<i>arborescens, L., Virginische H.</i>			—,50	—	—
22.	<i>Belzoni, Hrt., Belzon's H.</i>			—,30	5	—
7.	<i>japonica, Sieb. (= opuloides) prächtig rosenroth blühend.</i>			—,75	—	—
8.	<i>Lindleyana, blasse, einfach.</i>			—,75	6	—
17.	<i>macrocephala, Hrt., grossköpfige H.</i>			—,50	—	—
24.	<i>Madame von Siebold</i>			1,—	—	—
21.	<i>mandschurica, Hrt., Mandschur. H.</i>			—,60	—	—
20.	<i>Otaksa, Hrt., Otaksa H.</i>			—,75	—	—
9.	<i>paniculata grandiflora, weiss, sehr grossdoldig, herrlich</i>	M. 0,50 bis		—,75	4	—
26.	<i>rosea marginata, noch neu, Blätter weiss panachirt, s. gr. u. rosa</i>			1,50	—	—
	<i>berändert; Blume lebhaft roth</i>			—,50	4	—
14.	<i>Thomas Hogg, Hrt., weiss, reichblühend</i>			—,50	—	—
	Hypericum, L., Hartheu					
11.	<i>Androsaemum, L.</i>			—,40	—	—
4.	<i>calycinum, L.</i>			—,50	—	—
1.	<i>elatum, Ait., Hohes H. VII, VIII, reich gelbblühend.</i>			—,40	—	—
5.	<i>hircinum, L., Bockkraut, Blüten ockergelb</i>			—,40	3 1/2	—
16.	" <i>foliis varieg., s. Neuere Gehölze</i>			1,—	—	—
6.	<i>patulum, Thunb., mit grossen, gelben Blumen</i>			—,50	4	—
10.	<i>ramosissimum, Don., dichtzweigiges H.</i>			—,30	2	—
	Iberis, L., Schleifenblume VIII.					
1.	<i>sempervirens, L., Immergrüne Schl., reichblühend, weiss</i>			—,30	2 1/2	—
	Idesia polycarpa, sehr schönes Gehölz mit grossen, länglich					
	herzförmigen Blättern			1,50	—	—
	Ilex, L., Hülse (Stechpalme).					
1.	<i>Aquifolium L., Gemeiner H., Varietäten, schöne Pyramiden mit Ballen</i>	M. 5 bis		10,—	40—90	—
						
	Incarvillea Koopmanni.					
	Incarvillea Koopmanni, Lauche, (= J. Olga Rgl.) s. Neuere					
	Gehölze			—,50	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrethig
	Indigofera, L. Indigostrauch.			
1.	<i>Dosua, Fr. Hum.</i> , niedriger, zierlicher Strauch m. rosa Blüthentrauben.	—,40	3	—
	Itea, L. Itea.			
1.	<i>virginica, L.</i> , virginische J.	—,30	5	—
	Juglans, L. Walnuss, s. auch Obst.			
20.	<i>cinerea, L.</i> , Oelnuß, aus dem Saft des Stammes wird Zucker gewonnen, II. M. 0,75 bis	1,—	6	—
23.	<i>nigra, L.</i> , Butternuß, diese wie „cinerea“ gedeihen auf feuchten Plätzen und besitzen eine reich gefiederte Belaubung, III (s. Allee-bäume) 2 m. h.	—,75	6	—
7.	<i>serotina</i> , Johannisnuß, spät blühend	1,50	13	—
5.	<i>regia laciniata</i> Geschlitztblättrige W., ausserordentlich zierend	2,50	20	—
6.	<i>pendula Hrt.</i> , hängende W. M. 2 bis	3,2	—	—
	Kerria, D. C. Kerrie, (Ranunkelstrauch)			
3.	<i>japonica (Rubus) L.</i> , (Corechorus japon. Thbg.), Japan. Kerrie	—,30	2 1/2	—
1.	<i>fl. pl., Ert.</i> , gefüllt, gelb, sehr hübsch	—,35	3	—
b. 2.	<i>fol. var.</i> , mit prächtig weissbunten Blättern	—,40	3	—
4.	<i>ramulis aureo vittatis</i> , mit gelbbunten Zweigen	—,50	4	—
	Koelreuteria, Loem., Kälreuterie.			
1.	<i>paniculata, Loem.</i> , Rispenblüthige K.	—,50	4	—
	Laburnum, L. Goldregen (Bohnenbaum).			
4.	<i>vulgare, Gris.</i> , (Cytis. Laburnum, L.), Gemeiner G., I—IV M. 0,40	—,75	3—6 1/2	—
16.	<i>Alschingeri, C. Koch</i> , Alschinger's Goldregen	1,—	9	—
13.	<i>Carlieri Hrt.</i> , Carlieri's G. (Cytisus nigricans Carlieri)	1,—	9	—
8.	<i>sessilifolium</i> , sehr schöne lange Blüthentraube	1,25	10	—
18.	<i>Fossi</i> , sehr elegante, enorm lange Blüthentrauben	1,50	13	—
	Lembotropsis, Gris., Aehren-Geisklee.			
2.	<i>sessilifolius, (Cytis.) L.</i> , Aehr G., mit fast sitzenden Blättern.	—,75	—	—
	Lespedeza, Mchx., Lespedeze.			
1.	<i>bicolor, Turcz.</i> , Zweifarbig L., esparsettähnliche Pflanze aus dem Amurgebiet, sehr schön blühend	—,75	6	—
	Ligustrina, Max., Amur-Flieder.			
1.	<i>amurensis, Rupr.</i> , aus dem nördl. China, in weissen Rispen blühend.	1,—	9	—
	Ligustrum, L. Liguster (Rainweide)			
1.	<i>amurensis (Syringa) Rup.</i> , Amur-L., glänzend belaubt	—,40	3	—
4.	<i>atrovirens, Hrt.</i> , dunkel belaubt	—,40	3	—
16.	<i>chinense nanum, Hrt.</i> , niedrige hübsche Art mit glänzenden Blättern	—,40	3	—
2.	<i>ovalifolium, Hrt.</i> , (-lucidum, Ät.-japonicum, Hrt.), grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 6—8° R. Kälte, VI.	—,40	3	—
32.	<i>robust. marg. aureum</i> , prächtig goldgelb gerandet	—,75	6	—
7.	<i>species nova</i> , pyramidal, gelbfrüchtig	—,50	4	—
8.	<i>vulgare L.</i> , Gemeiner L., der schönste Strauch als Unterholz und als solcher halblimmergrün, VI	—,25	2	—
9.	<i>foliosum Hrt.</i> , Reichbelaubter L.	—,35	3	—
b. 26.	<i>fol. albo punctatis</i> , weissgelb punktirt und gefleckt.	—,50	4	—
b. 28.	<i>albo varieg.</i> , Weissbunter L., sehr stark	—,75	6	—
b. 10.	<i>aureo var.</i> , Goldbuntblättriger L., recht hübsch	—,35	3	—
	<i>1—1 1/2 m. hohe Stämme</i>	1,50	—	—
29.	<i>glauco fol. albo marginatum</i> , s. Neuere Gehölze	—,50	4	—
11.	<i>italicum D. R.</i> , Italienische Rainweide	—,35	3	—
27.	<i>latifolium fol. aureo-maculatis</i> , breitblättrige Rainweide, mit gelb gefleckten Blättern	—,50	4	—
P. 13.	<i>pyramidal</i> , Späth, hiesiger Sämling von reicher, bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs, VII	—,40	3	—
	<i>Hochstämme</i>	1,50	—	—
	Liquidambar, L. Amberbaum.			
1.	<i>Styraciflua, L.</i> , Amerikanischer A. sehr interessant	1,25	—	—
	Liriodendron, L. Tulpenbaum.			
1.	<i>Tulipifera, L.</i> , Aechter Tulpenbaum M. 1 bis	2,50	—	—

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M	hundert- weise vorräthig
S	Menispermum, L., Mondsame.			
1.	<i>canadense, L., Kanadischer M.</i> , Für Festons u. dergl.	—,60	5	—
	Mespilus, L., Mispel.			
15.	<i>germanica, L.</i> , Gemeine Mispel, Früchte essbar, V.	—,75	6	—
16.	" <i>fol arg. varieg.</i> (nicht ganz constant)	1,25	—	—
	Die übrigen siehe unter Crataegus und unter Obst.			
	Morus, L., Maulbeere, alle geben Futter für Seidenraupen.			
1.	<i>alba, L.</i> , Weissfrüchtige M., IV, V.	—,40	3¼	*
7.	" <i>Colombassa Ledd.</i> , Colombassa-M.	—,80	—	—
14.	<i>Cedrona Cedron's M.</i>	—,75	—	—
2.	<i>intermedia, Pers (M L'Hou, Hrt.)</i> , sehr grossblättrig	—,50	4	—
*4.	<i>nigra, L.</i> , Schwarzfrüchtige M., Beeren werden gegessen. VI.	—,50	4	*
5.	<i>rubra, L.</i> , Rothfrüchtige M.	—,60	5	—
	Myrica, L., Gagel.			
1.	<i>asplenifolia, L.</i> (<i>Comptonia asplenifolia, Becke.</i>), sehr wohlriechend.	—,80	7½	—
2.	<i>cerifera, L.</i> , Wachsmyrthe, halb immergrün	1,—	—	—
	Myricaria, Desv., Myricarie.			
*2.	<i>dahurica, Hrt.</i> , Belaubung graugrün	—,50	4	*
	<i>germanica, L.</i> , gemeine M.	—,50	4	*
	Neillia, Don., Neillie.			
1.	<i>thyrsiflora, Don.</i> , straussblüthige N.	—,50	4	—
	Neviusia, L., Neviusie.			
1.	<i>Alabamensis, s. neuere Gehölze</i>	2,—	—	—
	Ostrya, L., Hopfenbuche.			
102.	<i>virginiana, Mill.</i> , amerikanische H.	1,25	11	—
101.	<i>vulgaris, Willd.</i> , gewöhnliche H.	1,—	9	—
	Paeonia, L., Paeonie, (Giebtrose, Pfingstrose).			
*1.	<i>arborea, Donn. (P. Mountan Sims.), Baumart, P. f. viel. Varietät, M. 1,50 bis</i>	5,—	—	—
↳	Paulownia, S. u. Z., Paulownie.			
1.	<i>imperialis, S. u. Z.</i> , Kaiserliche P. Sehr grossblättrig75	6	—
	Periptoca, L., Baumschlinge.			
*1.	<i>graeca, L.</i> , Griechische B.	—,50	4	*
	Phellodendron, Rappr. Korkbaum.			
1.	<i>amurense, Rappr.</i> , Sibirischer K., wird am Amur 15—18 m hoch und die Rinde dort allgemein als Kork benutzt; Blatt gefiedert u. wohlriechend, sehr schön, neu! 0,50—2 m hoch M. 0,75 bis starke Hochst. M. 3 bis	2,50 5 — 1,50	6—20 — 12	* — —
2.	<i>japonicum, Japanischer K.</i>			
	Philadelphus, L., Pfeifenstrauch (Wilder Jasmin).			
	10 Sorten a 1 St. M. 3,50. alle blühen weiss			
B3.	<i>Columbianus, Hrt.</i> (<i>columbarius?</i>), VI., VII., Laub mattgrün, sehr reichblühend, grossblumig	—,40	3	*
14.	<i>cordatus, Hrt.</i> , Herzblättriger Pf. ähnlich dem vorigen40	3	—
1.	<i>coronarius, L.</i> , Gemeiner Pf. V., VI., sehr bekannt und verbreitet, starke Sträucher	—,30 —,50	2 4	* —
b. 18.	" <i>fol. aureis, Hrt.</i> , mit goldgelben Blättern. Neu! M. 0,40 bis	—,75	3¼—6	*
21.	" <i>fl. pl., Hrt.</i> , gefüllt50	1	*
5.	" <i>nanus, Mill.</i> , Zwerg-Pf. VIII., bildet einen dichten Busch	—,40	3	*
7.	" <i>salicifolius, Hrt.</i> , Weidenblättriger Pf. VIII., eigenthümliche Belaubung	—,40	3	—
9.	" <i>Zeyheri Schrad.</i> , Zeyher's Pf. VI., VII., frühblühend	—,40	3	—
22.	<i>dianthiflorus pl, Hrt.</i> , Nelkenblüthiger, gefüllter Pf.	—,45	3¼	*
6.	<i>floribundus, Schrad.</i> (<i>pubescens, Lois.</i>), Reichblüh. Pf. V., VI., schön	—,30 —,50	2 4	* *
20.	<i>Godehookeri, Hart.</i>	—,40	3	*
*2.	<i>Gordonianus Lindl.</i> , Gordon's Pf. V., VI., hochwachsend, grossblumig	—,40	3	*
10.	grandiflorus, Hrt. , Grossblumiger Pf. VI., V., durch die grossen dunkelgrünen Blätter und die grossen Blumen sich auszeichnend, sehr schön	—,30	2	*
32.	" <i>fl. pl., Hrt.</i> , s. neuere Gehölze	2,—	—	—
23.	" <i>speciosissimus, Hrt.</i>	—,50	4	—

Ziergehölze.

Nr.	Philadelphus.	per Stück	10 Stück	hundert- weisse vorrätig
		M	M	
12.	inodorus, <i>Hrt.</i> , (Lewesi, <i>Prsb.</i>), VII, Blätter hellgrün	—,40	3	—
3.	Keteleeri fl. pl, <i>Hrt.</i> , Keteleer's gefüllter Pf., VII, neuere Züchtung!	—,40	3	—
4.	latifolius, <i>Schrad.</i> , Breitblättr. Pf., VI, hochwachsend, grossblumig	—,40	3	—
* 11.	laxus, <i>Schrad.</i> (inodorus <i>L.</i>), VII, grossblumig, dunkelblättrig, Haltung überhängend	—,40	3	—
19.	nivalis spectabilis pl., <i>Hrt.</i> , halb gefüllt	—,45	3 1/2	—
25.	pendulifolius, mit hängenden Blättern	—,50	4	100
28.	primulaeflorus, <i>Hrt.</i> , neu!	—,50	4	—
30.	pubescens Souvenir de Billard, neu!	—,50	4 1/2	—
15.	Satsumi, <i>Part?</i> VII, aus Japan, Blätter breit, geadert	—,50	4	—
16.	Schrenki, <i>Rapr.</i> , Schrenk's Pf., VII, ähnlich Nr. 15, scheint etwas höher zu werden	—,40	3	—
17.	undulatus, <i>Hrt.</i> , Welliger Pf., VII	—,40	—	—
26.	Yokohamae, <i>Sieb.</i> , Neue Einführung aus Japan	—,40	3	—
Pirus, L. Birne, Aepfel.				
a) Aechte Birnen. (Piraphorum)				
30.	communis, <i>L.</i> , Waldbirne; s. Obstwildlinge			
31.	fol. var., <i>Hrt.</i> , weissgerandet, constant, VII,	—,75	—	—
T. 33.	elaeagnifolia, <i>Pall.</i> , Oelbaumbl. B., Belaubung weissfilzig, hängend, VI,	—,75	6	—
35.	Michauxi, <i>Hrt.</i> , Belaubung graugrün, starke Pyramiden . M. 0,75 bis	1,25	6—10	—
36.	nivalis, <i>L. fil.</i> , Schneebirne, Laub graugrün	—,75	—	—
37.	persica, <i>L.</i> , (P. cuneifolia, <i>Guss.</i> , Crataeg. cuneif., <i>Hrt.</i>), Persische B., VII	—,75	—	—
39.	Pollveria, <i>L.</i> (= auricularis, <i>Knoap.</i> = Bollwilleriana, <i>D. C.</i>), Lazarob Hagebuttenbirne	—,75	6	—
T. 40.	salicifolia, <i>L. fil.</i> , (= salicifol. pendula, <i>Hrt.</i>), Weidenblättrige B., mit feinem, silberfarbenen Laube und hängenden Zweigen	1,—	9	—
	Hochstämme	1,50	13	—
b) Aepfel, (Malus) 10 Sorten à 1 St. 7 M.				
53.	baccata, <i>L.</i> , Beeren-A., Frucht klein, glänzend roth, V. M. 0,50 bis	1,—	4—9	—
54.	cerasifera, <i>Hrt.</i> , Kirschentragender B-A, V.	—,75	6	—
73.	fr. luteo, <i>Hrt.</i> , Frucht gelb, gross, Starke Pyramiden, M. 0,75 bis	1,50	6—12	—
74.	fr. maximo, <i>Hrt.</i> , Frucht scharlach, gross . M. 0,60 bis	1,—	5—9	—
55.	oblonga	—,60	5	—
56.	sphaerocarpa, Wender, (? bacc. K)	—,75	6	—
57.	coronaria, <i>L.</i> , Geschmückter A., Blumen gross, wohlriechend, schön belaubt	—,75	6	—
58.	dioica, <i>Mueh.</i> , (apetala, <i>Mueh.</i>) Grün blühender Feigen-A.	—,75	6	—
50.	Malus, <i>L.</i> , s. Obstwildlinge.			
b. 64.	aucubaefolia, <i>Hrt.</i> , Ankubenblättriger A., hübscher Tafelapfel M. 0,75 bis	1,50	—	—
b. 65.	argenteo-marginata, <i>Hrt.</i> , Weissrandiger A., schön, constant, VII	—,75	—	—
b. 66.	aureo-marginata, <i>Hrt.</i> , Goldrandiger A., schön	—,75	6	—
T. 86.	pendula „Elise Rathke“, <i>Hrt.</i> , s. Neuere Gehölze	6,—	6	—
79.	microcarpa praecox, <i>Hrt.</i> , Früher kleinfrüchtiger A.	—,75	6	—
59.	prunifolia, <i>Willd.</i> , pflaumenblättriger A.	1,—	—	—
60.	fr. coccineo, <i>Hrt.</i> , scharlachfrüchtiger Wachsapfel, starke Pyramiden	1,50	5—12	—
T. 76.	pendula, <i>Hrt.</i> , hübscher Trauerbaum	2,—	13	—
52.	pumila gallica, <i>Hrt.</i> , Splitt-A. Doucin, VI (s. auch Obstwildlinge) . .	—,50	—	—
81.	rivularis, <i>Hook.</i> , ähnlich Nr. 71	—,50	4	—
80.	sibirica fructu coccineo, Sibirischer scharlachblühender Wachsapfel	—,75	6	—
P. 88.	Ringo fastigiata bifera, <i>Hrt.</i> , Zoesch, s. Neuere Gehölze	2,—	—	—
68.	spectabilis fl. pl., Gefüllter Pracht-A., VI gef. hellrosa, M. 0,60 bis	1,—	5—8	—
T. 69.	floribunda, <i>Sieb.</i> , Reichblühender Pracht-A., Knospen dunkelroth, VI., sehr beliebte Varietät	—,60	5	—
	hübsche Trauerbäume	2,—	—	—
84.	imperialis, <i>Hrt.</i> ,	1,50	—	—
61.	Kaïdo, <i>Sieb.</i> , Kaïdo-Pr.-A., V., reichblühend, Früchte gelb, von der Grösse einer grossen Kirsche	1,—	—	—
62.	Ringo, <i>Sieb.</i> , Ringo-Pr.-A., V, Starke Pyramiden, M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
78.	Riversi pl., <i>Hrt.</i> , halb gefüllt, leicht rosa, schön	—,75	—	—

Ziergehölze.

No.	Pirus.	perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrrätig
70.	Tenori fl. carneo pl., Hrt., gefüllt rosa	—,75	7	—
85.	The Fairy (Zierfrucht)	1,—	9	—
T. 71.	Toringo, Sieb., (Mal. pendula, H.), Toringo-A., mit zahlreichen kleinen carminrothen Blüthen und erbsengrossen Früchten	—,60	5	—
	Planera, Gmel. Planere.			
T. 501.	aquatica, Walt., Wasser-Pl. elegant hängend . . . M. 0,75 bis	1,75	6	—
"	Hochstämme, sehr zieherender Trauerbaum	2,50	—	—
* 504.	Keaki, Hrt., Japanische Pl., hübsch belaubt . . . M. 1 bis	2,—	8	—
503.	repens, Hrt., Kriechende Pl. M. 0,75 bis	2,—	6	—
T. 503.	" Hochstämme, sehr effectvoll! eleganter Trauerbaum	2,50	—	—
502.	Richardi, Wehe., (Rhamn. carpinifolia, Pall.), stark hängend M. 0,60 bis	1,50	5	—
505.	Verschaffelti, Hrt., (= Ulm. Versch.)	1,—	—	—
	Platanus, L., Platane.			
5.	californica, Hrt., kalifornische Pl.	1,50	—	—
3.	occidentalis, L., N.-Amerika	1,—	9	—
11.	" fol arg. var., Späth., s. Neuheiten!	3,—	—	—
1.	orientalis, L., Gemeine Pl. Pyramiden	1,—	8	*
7.	pyramidalis, Hrt., Pyramiden Pl	1 25	—	—
	Populus, L., Pappel. Siehe auch Alleeabäume.			
1.	alba, L., Silberpappel	—,40	3	*
36.	" Bolleana, (Lauche) s. Neuheiten. 2—5jähr Veredl.	2,—	15	—
"	Starke Hochstämme	3,—	—	—
2.	" nivea, Hrt., Aechte Silberpappel, ausserordentlich werthvoller Landschaftsbaum 2—3 m. hoch	— 50	4	*
29.	angulata, Ait., (macrophylla, Lodd.), Karolinische P., auffallend durch die sehr grossen Blätter und die eckigen jungen Zweige, jung etwas empfindlich	—,75	6	—
12.	" Medusae, Hrt., Blätter kleiner und härter	—,75	6	—
13.	balsamifera macrophylla, Hrt., Grossblättrige Balsam-P., Unterseite der Blätter silbrig	—,50	4	—
14.	" suaveolens, Fisch., Wohlriechende P., die klebrigen Knospen haben einen sehr angenehmen Geruch	—,50	4	—
15.	" viminalis, Lodd., schmalblättrig	—,60	5	—
16.	betulaefolia, Prsh., Birkenblättrige Schwarz-P.	1,—	9	—
26.	canadensis, Much., (monilifera, Ait.), Kanadische Schwarz-P.	—,50	4	*
32.	" aurea (van Geert), Neuheit, mit gelben Blättern, ähnlich der „Quercus Concordia“, landschaftlich sehr wirkungsvoll Bei üppigem Wuchs tritt die gelbliche Färbung besonders hervor ca. 1½ bis 2 m. h. 1jähr. Stecklinge	—,75 —,20	6 1 ½	* *
17.	candicans, Ait., (Ontariensis, Desf.), Weissliche Balsam-P., mit grossen unterseits silberglänzenden Blättern . . . M. 0,50 bis	1,50	4—13	*
T. 11.	canescens pendula, Hrt., (Parasol de St. Julien), Trauer-Gran-P., hübsch Hochstämme	2 —	—	—
19.	Eugenei, Simon-Louis, Abart der Kanadischen P., ausserordentlich schnellwüchsig M. 0,60 bis	1,25	3—12	—
P. 3.	fastigiata, Desf., Italienische Pyramiden-P. M. 0,60 bis	1,50	3—12	*
3.	Sehr starke Hebst. M. 1 bis	2,—	9—18	—
P. 34.	" gigantea, Hrt.	—,60	5	—
21.	" mascula (Plantierensis mascula), aus dem Berliner Botani- schen Garten stammend M. 0,50 bis	1,25	4—10	—
T. 24.	grandidentata pendula, Hrt., grossgezähnte hängende P.	2,—	—	—
P. 4.	hybrida Berolinensis, C. Koch, Berliner Lorbeer-P. Hybride von P. laurifolia und canadensis (im Berliner Botanischen Garten entstanden), im Wuchse ähnlich der Pyramiden-P., jedoch etwas lockerer gebaut und die Blätter grösser. Ihr Haupt- vorzug aber besteht darin, dass sie früher austreibt, ihre Blätter weniger von Insekten angegriffen werden und die Wurzeln eine geringere Ausdehnung besitzen	—,50	4	*
5.	laurifolia, Lodd., Lorbeerblättrige P., wird 14 Tage früher grün, und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., II. s. Alleeabäume M. 0,50 bis	1,—	4—9	*
30.	nigra, L., Schwarz-P.	—,50	4	*

Ziergehölze.

No	Prunus.	per Stück	10 Stück	hundert-
		M.	M.	weise
30.	<i>Cerasus sempervirens</i> , <i>Hrt.</i> , dunkel glänzendgrün	—,75	—	—
28.	<i>fruticosa</i> <i>Pall.</i> , kugelförmige Strauchweichsel	1,75	—	—
T. 29.	„ <i>pendula</i> hängende Strauchw.	2,25	15	—
* 30.	<i>japonica fl. albo pl.</i> (<i>Pr. sinensis fl. albo pl.</i>), Weiss gefüllte japan Zwergk	—,50	3 1/2	—
* 31.	„ <i>roseo pl.</i> , Rosa gef. japan. Zwergk.	—,50	3 1/2	—
	<i>Diese beiden Letzteren</i> stark veredelt	—,30	2 1/2	—
34.	<i>Pseudo-Cerasus Lindl.</i> fl. <i>roseo</i> (= <i>C. Sieboldi</i> , Carr.)	1,—	9	—
170.	<i>semperflorens</i> , <i>Ehrh.</i> , Allerheiligenkirsche, blüht bis in den Herbst hinein	1,25	11	—
	Hochstämme M. 1,75 bis	2,25	15	—
c) Traubenkirschen (<i>Padus</i>).				
40.	<i>Mahaleb</i> , <i>L.</i> , Steinweichsel, Blätter und Holz wohlriechend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt, V., sehr stark	—,40	3 1/2	—
41.	„ <i>compacta</i> , <i>Späth.</i> , Eine hier entstandene sehr gedrängt wachsende reichbelaubte Abart	—,75	6	—
56.	„ <i>fructu luteo</i> , <i>Hrt.</i> , gelbfrüchtig	—,75	6	—
57.	„ <i>monstrosa</i> <i>Hrt.</i> , Monströse	1,—	—	—
43.	<i>Padus</i> , <i>L.</i> , Gemeine Traubenk., V., VI.	1 1/2—2 m h.	3 1/2	—
	Hochstämme M. 1 bis	1,50	—	—
b. 44.	„ <i>aucubaefolia</i> , Aukubenblättr. Traubenk., Blätter regelmässig punktiert, sehr hübsch	—,75	6	—
	starke Pyramiden und Halbstämme M. 1,25 bis	3,—	11—25	—
55.	„ fl. pl. <i>Hrt.</i> , Gefüllte Traubenk.	1,—	8	—
b. 2.	„ fol. varieg., <i>Hrt.</i> , s. <i>Neuere Gehölze</i>	2,50	—	—
b. 85.	„ <i>heterophylla elegans variegata</i> , <i>Hort.</i> , Buntblättrige verschiedenblättrige Traubenkirsche.	1,25	10	—
45.	„ <i>Lanceana</i> , Lauche (<i>rotundifolia</i>), <i>Hrt.</i>	1,50	6	—
	Starke Hochstämme	2,50	20	—
86.	„ <i>Maacki</i> , <i>Hrt.</i>	—,75	6	—
45.	„ <i>rotundifolia</i> , <i>Hrt.</i> , (= <i>Lauchéana</i> , <i>Bolle.</i> grossblättrig u. grossfrüchtig.	1,50	6	—
	Starke Hochstämme	2,50	20	—
45.	<i>serotina</i> , <i>Ehrh.</i> , Späte Traubenk., Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V., VI.	—,40	3 1/2	—
47.	„ <i>cartilaginea</i> , <i>Lehm.</i> , pergamentblättrig. Sehr schön, 1—2 m. M. h. 0,60 bis	1,50	5—13	—
	<i>prachtvolle Pyramiden, Solitärpflanzen</i> ca. 3—3 1/2 m. h. und über 2 m breit M. 2 bis	6,—	27	—
	Hochstämme M. 2 bis	6,—	18—50	—
	für Alleen ganz vorzüglich geeignet.			
50.	<i>virginiana</i> , <i>Ehrh.</i> , Virginische Traubenk. m. reichen rothen Trauben	—,40	3 1/2	—
T. 52.	„ <i>pendula</i> , <i>Hrt.</i> , hängend	—,75	6	—
	Hochstämme	1,75	16	—
Ptelea, <i>L.</i> , Lederbaum.				
1.	<i>trifoliata</i> , <i>L.</i> , Dreiblättriger L. V.	—,30	2 1/2	—
b. 3.	„ <i>aurea</i> , Behnisch, s. <i>Neuere Gehölze</i>	4,—	—	—
b. 2.	„ fol. varieg., <i>Hrt.</i> , s. <i>Neuere Gehölze</i>	2,50	—	—
Pterocarya, <i>Kh.</i> , Flügelauss.				
1.	<i>caucasica</i> , <i>C. A. Mey.</i> , Kaukasische Fl., einer der schönsten und schnellwüchsigsten Bäume. Er erreicht bei uns in 25 Jahren eine Höhe von 15 Metern und sollte seiner hervorragenden landschaftlichen Wirkung wegen in keiner Parkanlage fehlen. Als Waldbaum ist er seiner bedeutenden Holzproduction wegen sehr zu empfehlen. Siehe auch Alleeabäume M. 0,60 bis	1,25	5 1/2—10	50—90
	Hochstämme M. 1,50 bis	4,—	14	30—135—220
2.	<i>laevigata</i> , <i>Hrt.</i> , glatthblättr. Fl.	—,75	6	—
3.	<i>sinensis</i> , <i>David.</i>	1,25	4	—
Quercus, <i>L.</i> , Eiche. Nach meiner Wahl 12 Sorten à 1 St. 15 M.				
Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreichtums und ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung.				

Ziergehölze.

No	Quercus.	perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
I. Eichen der alten Welt.				
a) Robur, Verwandte der deutschen Eichen.				
3.	apennina, Lam., Apeninen-E.	M. 1 bis	2,—	9—18
158.	Esculus, Hrt., bot. Th., nicht zu verwechseln mit Qu. Escul. L.	1,50	—	—
103.	pedunculata, Willd. (Q. Robur L., Sommer-E., Stiel-E.)	M. 0,50 bis	1,—	4—9
b. 17.	argenteo-marginata, weissrandig hübsch	M. 1 bis	1,50	9—13
b. 18.	picta, Hrt., sehr hübsch weissbunt	M. 1 bis	2,—	9—18
b. 19.	variegata, weissgestreift	1,50	13	—
b. 20.	atropurpurea, Blut-E., dunkel purpurroth wie die Blutbuche	M. 2 bis	3,—	18—27
11.	aurea bicolor, Hrt., gelb, grün und weiss	M. 1 bis	1,50	9—13
127.	cochleata, Hrt., eigenthümliche, wellig gedrehte Belaubung	M. 1 bis	2,—	9—18
24.	comptoniaefolia, Hrt., sehr zierliches hübsches Laub	M. 1,50 bis	2,50	13—22
140.	major (Alb) Hrt.	M. 1,25 bis	2,—	—
b. 12.	Concordia, Hrt., mit goldgelben Blättern, schön	M. 1,50 bis	3,50	13—22
	Sehr schöne Hochstämme	2,—	18	—
b. 129.	ecucullata fol. arg. var. Hrt., Blätter kappenförmig, gelblich weissbunt	M. 1,50 bis	2,50	13—22
21.	cuprea Hrt., junges Blatt fast kupferfarbig	1,25	—	—
P. 13.	fastigiata, (Qu. fastig., Lam.), Pyramiden-E., 1—2½ m. h.	M. 1 bis	5,—	9—40
P. 15.	ecucullata, Hrt., Hohlblättrige Pyramiden-E.	2,—	18	—
P. 105.	cupressoides Hrt., dichtgedrängte Pyramiden bildend	M. 1,25 bis	2,50	10—20
P. 14.	monstrosa, Hrt., starke Pyramiden	2,50	—	—
P. 106.	viridis, Hrt., Grüne Pyramiden-E.	M. 1,25 bis	2,50	10
16.	filicifolia, Topf., Farnblätter St.-E., Laub hellgrün, stark zerschlitzt, zierlich	M. 1 bis	2,50	9—20
b. 138.	fol. aureis, Hrt. (= leucocarpa)	4,50	40	—
b. 130.	fol. aureo var., Hrt., Blatt schön gelbbunt	1,50	13	—
26.	heterophylla Lond., Ungleichblättr. St.-E.	M. 1 bis	1,50	9—13
10.	ecucullata, A. M., mit aufgetriebenen verschieden gestalteten Blättern	1,50	13	—
107.	lyrata punctata, Hort. Gall. gefleckte lyraartige	M. 1 bis	1,50	9—13
28.	Hentzei, Hrt., Hentze's St.-E.; eigenthümliche gekräuselte Belaubung	M. 1,25 bis	2,50	10—20
157.	leucocarpa, Hrt., (= ped. fol. aureis) neue Form der deutschen Stieleiche, mit hellen fast weisslichen Blättern, röthlichen Rippen und Blattstielen. Sehr effectvoll	4,50	—	—
b. 22.	maculata, Hrt., weiss gefleckt	M. 1,25 bis	2,00	10—18
109.	multicaulis, Bth. C. Vielstielige E.	1,50	13	—
132.	nigricans, Hrt., Laub röthlich braun	M. 1,50 bis	3,—	13
131.	pallida, Hrt., Laub gelblich grün	1,25	10	—
29.	pectinata, Hrt., Kammlättr. E.; weit ausgezackt, s. schön	M. 1,25 bis	2,—	13—18
	pendula, Hrt., Trauer-E.	2,50	—	—
T. 25.	Dauvessii, Hrt., s. schöne Trauer-Eiche	2,50	—	—
T. 99.	nova, Hrt. Neue Trauer-E.; schön	2,50	—	—
T. 110.	rubicunda, Hrt., (= cuprea, Hrt.), Laub röthlich	1,50	13	—
134.	pulverulenta, Hrt., bestäubt weissbuntblättrig	M. 1 bis	1,50	9—13
b. 23.	rubrinerva, Hrt., Rothnervige E.	1,25	—	—
111.	Pseudo-Aegilops, Arb. Musc., (= Aegilops Hrt), Falsche Knoppereiche, sehr zierend	1,25	—	—
31.	pendula, Arb. Musc., (= Cerris pendula de Lapanouse, Hrt.), Hängende falsche Knoppereiche	1,50	13	—
T. 32.	pubescens, Willd. (= lanuginosa Thuill.), Weichhaarige E., graugrün	1,25	—	—
33.	altissima, Hrt., Wuchs emporstrebend	1,50	12	—
54.				

Ziergehölze.

No.	Quercus.	per Stück M.	10 Stk. k M.	hundert- welse vorrätig
63.	pubescens, Hentzei C. K., (= sessifl. Hentzei Arb. Musc.), Hentze's weichhaarige Eiche.	1,25	—	—
37.	sessiliflora acuminata, Hrt., spitzblättrige E.	1,—	—	—
46.	" Afghanistanensis, Bth., C. glänzendblättrig . . . M. 1,25 bis	2,50	10—20	—
39.	" cochleata, Hrt., Löffelblättrige . . .	1,25	—	—
40.	" Falkenbergensis, Bth., C. Falkenberg's E. grossblättr. M. 1,25 bis	2,50	10—20	—
41.	" Geltowiensis Hrt., schöne Form mit schmalen, starkblasigen Blättern . . .	1,50	13	—
161.	" Giesleri , Späth, s. Neuheiten . . .	4,—	30	—
43.	" longifolia hybrida , A. M., Langblättr. Bastard-E., sehr lang und schmalblättrig, hübsche Sorte . . .	1,50	13	—
42.	" Louetti , A. M., Louett's E., starkwüchsig mit dunkelgrünen, glänzenden, lorbeerähnlichen Blättern, hübsch . M. 1,25 bis	2,—	10—18	—
136.	" purpurea , Hrt., Farbe der jungen Blätter schön bräunlich purpurroth . . .	1,50	13	—
48.	Sieboldi, Arb. Musc., (= austriaca Sieb.) Siebolds-E.	1,50	—	—
51.	species a. Nikita, Bth., neue von Nikita.	1,50	—	—
49.	Thomasi, Ten., Thomas'sche	1,50	—	—
50.	ventricosa, Bth., C.,	1,25	—	—
b) Cerris, Cerr-Eiche , (Türkische oder Burgunder-E.)				
Blätter scharf gezähnt, Früchte im 2. Jahre reifend				
113.	Cerris, L., Cerr-E., Burgunder-E. M. 0,75 bis	1,50	6—12	*
115.	" austriaca sempervirens Hort., Eine sehr zu empfehlende immergrüne Eiche, die einzige, die bei uns winterhart ist . . .	3,—	25	—
55.	" cana minor, Lodd., kleinblättrige graue	1,50	—	—
56.	" crispa, Hrt., Krausblättrige C-E.	1,25	10	—
60.	" Fulhamensis Lodd., C-E. von Fulham	1,50	13	*
66.	conferta , Kit., (Qu. pannonica, Bth.) Dichtfrüchtige E., sehr schöne grossblättrige Sorte M. 1,25 bis	3,—	11—25	*
137.	Dainyo , Hrt., Kaiser-E., neu aus Japan M. 1,25 bis	3,—	11—25	—
142.	dentata Alberti, Hrt., Alberts gezähnte E. aus Holland	2,50	—	—
64.	macranthera , F. et M., Grossbl. E. mit herrlichen, dunkelgrünen Blättern; unter den grossblättrigen vielleicht die schönste M. 1,25 bis	2,50	11—22	*
	" Hochstämme	2,50	22	—
65.	mongolica, Fisch., mongolische E.	1,25	—	—
II. Elchen der neuen Welt (Nordamerika).				
69.	alba, L., Weisse E., prächtig rothe Herbstfärbung . . . M. 1,25 bis	2,—	10—18	—
70.	" elongata Hrt., orangerothe Herbstfärbung	1,50	13	—
114.	ambigua, Willd., Zweifelhafte E. M. 1,25 bis	2,—	10—18	—
67.	Ballota Desf., Früchte geniessbar M. 1,— bis	1,75	—	—
119.	coccinea , Wang., Scharlach E. Herbstfärbung roth . . . M. 0,75 bis	1,50	6—13	*
	" Hochstämme	1,25	10	—
88.	falcata, Mchx., (= cuneata, Wangh.), Keilblättr. E., aus N.-Amerika .	1,75	—	—
90.	ilicifolia, Wangh., (= Banisteri, Mchx.), Hülsenblättr., strauchartige E.	1,—	9	—
94.	imbricaria, Willd., Schuppenfrüchtige E. Dieselbe verdient durch das prächtig rothe Herbstcolorit der lorbeerartigen, theilweise etwas gelappten Blätter, eine allgemeine Verbreitung in den Park-Anlagen	1,50	13	*
77.	macrocarpa, Mchx., Grossfrüchtige E., mit auffallend grossen und schönen Blättern M. 0,75 bis	1,50	6—13	—
78.	monticola , (= Castanea, Hrt.), Bergkastanien-Eiche, die Blätter ähneln sehr denen der Castanea vesca, Baum raschwüchsig und schön	1,50	—	—
92.	nigra, L., Schwarze E., bemerkenswerth durch die grossen, grünen, auf der unteren Seite schön braunrothen, festen Blätter, die im Herbst dunkelroth sich färben	2,—	—	—
71.	obtusiloba, Mchx., (= stellata, Wangh.), Stumpflappige E., mit schöner Herbstfärbung	1,75	—	—
72.	olivaeformis, Mchx. fil., Olivenfrüchtige E. M. 0,75 bis	1,75	6—15	—
73.	" Hampteri, Hrt., mit grösseren Blättern als No 72 M. 0,75 bis	1,50	6—13	—
	" Hochstämme	1,50	—	—

Ziergehölze.

No.			perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
Quercus.					
79.	paludosa, Hrt.	M. 1.50 bis	2,—	—	—
121.	palustris, Dur, Sumpf-E, gezacktblättrig	Hochstämme M. 1.25 bis	—,75	6	—
			2,50	10—22	—
75.	ramosa, Bth. C., Verzweigte E., zu der Gruppe der weissen Eichen gehörig		1,50	—	—
76.	striata, Bth. C., verzweigte und gestreifte E.	M. 1 bis	2,—	—	—
93.	repanda, Arb. Musc. schöne Belaubung		1,50	—	—
122.	rubra, L., Reth E, Herbstfärbung roth		—,75	6	—
		Hochstämme	1,25	10	—
82.	tomentosa bicolor, Willd., Zweifarbig filzige E.		1,25	11	—
		Hochstämme	2,—	18	—
83.	cucullata, Arb. Musc. hohlblättr. Kastanien-E. (= Pr. toment. cucullata)		1,50	—	—
Rhamnus, L., Wegedorn, Kreuzdorn.					
1.	alpina, L., Alpen-Kreuzdorn		1,—	9	—
h. i. 3.	Billardi, Hrt.		—,75	—	—
4.	cathartica, L., Gemeiner Kreuzd., gut zu Hecken, VI		—,25	2	—
h. i. 5.	chlorophora, Hrt., hellgrün, schmalblättrig, halb immergrün		1,—	9	—
6.	dumosa, Hrt., Dornreicher Kr.		1,—	—	—
8.	Frangula, L., Faulbaum, Pulverholz, VI		—,25	2	—
9.	grandifolia, F. u. M. (Rh. Imeretina, Hrt.), Grossblättriger Wedeg. schön, in derselben Art wie Rh. alpina, aber grossblättriger		2,—	15	—
17.	Pallasi, F. et M., Pallas' Kr.		—,75	—	—
16.	saxatilis, L., Felsen-Kr.		—,75	—	—
14.	tinctoria, W. et K., Färber-Kr.		—,75	—	—
18.	Wicklins, Hrt., Wicklius' Kr.		1,—	—	—
Rhodotypus, S. et Z., Scheinkerre.					
1.	kerrioides, S. et Z., weissblühende Sch.		— 40	3	—
Rhus, L., Sumach (Essigbaum)					
8.	copallina, L., Kopal-S., colorirt hübsch roth im Herbst		—,60	—	—
12.	Cotinus, L. (Cotinus Coccygea, Scop.), Perrückenstrauch, der Frucht- stand gleicht einer Perrücke, VI		—,50	4	—
1.	glabra, L., Glatter S., V		—,50	4	—
2.	" elegans, Ait., rothblühender, glatter S.		—,60	5	—
23.	" laciniata, Hrt., Geschlitzter gl. S. mit fusslangen, fein ge- schlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung, als Einzelpflanze auf Rasen		— 75	6	—
10.	juglandifolia, Wall., Japan, (= Rh. vernicifera, D. C., Rh. Vern- nix, L.), Nussbl. S.		1,—	—	—
7.	Osbecki, D. C., schön grossblättrig		—,75	—	—
13.	suaveolens, Ait., wohlriechender, aber giftiger S.		—,75	—	—
4.	typhina, Torr., Virginischer S., V, die rothen Früchte sehr zierend		— 40	3	—
		Schöne starke Hochstämme	1,50	12	—
5.	Toxicodendron, L., giftiger S., N.-Amerika, mehrjähr. Samenpfl.		1,—	9	—
6.	venenata, D. C., Gift enthaltender S.		1,—	9	—
Ribes, L., Johannisbeere, Stachelbeere 12 Sorten à 1 St. 4 M.					
Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Ausgrünen, die Schön- und Goldtrauben durch ihre Blüthen, die Ahlbeeren durch ihre kräftige Belaubung.					
1.	acerifolium, Hrt., Ahornblättrige Goldtraube, VI		—,25	2	—
2.	albidum, Hrt., Weissblühende Johannisb., VII		—,35	3	—
3.	alpinum, L., Alpen-Joh., VII., sehr früh austreibend		—,25	2	18
22.	" praecox, Fröhltreibende Alpen-Joh.		—,30	2 1/2	—
133.	" pumilum aureum, Hrt., von compactem, zwergigen Wuchse mit goldgelben Blättern; neu!		— 50	4	—
132.	atropurpureum, C. A. Mey (= petraeum, Walp.) Rothblüh. Johannisb.		—,50	4	—
5.	aureum, Prsk., Aechte Goldtraube, VI., gelbblühend, Blätter im Herbst roth		—,25	2	—
6.	diacantha, Pall., Doppelstacheliche Alpen-J., VII.		—,25	2	—
4.	floridum, L'Herit. (= americanum, Mill.), Amerikanische Ahlbeere, VI., Blätter im Herbst rothbraun, hübsch!		—,30	2 1/2	—
7.	gingkaefolium, Hrt., Ginkoblättrige Goldtraube, VI.		—,40	3	—

Ziergehölze

No.	Ribes.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
8.	Gordonianum , Lem., Gordon's Schöntraube, Blüthe orangegelb, schön, VI.	—,35	3	—
31.	Grossularia arboreum , (R. uva crispa arboreum), Baumartige Stachelb.	—,35	3	—
10.	nigrum , L., Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisb., VI.	—,20	1 1/2	—
11.	" heterophyllum , Hrt., Gezacktblättrige Ahlb., schön . . .	—,40	3	—
b. 12.	" fol. arg. var., weissbunt marmorirt, VII.	—,40	3	—
b. 13.	" fol. aur. var., Goldbuntblättrige Ahlb.	—,35	2 1/2	—
14.	niveum , Lindl., Weissblühende Stachelb., VII.	—,40	3 1/2	—
16.	rotundifolium , Mchz. (R. triflorum, Willd.), Rundblättr. Stachelb. VII.	—,40	3	—
17.	rubrum , L., Gemeine Joh., (s. auch unter Obst)	—,20	1 1/2	—
25.	" fol. aureo-marg., Gemeine, gelbgerandete J., sehr hübsch	—,40	3 1/2	—
18.	sanguineum , Prsh., Rothblühende Schöntraube, VI., VII., schön. . .	—,40	3 1/2	—
26.	" carneum grandiflorum , fleischfarbig	—,50	4	—
36.	" fl. carneo pl., Hrt.	1,—	9	—
29.	" fl. pl., gefüllt blühend	—,60	5	—
19.	saxatile , Pall., Fels-Alpen-Joh., VII.	—,30	2 1/2	—
20.	setosum , Dougl., Borstigfrüchtige Stachelbeere	—,40	3 1/2	—
Robinia , L., Akazie . (Robinie) 12 Sorten à 1 St. 10 M				
Die Akazien nehmen mit sandigem Boden fürlieb und empfehlen sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben und zierliche Belaubung.				
5.	hispida , L., Borstige, rothblühende A., wächst mehr strauchartig und blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgende Abart. Starke Sträucher u. Mittelstämme M. 1 bis	2,—	9—18	—
30.	" arborea , Hrt., sehr wenig rauh	1,50	—	—
6.	" Camuseti , Hrt., Camuset's b. A.	1,25	—	—
7.	" complexa , Hrt., borstige, gedrängtblüthige A., starke Sträucher und Mittelstämme M. 1 bis	2,—	9—18	—
8.	" inermis , Hrt., borstige, stachellose A. M. 1 bis	1,50	—	—
9.	" macrophylla , Schrad., Grossblättr. b. A.	1,50	—	—
10.	Pseudo-Acacia , L., Gemeine Akazie, (s. Alleebäume und Gehölzsämlinge)	—,40	3	25
11.	" amorphaeifolia , Lk., Unformblättrige gem. A.	—,75	6	—
12.	" angustifolia elegans , Hrt., äusserst zierlich belaubt, schwachwüchsiger als die gemeine A., neu! . . . M. 1 bis	2,50	9—20	—
13.	" aurea , Hrt., Gelbblättrige, sehr schön	1,25	10	—
14.	" Bessoniana , Hrt., Besson's Kugel-A., von üppigerem Wuchse als die gewöhnliche Kugel-A. aber mit lockerer Krone .	—,75	6	—
12.	" rosea Berolinensis , Spth., centifolienrosa mit sehr dichten Blüthentrauben, Blätter elliptisch ohne besondere Spitze. Blüthensüele und Zweige schön hellgrün	1,50	—	—
	" Hochstämme	2,50	22	—
15.	" Camuseti , Hrt., Camuset's g. A. mit dunkeltem Laube M. 0,75 bis	1,50	6—13	—
16.	" crispa , D. C., Krausblättrige g. A., interessant M. 0,75 bis	1,25	6—13	—
17.	" cylindrica , Hrt., Walzenförmige g. A.	1,25	—	—
18.	" Decaisneana , Hrt., Decaisne's rothblühende A., ähnlich No. 3, etwas heller und früher blühend	1,—	—	—
	" Hochstämme	2,—	—	—
20.	" glaucescens , Hrt., graue A., mit leicht gekräuselten Blättchen M. 1 bis	1,50	9—13	—
24.	" heterophylla , Hrt., (R. monophylla, Hrt.), sehr schön . . .	1,25	10	—
21.	" inermis , D. C., Kugel-Akazie Hochst. M. 1,50 bis	3,—	12—25	—
22.	" Rhederi , Rheder's Kugel-A. Hochstämme	2,50	—	—
32.	" linearis , Hrt., schmalblättr. A.	1,50	13	—
45.	" monophylla pendula , Hrt., Zoesch. s. Neuere Gehölze . . .	3,—	—	—
34.	" pendula , Hrt., Hänge-A., Zweige horizontal abstehend. Höchst.	3,—	—	—
41.	" pendulifolia , Hrt., Blätter herabhängend M. 1 bis	1,75	9—15	—
39.	" robusta , Vignei, Hrt., Vigne's starkwüchs. A. Mittelstämme	2,—	—	—
44.	" rosea , Hort., schön rosa blühend M. 1 bis	1,50	—	—
	" Hochstämme	2,50	20	—
38.	" semperflorens , Hrt., im Frühherbst zum 2ten Mal und ganz vollblühend M. 1 bis	2,—	8—16	—
27.	" speciosa , Hrt., von ungemein kräftigem Wuchs, h. M. 1 bis	1,50	7—13	—

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

No			perStück M.	10 Stück M.	hundert- weißen vorrätig
	Robinia.				
T. 28.	Pseudo-Acacia tortuosa,	D. C. Tr.-A., mit merkwürdig gedrehten Zweigen . . . Hochstämme elegans, Hrt., Tr.-A., mit sehr stark gedrehten Zweigen und zierlicher Belaubung . . . Hochstämme	3,—	—	—
29.	" "	" microphylla, Hrt., kleinblättr. Trauer-A. . . Hochstämme	3,—	—	—
36.	" "	" umbraeulifera latifolia, Hrt., Grossblättrige und sehr dunkellaubige Kugel-A. . . M. 1 bis	2,50	—	—
1.	viscosa, Vent.	(R. glutinosa, Sims), Klebe-A., 2 mal blühend, hellrosa . . . M. 0,75 bis	1,50	9 — 13	—
3.	" bella rosea, Hrt., schön rosa . . .	Hochstämme	1,—	—	—
4.	" horrida, Hrt., stark bewehrte A. . .	Mittelstämmchen	2,—	17	—
	Rosa, L., Rose.				
61.	fraxinifolia, eschenblättr. R., Strauch sehr stark und schön duftend	—,50	4½	*	
	multiflora, (de la Grifferaie), schönest starke Sträucher für Gehölzgruppen	—,50	3½	* *	
	rubicunda, Schottische Zaunrose (sweet briar), Mehrjähr. Samenpf.	—,60	5	*	
321.	rubrifolia, rothblättr. R. . . Die übrigen siehe Rosen-Sortiment.	—,60	5	*	
	Rubus, L. Himbeere, Brombeere, s. auch Obst.				
S. 517.	articus, L., Nordische Himbeere, zwerghaft, mit lila-rosa Blüten; die Früchte sollen wohlschmeckend sein und im hohen Norden wie die unserer gem. Himbeere benutzt werden . . .	—,40	3	—	
S. 512.	cristataefoliatus, Weissdornblättrige Brombeere Ich bezog diese Brombeere aus dem Petersburger Bot. Garten, sie zeichnet sich durch ihre grossen, schön geformten Blätter aus . . .	—,50	4	—	
S. 513.	fruticosus fl. albo pl., Hrt., weiss gefüllt blühende Brombeere . . .	—,50	4	—	
506.	nepalensis, Schk. . .	—,50	4	—	
502.	odoratus, L., Wohlriechende Himbeere, mit grossen, lilafarb. Blüten	—,30	2	*	
S. 511.	parvifolius, Hrt., Kleinblättrige Bromb., zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen, wächst auch auf reinem Sande. Früchte blutroth . . .	—,50	—	—	
505.	spectabilis, Persh., Prächtige Himbeere, blüth schön purpurroth . . .	—,40	3	—	
	Salix, L., Weide				
	25 Sorten à 3 St. 12 M., 25 Sorten à 1 St. 6 M., 50 Sorten à 1 St. 12 M.				
28.	acuminata, Sm., (-Smithiana, Willd., -viminalis Caprea, Wimm.), Blätter oft s. gr., oberseits schön dunkelgrün, unten grau-filzig, schön lancifolia, H. B. Vrat. . .	—,40	3	*	
91.	" "	—,40	3	*	
92.	acutifolia, Willd. . .	—,40	3½	—	
30.	Aglaja, Hrt., (sp. daphnoides) . . .	—,50	—	—	
11.	alba argentea, Hrt., (regalis v. Htt.), Silber-W., Blätter silberfarben, schön! . . .	—,30	2	—	
32.	Ammanniana, Willd. . .	—,30	2	*	
b. 12.	amygdalina discolor, Hrt. . .	—,30	2	*	
96.	pallida Hrt, gute Bindeweide . . .	—,30	2	*	
* 13.	annularis, Hrt., (pendula annul., C. Koch), Locken-W., s. auffallende Form	—,50	4	—	
b. 94.	aquatica fol. arg. var., Hrt., schön weissbunt, neu! . . .	—,50	4	—	
94.	argentea-aurea, Wimm., Geührte Silberweide . . .	—,40	3	*	
36.	austriaca, Host., (purpurea caprea hybr.) . . .	—,40	3	*	
82.	Bataviae, Hrt., s. sturkwuchsrig . . .	—,30	2	—	
b. 37.	bicolor, Ehrh., Zweifarbig W., Blätter oben glänzend, unten blau-grün	—,40	3	—	
39.	caprea fol. glabra, Hrt. . .	—,40	3	*	
T. 22.	" pendula, Hrt., Trauer-Palm-W., breitblättrig, schöner Trauerbaum . . . Hochstämme M 1,50 bis	3,50	13—30	*	
1.	caspica, Hrt., (S. pruinoso, Wendl.) Kaspsche W., gute Bindeweide 1000 St. 150 M.	—,30	2	*	
41.	cinerea, L., Grau-W., Blatt. oben mattgrün, unterseits grau-weiss . . .	—,30	2	—	
42.	" acuminata, Hrt., Spitzblättr. Grau-W. . .	—,40	3	—	
b. 23.	" tricolor, C. Koch, (caprea tricolor, Hrt.), Dreifarbig Graue-W., hübsch bunt. . .	—,40	3	—	
44.	" viminalis, Wimm., ähnlich No. 56 . . .	—,40	3	—	
45.	cotinifolia, Sm., mit eirundlichen Blättern . . .	—,30	2	—	
46.	daphnoides, Villt., Reifweide mit lang gereiften Ästen u. Zweigen, schön	—,40	3	*	

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
	Salix.			
30.	<i>daphnoides</i> , Aglaja, Hrt., grossblättriger als vorige	—,40	3	—
5.	" <i>pommeranica</i> , Hrt., vielleicht die starkwüchsigste Weide	—,40	3	"
47.	<i>dascyclados</i> , Wimm., Langblättr. W., sehr raschwüchsig und schön	—,30	2	—
48.	<i>decipiens</i> , Hrt., eine Form der Bruchweide, (S. <i>fragilis</i> L.)	—,30	2	"
49.	<i>discolor</i> , Hrt.,	—,50	—	—
50.	<i>Doniana</i> , Sm., (- <i>purpurea-repens</i> , Wimm.), Don's W.	—,40	3	"
T. 6.	<i>elegantissima</i> , C. Koch (Sieboldi, Hrt. = <i>babylonica femina</i> , Hrt.), Japanische Trauer-W., eine sehr schöne, harte Art mit elegant hängenden Zweigen	—,30	2	"
51.	<i>Forbyana</i> , Sm., Forby's W.	—,30	2	"
3.	<i>fusca</i> , Hrt., Braune W., junges Holz schwarzbraun	—,30	2	—
52.	<i>grandifolia</i> , Ser. (<i>appendiculata</i> , Vüll.), Grossblättr. W.	—,30	2	—
53.	<i>hastata</i> , Hrt.,	—,40	3	"
P. 7.	<i>Helix pyramidalis</i> , C. Koch. (<i>linearis</i> , Hrt. = <i>Josephinae</i> , Hrt. = Eugenei, Hrt.), Pyramiden-Bach-W., hübsch für Anlagen.	—,30	2	"
55.	<i>heterophylla</i> , Hrt., Verschiedenblättr. W.	—,30	2	"
55.	<i>hippophaefolia</i> , Thuill., Sanddornblättr. W., junge Triebe glänzend- silberweiss behaart	—,30	2	—
85.	" <i>undulata</i> , C. Koch (- <i>undulata</i> , Ehrh.)	—,30	2	"
56.	<i>holosericea</i> , Willd. (<i>viminialis-cinera</i> , Wimm.)	—,40	3	—
35.	" <i>angustifolia</i> , C. Koch (<i>aurita viminialis</i> , Wimm.), Schmalblättr. seidenglänzende W.	—,40	3	"
57.	<i>Hoppeana</i> , Willd. (<i>triandra Hoppeana</i> , Hrt., Hoppe's W., eine Form der Mandelweide mit schmalen, unterseits sehr blaugrünen Blättern	—,30	2	"
89.	<i>incana</i> , Schrank., (= <i>Elaeagnus</i> , Scop. = <i>rosmarinifolia</i> , Gouan) Schmalblättrige W.	—,30	2 1/2	"
	Hochstämme M. 1,50 bis	3,50	13—30	—
58.	<i>japonica</i> , Thunb., Japanische W.	—,50	3	"
4.	<i>jaspidea</i> , Hrt., Jaspisfarbige Reif-W., junges Holz dunkelgrün mit starkem weissen Reife, im Winter schön	—,30	2	"
59.	<i>Lambertiana</i> , Sm., Lamberts-W., Form der Bachweide (S. <i>Helix</i> L.)	—,30	2	—
61.	<i>laurina</i> , Sm., (Hybr. <i>bicolor et caprea</i>)	—,40	3	"
62.	<i>Laweana</i> , Hrt., Law's W.	—,40	3	"
63.	<i>menthaefolia</i> , Host	—,30	2	"
64.	<i>Meyeriana</i> , Hrt., Meyer's W.	—,30	2	"
65.	<i>mirabilis</i> , Host.	—,40	3	"
20.	<i>mollissima</i> , Ehrh., Weichblättr. W.	—,30	2	"
66.	<i>nigricans</i> , Sm. (= <i>spadicea</i> , Choix), hübsch belaubt, mit stark ent- wickelten Nebenblättern	—,30	2	"
67.	<i>parvifolia</i> , Hrt., Kleinblättr. W.	—,30	2	"
24.	<i>pentandra</i> , L. Blätter gross, glänzend wie Lorbeer, schön!	—,40	3 1/2	—
93.	<i>Petzoldi</i> , Arb. Musc., Petzold's W.	—,40	3	"
68.	<i>Pontederana</i> , W. Koch, Breitblättr. Bachweide	—,30	2	"
69.	<i>praecox</i> , Hopp., (? <i>Aglaja</i> , daphn. Boll.)	—,40	3	"
70.	" <i>femina</i> , Hrt.,	—,30	2	—
15.	<i>prunifolia</i> , Hrt., Pflaumenblättrige W., Holz bräunlich, buschig	—,30	2	"
16.	<i>purpurea</i> , L., Purpur-W., Binde-W.	—,30	2	"
T. 14.	<i>purpurea pendula</i> , C. Koch (<i>nigra pend.</i> , Hrt.), Trauerpurpur-W., feinzweigig, schön	—,30	2	"
	Hochstämme M. 1,50 bis	3,50	13—30	"
71.	" <i>uralensis</i> , C. Koch (<i>uralensis</i> Hrt.), eine vorzügliche Bindew.	—,30	2	"
74.	<i>rigida</i> , Mühlb., mit stark entwickelten Nebenblättern, hängend, hübsch	—,30	2	"
	Hochstämme 1,50 bis	3, —	13	—
75.	<i>rosmarinifolia</i> , L., (<i>incana</i> , Schrank) Rosmarin-W., schmalblättrig, zierlich	—,40	3	—
17.	<i>rubra</i> , Huds., Rothe W.	—,30	2	"
77.	<i>Russeliana</i> , Sm., Russel's W.	—,30	2	"
78.	<i>Sacramento</i> , Hrt.	—,40	3	"
79.	<i>salviaefolia</i> , Koch, Salbeiblättr. W., ähnlich S. <i>caprea</i> , Blatt länger	—,40	3	"
80.	<i>sericea</i> , Hrt. (? = <i>glauca</i> , L.) niedrige graubelaubte schöne Zierweide	—,30	2	"
	Hochstämme	1,50	—	—
81.	<i>Seringeana</i> , Gaud., Seringe's W., Blendling von S. <i>caprea</i> u. (<i>Elaeagnus</i> <i>rosmarinifolia</i>)	—,30	2	"

Ziergehölze.

No.		perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
Salix.				
83.	stipularis, Sm	—,30	2	—
86.	viburnoides, Schleich, Schneeballblättr. W.	—,30	2	—
87.	viminialis, L., Korb-W. (9/10 M. 150)	—,30	2	18
88.	caprea, Wimm	—,30	2	—
18.	regalis, Hrt (9/10 M. 150)	—,30	2	18
19.	var. Reifenweide	—,30	2	—
8.	vitellina, L., (alba vitellina, C. Koch), Dotter-W.; gelbzweigig, sehr zierend, gute Bindeweide	—,30	2	—
26.	aurantiaca, Hrt	—,30	2	—
27.	Britzensis, Späth, s. Neuheiten. 2 3-jährige Pflanzen 1-jährige Stecklingspflanzen	—,50	2	—
25.	flava, Hrt.	—,30	2	—
9.	glauca, Hrt, gall.	—,40	2	—
97.	nova, Hrt., ausgezeichnete Bindeweide, treibt lange, gerade Ruthen ohne Seitenzweige, s. starkwüchsig 9/10 M. 175	—,30	2 1/2	20
10.	pupurea, Hrt.	—,30	2	—
99.	Wisconsin, Hrt.	—,50	5	—
T. 103.	Zabeli pendula, Zabel, s. Neuere Gehölze. Hochstämme	2,—	—	—
Von obigen Weiden zeichnen sich besonders folgende aus, als:				
Zierweiden: No 3, 4 6 7, 8 11, 13, 14 15 22, 23, 24 25, 26 27, 30 45, 46 47 50 60, 61, 62, 63 66, 75 78, 79, 80 86, 89, 94				
Bindeweiden: No 1, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 47, 49, 51, 56, 59, 71, 87, 97				
Sambucus, L., Hollunder (Wilder Flieder)				
1.	canadensis, L., Kanadischer H., IV., V., sehr starkwüchsig	—,30	2	—
2.	elegans, Hrt., Zierender H.: V	—,40	3	—
4.	nigra, L., Gemeiner H.	—,30	2	—
14.	fl. pl., Hrt., Gefülltblühend, hübsch	—,40	3	—
b. 5.	fol. argenteo-marginatis, Weissrandiger H., hübsch, V., VI.	—,40	3	—
b. 26.	fol. aurea varieg., Hrt., Sehr gute gelbbunte Var.	—,75	—	—
b. 11.	fol. luteis, Hrt., Gelblättriger H., m. leuchtend gelben Blättern	—,40	3	—
15.	fr. albo, Hrt., weissfrüchtig	—,50	4	—
12.	Fontenaysi, Hrt., stark nach Levkojen duftende Blüthe	—,60	5	—
17.	heterophylla, Hrt., (cannabifolia), Hanfblättr. H., hübsch	—,30	2 1/2	—
6.	laciniata, Geschlitzter H., sehr zierend, V.	—,40	3	—
b. 20.	fol. aureo-varieg., Späth, s. Neuheiten	1,—	7 1/2	—
7.	linearis, Hrt., Linienblättriger H., eine eigenthümlich schöne Sorte, einzeln zu pflanzen	—,40	3	—
13.	monstrosa, Hrt., niedrige, sehr bizarre Form	—,50	4	—
b. 25.	nana bicolor, Hrt., Niedrigbleibender H., sehr schön bunt	1,—	—	—
b. 8.	pyramidalis, Hrt., Weiss marmorirt, hübsch, VII.	—,40	3 1/2	—
P. 9.	pyramidalis, Hrt., Pyramiden-H., Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt und sehr dunkelgrün, auffallend, wenig bekannt M. 0,50 bis	1,25	4—10	—
10.	rotundifolia Sweet., rundblättriger H.	—,40	3	—
19.	semperflorens, Hrt., Gemeiner immerblühender H.	—,40	3	—
16.	Plantierensis, Sim-Louis., von kräftigster Vegetation, die in milden Wintern kaum unterbrochen wird	—,50	4	—
3.	racemosa, L., Trauben-H., blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehr zierend, V.	—,30	2 1/2	—
b. 24.	fol. varieg., Hrt., Trauben-H., mit bunten Blättern, neu!	1,50	—	—
21.	plumosa, s. Neuere Gehölze	—,50	4	—
23.	rosaceflora Hrt., s. Neuere Gehölze	1,50	—	—
22.	serratifolia, Hrt., s. Neuere Gehölze	—,75	6	—
Sophora, L., Sophore.				
1.	japonica, L., Japanische S.	—,50	4	—
b. 3.	albo varieg., Hrt., Bunte S.	1,25	—	—
T. 2.	pendula, Hrt., Trauer-S.	4,—	—	—
5.	sinensis, Hrt., s. Neuere Gehölze, Chinesische S.	2,—	—	—
4.	violacea, Hrt., s. Neuere Gehölze, schön belaubt	1,50	—	—

Ziergehölze.

No.	Sorbus, L., Eberesche.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
a) Echte Ebereschen (Eusorbus)				
1.	<i>americana</i> , Willd., IV., V., mit korallenrothen Beeren	0,75	—	—
	Hochstämme	2,50	—	—
36.	„ <i>nana</i> , Hort., Amerik. Zwerg-Eberesche	1,—	9	—
2.	<i>aucuparia</i> , L. Gemeine E., IV. 2 m. hoch	— 50	4	—
	Hochstämme, s. Alleebäume.			
6.	„ <i>Fifeana</i> , Hort., mit orangegelben Früchten . . . M. 0,75 bis	2,—	—	—
b. 35.	„ <i>fol. luteo varieg.</i> , Späth, s. Neuheiten, 1jährige Veredlungen	1,50	—	—
	2 bis 5jährige	2,—	—	—
30.	„ fr. luteo, Hort., Gemeine gelbfrüchtige E. . . . M. 0,75 bis	1,50	6—13	—
T. 3.	„ <i>pendula</i> , Trauer-E.	3,—	—	—
	Starke Sträucher, ca. 1½ bis 2 m. hoch. M. 1,50 bis	2,50	13—20	—
T. b. 4.	„ <i>fol. var.</i> Buntblättr. Trauer-E. . . . M. 1,50 bis	2,50	13—20	—
32.	„ <i>saturejaefolia</i> , Hort., gelbfrüchtig M. 0,75 bis	1,50	6—13	—
31.	<i>macrantha</i> , Hort., grossblumig M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
8.	<i>micrantha</i> , Dum., Kleinblumige E., mit kleinen korallenrothen Beeren	—,75	6	—



Sorbus hybrida.

b) Mehlbirnen (Aria).

10.	<i>Aria</i> (Crataeg.), L., Gemeine Mehlb., schön graugrün behaart, IV., V.			
	M. 0,60 bis	2,25	5—20	—
33.	„ <i>lutescens</i> , Arb. Musc., gelbliche Mehlb. . . . M. 0,75 bis	2,—	6—18	—
14.	„ <i>quercoides</i> , Hort., Eichenblättrige Mehlb. . . M. 0,75 bis	2,—	6—18	—
26.	„ <i>suecica</i> , Hort., Schwedische M.	1,—	—	—
15.	„ <i>tomentosa</i> , Hort., junge Blätter silberweiss . . M. 0,75 bis	2,—	6—18	—
38.	<i>flabellifolia</i> , S. Schum., fächerblättrige M. . . .	1,—	—	—
39.	<i>glabrata</i> , Hort. bot. Tratt., glattblättrige M. . . . M. 0,75 bis	1,50	6—13	—

Ziergehölze.

No.	Sorbus.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
13.	hybrida , (s. Abbildung) (S. intermedia, Pers. — Crat. fennica, Kalm.), Bastard-Elb., von sehr schöner Belaubung und pyramidalem Wuchse, IV. (s. Alleebäume) M. 0,60 bis	2,50	5—22	*
11.	latifolia (Crat.) Lam., (Pirus latifolia, Hrt.), Breitblättrige Mehlbirne	1,—	—	—
17.	atrovirens, Hth. Cat., mit grossen auffallend dunkelgrünen Blättern	—,75	6	—
34.	majestica Hrt., a. Neapel; sehr kräftig wachsend, grossblättrig. Oberseite d. Bl. leuchtend grün. Unterseite weiss filzig	1,50	—	—
37.	Neullyi , Hrt.	—,80	7	—
42.	nepalensis , Hrt., Nepalsche M.	1,25	—	—
12.	obtusata (Crat.) Spach, Stumpfblättrige Mehlob. M. 0,75 bis	1,50	6—13	—
19.	terminalis , Hrt. gall., Sehr schöne, eigenthümliche Belaubung, die ganz von Sorbus verschieden erscheint	1,—	9	—
c) Torminaria (Elzbeere).				
9.	terminalis , Urtz., gemeine Elzbeere, schön roth M. 0,75 bis	1,50	6—13	—
d) Aronien (Apfelbeeren, Schwarzbirnen).				
Sträucher, nicht hochwachsend, mit einfachen im Herbst sich roth färbenden Blättern				
20.	arbutifolia (Mespil.) L., (Aronia pirifolia, Pers., Amelanchier chinensis, Hrt.,	—,50	4	—
22.	heterophylla (Azarolus), Borkh. (Sorb. spuria, Pers., Aronia sorbifolia) Spach.)	—,75	6	—
23.	melanocarpa (Pirus) Willd. (Aronia arbutifolia, Pers.), Schwarzfrüchtige A.	—,50	—	—
Spiraea, L., Spierstrauch (Spiräe) . . . 20 Sorten à 1 St. 6 M.				
Die Farbe der Blüthen ist bei jeder einzeln angegeben. (w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros = rosa)				
a) Im Frühjahr blühend.				
wl. 36.	amurensis vera , Neuer vom Amur; aus der Gruppe der opulifolia	—,50	4	—
w. 26.	Cantonensis , Lour. (Sp. Reevesii, Lindl., Sp. Humani, Hrt.); VII, VIII	—,30	2 1/2	*
w. 35.	fl. pl. , Hrt., hübsch	—,40	3	*
wl. 27.	capitata , Presl. (t), Kopfblüthiger Sp.	—,40	3	*
w. 6.	chamaedryfoia , L., Gamanderblättriger Sp., Laub hellgrün, IV, VII	—,30	2 1/2	*
w. 7.	confusa , Rgl., Gemeiner Sp., VI.	—,25	1 1/2	*
w. 42.	hypericifolia , L. (= sibirica Hrt.), Johanniskrautblättriger Sp.	—,30	2 1/2	*
w. 15.	„ thalictroides , Pall., die Blumen bedecken die Zweige der ganzen Länge nach, VII., VIII., sehr schön	—,30	2	*
w. 29.	laevigata , L., Glattblättriger Sp., grossblättrig und graugrün	—,40	3 1/2	*
w. 19.	Nicoudierti , Bosse, VII., schön	—,30	2 1/2	*
wl. 20.	opulifolia , L., Schneeballblättriger Sp., V.	—,25	1 1/2	*
wl. 21.	„ lutea , Hrt., goldblättrig	—,30	2 1/2	*
wl. 53.	„ nana , Hrt.	—,40	3	*
wl. 44.	sorbifolia , L., Ebereschblättriger Sp.	—,40	3	*
w. 61.	prunifolia S. et Z., Blüthen in Dolden, weiss, einfach	—,40	3 1/2	*
w. 23.	„ fl. pl. , S. u. Z., Gefüllter pflaumenblättriger Sp., VI., sehr schön	—,40	3	*
w. 32.	Thunbergi , S. u. Z., feinblättrige hübsche Art, wird vielfach getrieben	—,30	2 1/2	*
r. 50.	triloba fl. rubro , Hrt., mit rother Blüthe	—,40	—	—
w. 24.	trilobata , van Houttei, L. (Sp. aquilegiaefolia, Hrt.), Dreilappiger Sp., sehr schöner Vorstrauch, VII., VIII.	—,40	3	*
w. 62.	ulmifolia , rüsterbl. Sp., Blüthen weiss, in langgestielten, länglichen Doldentrauben	—,30	2 1/2	*
b) Im Sommer blühend.				
wl. 1.	alba , Dur., Weisses Sp., VI., VII.	—,30	2 1/2	*
wl. 2.	ariaefolia Sm., Mehlbirnblättriger Sp., V., Blüthen in grossen Rispen, ausserordentlich schön	1,—	—	—
wl. 57.	aubifolia , Hrt., in grossen Rispen ausserordentlich reichblühend; schön	—,40	3 1/2	*
r. 33.	bella coccinea , Hrt., Rother schöner Sp.	—,30	2 1/2	*
ros 3.	Bethlehemensis rubra , H. VII.	—,25	1 1/2	*
r. 4.	Billardi , Hrt., Billard's Sp.; schön roth, VI.	—,25	1 1/2	*
r. 37.	„ longipaniculata , Hrt., mit schöner, langer Rispe	—,50	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Spiraea.				
w. 38.	<i>Blumei</i> , G. Don., Blume's Sp., die freudig hellgrünen Blattoberflächen bilden einen schönen Contrast zu den auf der Unterseite blaugrünen Blättern, über welche reiche Blüthendolden in blendend weissen Blumen sich effectvoll erheben . . .	—,30	2 1/2	*
r. 64.	<i>Bumalda</i> , Hrt. (= species nova e. Japan.) rothblühend . . .	—,60	5	*
r. 47.	<i>californica</i> , Hrt., Kalifornischer Sp., ähnlich tomentosa, VII . . .	—,40	3	*
r. 5.	<i>callosa</i> , Thunb. (Fortunei Planch.) Prächtiger Sp., VI, VII, junge Triebe roth, schön . . .	—,25	1 1/2	*
w. 25.	" <i>alba</i> , Hrt., den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr gut für niedrige Einfassungen . . .	—,25	1 1/2	*
r. 49.	<i>callosa atrosanguinea</i> , Hrt., dunkelroth sehr schön . . .	—,30	2 1/2	*
ros. 48.	" <i>macrophylla</i> , Hrt., viel grossblättriger als <i>callosa</i> . . .	—,35	2 1/2	*
ros. 39.	" <i>superba</i> , Hrt., sehr grossdoldig, hellrosa, anhaltend blühend . . .	—,35	2 1/2	*
w. 70.	<i>caulescens</i> , Don., Sp. <i>cuneifolia</i> , Willd. — <i>nepalensis</i> , <i>argentea</i> oder <i>nivea</i> , Hrt.), vom Himalaya . . .	—,30	2 1/2	*
r. 41.	<i>Douglasi</i> , Hook., Douglas' Sp.	—,35	2 1/2	*
r. 9.	" <i>Sanssouciana</i> , C. Koch Sp. <i>Nobleana</i> , Hook. VI, VII, reichblühend . . .	—,30	2	*
ros. 10.	" <i>pachystachys</i> , Hrt., mit grossen Dolden, VII, VIII . . .	—,30	2	—
r. 11.	<i>eximia</i> , Hrt., Ausgezeichneter Sp., VII . . .	—,30	2	*
r. 56.	<i>expansa</i> , Willd., ausgebreiteter Sp. (= <i>Spiraea kamaonensis</i> Hort.), Aus dem Himalayagebirge. Die mit rothen Blüthen besetzten 5-6 hohen Stengel geben der Pflanze ein eigenthümliches Aussehen.	—,25	1 1/2	*
w. 31.	" <i>nivea alba</i> , Hrt. (= <i>nivea alba</i> = <i>nivea</i> Hrt.)	—,40	3	*
r. 69.	" <i>rubra</i> , Hrt., Rother Sp.	—,40	—	—
ros. 12.	<i>flexuosa</i> , Hrt., mit hin- und hergewundenen Zweigen	—,30	2	—
wl. 13.	<i>Fontanaysi alba</i> , in grossen Rispen blühend, VI	—,30	2	*
ros. 59.	" <i>rosca</i> Hrt.	—,40	3	*
ros. 14.	<i>Fortunei semperflorens</i> , Hrt., sehr reichblühend, VII	—,30	2	*
ros. 52.	<i>Fori</i> , Hrt., ähnl. <i>callosa superba</i> , aber noch grossblumiger	—,40	3	*
w. 46.	<i>grossulariaefolia</i> , Hrt., Stachelbeerblättriger Sp., ein ganz niedriger Strauch, zur Vorpflanzung geeignet	—,35	3	*
wl. 16.	<i>lanceolata</i> Borkh., Lanzettblättriger Sp.	—,35	3	—
wl. 17.	<i>latifolia</i> Borkh. (Sp. <i>Bethlehemensis alba</i> , Hrt.) in lockeren, grossen Rispen blühend, VI, VII	—,30	2 1/2	*
wl. 43.	<i>Lemneana</i> , Hrt., Lennés Sp., ähnlich dem vorigen	—,30	2 1/2	*
wl. 18.	<i>Lindleyana</i> , Willd., Lindley's Sp., mit hellgrünen, gefiederten Blättern; schön	—,40	3	—
rs. 22.	<i>pruinosa</i> , A. M. Bereifter Sp., mit graugrüner, kräftiger Belaubung; VI, VII	—,30	2 1/2	*
ros. 54.	<i>Regeliana</i> , Hrt.? = <i>Fortunei semperflorens</i>	—,30	2 1/2	*
ros. 55.	<i>syringaeifolia</i> , Hrt., Abart von Sp. <i>callosa</i> , niedrig bleibend und sehr reichblühend	—,40	3 1/2	*
r. 45.	<i>tomentosa</i> , L., Filziger Sp., Blätter graugrün, Blüthen schön roth, VII	—,30	2 1/2	*
* 60.	<i>vaccinifolia</i> , Hrt. non Don., Blüthen in kurzer Doldentraube	—,50	4	*
Staphylea, L., Pimpernuss.				
4.	<i>Bumalda</i> , von sehr feinem Wohlgeruch	1,—	—	—
3.	<i>colchica</i> , Stec., <i>Kolchische P.</i> (<i>Hoibrenkia formosa</i>), (s. Abbildung.) s. auch Sträucher z. Treiben und Samenpflanzen M. 0,30 bis	1,25	2 1/2	20
1.	<i>pinnata</i> , L., Gefiederte P., VI, Zweige grün M. 0,40 bis	—,60	3—5	25
2.	<i>trifolia</i> , L., dreiblättrige P.	—,50	4	—
Stephanandra, S. et Z.				
1.	<i>flexuosa</i> , S. et Z., Mit zierlicher Belaubung	—,75	6	—
Symphoricarpus, Juss., Peterstrauch (Schneebeere).				
1.	<i>montanus</i> , H. B. and K., Gebirgs-Schneebeere, niedriger als Nr. 4	—,35	3	*
2.	<i>orbiculatus</i> , Moench. (S. <i>vulgaris</i> , Moench.), Gemeiner P., VI, VII, ein sehr guter Deckstrauch	—,25	2	*
b. 3.	" <i>fol. aureo-var.</i> , Hrt., goldbunt gerandet, sehr zierlich, VII,	—,35	3	*
4.	<i>racemosus</i> , Moench., Schneebeere (Wachsbeere), sehr zierend durch seine weissen Früchte; VI,	—,20	2	*

Ziergehölze



Staphylaea colehica.

No.		per Stück M	10 Stück M	hundert- weise verrätbig
	Syringa, L., Flieder 12 Sorten à 1 St. 8 M. Nach meiner Wahl starke 1jähr. Veredlungen in ca. 15 der besten vulgaris-Varietäten pro 100 St. M. 35 pro 1000 St. M. 300			
10.	Emodi, Willd., sehr schön belaubt	—,30	—	—
12.	" fol. varieg. Bunter E.-Fl.	1,25	10	—
1.	Josikaea , Jacq., Josika-F., höchst auffallende Form mit grossen, lederartigen, dunklen Blättern und dunkelblauen Blüten, spätblühend, V.	—,60	5	—
2.	oblata, Lindl., Rundblättriger Fl. aus China. Blüht am Frühesten.	—,50	4	—
14.	Pekinensis, Hort. (= Ligustr. Pekin., Rupr.). Hiervon erhielt ich Samen aus Russland	1,50	13	—
3.	persica, L., Persischer F., VII, VIII. helllila	—,40	3	—
4.	" alba, Hort., Weisses pers. F.	—,50	4	—
5.	" lacineata, Mill., Geschlitzter pers. F., VII, VIII.	—,40	3	—
6.	Rothomagensis , Roll., S. chinensis, Willd., Chinesischer F., VI. lila stärkste Sträucher	—,75	6	—
7.	" alba, Hort., Weisses chin. F., VI	—,60	5	—
9.	" Metensis, Hort., grossblumiger als Nr. 7	—,40	3 1/4	—
	"	—,60	5	—

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verfügbar
	Tamarix, L. Tamariske, Laub nadelartig, s. zierlich, zu Bouquets gut zu verwenden			
* 7.	africana, Hrt., Afrikanische T.	—,40	3	—
* 2.	gallica, Hrt., Laub graugrün	—,30	2 1/2	—
* 6.	japonica plumosa, Hrt., Japanische T., sehr zierlich gehaut	—,75	—	—
* 1.	tetrandra, Pall. (T. parviflora, D. C.), rosa blühend, schön V. (die härteste)	—,30	2 1/2	—
	Tecoma, Less. Tecoma (Bignonie).			
* 2.	grandiflora Hrt., (= chinensis Lam.)	1,50	—	—
* 1.	radicans (Bignonia) L., Wurzelnde T., sehr schön blühend, für warme Wände M. 0,50 bis	1,—	4—9	—
	Tilia, L. Linde (s. auch Alleebäume 12 Sorten à 1 St. M. 12.			
1.	alba, Ait. (T. americana pendula, Hrt.), Amerikanische Silber-L., Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II., III., M. 1 bis	5,—	9—15	—
T. 21.	„ petiolaris, Hrt. (= tomentosa pet., = alba pendula, Hrt.), Trauer-Silberlinde M. 1,00 bis	5,—	9—15	—
	Starke Hochstämme M. 3,00 bis	5,—	25—40	—
34.	„ spectabilis, Hrt., sehr starkwüchsig	1,25	—	—
2.	americana, L., Amerikanische Linde, acht! grossblättr., hellgrün, mit weisser Rinde, II., III., M. 1,— bis	8,—	9—10	—
3.	„ laxiflora, Loud., Lockerblüthige amerik. L., anseerordentlich grossblättrig, III., M. 1,— bis	3,—	9—15	—
36.	„ Moltkei (Späth), die schnellwüchsigste unter den amerikanischen Arten M. 1,25 bis	3,25	11—20	—
32.	„ Rosenthal, Rosenthal's amerik. grossblättrige M. 1,50 bis	2,—	13—18	—
4.	begoniaefolia, Hrt., begonienblättrige L., pyramidal M. 1,— bis	3,50	9—10	—
5.	corallina, Hrt., Rothzweigige L., ca. 1,50 m. hoch	2,—	—	—
6.	euchlora, C. Koch (T. dasystyla, Loud.), Krim-L., II., III., Wenn auch die Blätter dieser Linde nur mittelgross sind, so ist dieselbe dennoch die schönste ihres Geschlechts durch die dunkelgrüne Farbe ihrer sehr haltbaren Blätter und durch ihren kräftigen, schlanken Wuchs, M. 1,— bis	4,—	9—15	—
24.	filicifolia nova, Hrt., M. 1,— bis	2,50	—	—
7.	flavescens, A. Br.? Gelbliche L., M. 1,— bis	2,—	—	—
8.	floribunda, A. Br.? Reichblühend L., M. 1,25 bis	2,50	22	—
9.	gigantea, Hrt., Riesige L., ähnlich macrophylla, s. grossbl. M. 1,25 bis	7,—	11	—
30.	hybrida superba, Hrt., grossblättrig, dunkel behaubt M. 1,25 bis	7,—	11—15	—
11.	longifolia dentata, Hrt., Gezähnte langblättrige L., M. 1,25 bis	3,50	10—15	—
* 12.	macrophylla, Hrt. b. B. (T. pubescens, Ait.), III., Amerikanische grossblättr. L., sehr grossblättrig M. 1,25 bis	15,—	11	—
13.	mississippiensis, Hrt., sehr grossblättrig M. 1,— bis	3,50	9—20	—
14.	multiflora, Vent., Vielblumige L., M. 1,25 bis	3,50	—	—
16.	platyphyllos, Scop., Gemeine grossblättrige L. oder Sommer-L., 1 1/2—4 m hoch, M. 0,75 bis	3,—	6—25	—
	„ Hochstämme, s. Alleebäume.			
17.	„ aurea, Hrt., Goldzweigige L., M. 0,75 bis	3,50	6—30	—
25.	„ asplenifolia, Hrt., Farrnblättrige L., zierlich M. 1,25 bis	1,50	—	—
35.	„ pyramidalis obliqua, M. 1,25 bis	2,—	11—18	—
19.	tomentosa, Much. (T. alba, W. et K. T. argentea, D. C.), Ungarische Silber-L., weisser als alba IV., M. 1,— bis	4,—	9	—
20.	„ nova, Hrt., M. 1,— bis	1,50	—	—
22.	ulmifolia, Scop., Kleinblättrige L. (s. auch Alleebäume), 1 1/2—2 m. h. M. 0,50 bis	4,—	4—20	—
27.	vitifolia, Hrt., weinblättrige L., M. 1,— bis	1,50	—	—
29.	vulgaris, Hayne, (= intermedia, D. C.) Gemeine oder Zwischen-L., Aechte Holländische L. (oft wird als solche auch irrtümlich die Sommerlinde T. platyphyllos verbreitet) M. 0,75 bis	12,—	6—100	—
	Ulmus, L. Rüster (Ulme) 12 Sorten à 1 St. 10 M.			
28.	americana, L., Aechte amerikanische R., mit hellgrünem Laube in den meisten Baumschulen falsch! Starkwüchsig! M. 1,— bis	2,—	9—18	—
1.	antarctica, Hrt., Zierliche R., IV., M. 1,— bis	2,—	9—18	—
b. 2.	„ aurea, A. M., goldfarbig, sehr effectvoll M. 1,25 bis	2,50	11—20	—
	Hochstämme	2,50	—	—

Ziergehölze

No.	Ulmus.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrrätig
63.	<i>betulaefolia nigrescens</i> , Hrt., siehe Neuheiten. 1—2jähr. Veredl.	—,75	6	—
	Hochstämme	2,—	15	—
3.	<i>campestris</i> , L., Feld-R., II (s. auch Alleeabäume) 2 m h. M. 0,50 bis	1,50	4—13	—
129.	<i>Berardi</i> , Hrt., diese Art zählt wohl mit ihrem feinen, scharf gezähnten Laube zu den schönsten ihrer Gattung.	M. 1,— bis	2,—	9—18
7.	<i>cornuliensis</i> , Loid., Steife Feld-R.	1,25	—	—
4.	<i>encullata</i> , Hrt., Kappenform. F.-R., Blätter eigenthümlich kraus.	M. 1,— bis	2,—	9
b. 5.	<i>fol. arg. marg.</i> , Hrt., Weissrandige F.-R.; sehr schön im Halbschatten	1,25	—	—
b. 6.	<i>fol. arg. var.</i> , Hrt., Weissbunte F.-R., Blätter marmorirt, nicht constant	M. 1,— bis	2,—	9—18
61.	<i>fol. rubris</i> , Hrt., ähnlich purpurea aber kleinblättriger, neu!	1,2	10	—
79.	<i>Koopmanni</i> , (= U. Koopmanni), Lauche, s. Neuere Gehölze	2,—	—	—
44.	<i>modiolina</i> , Hrt., (Tortillard der Franzosen) M. 1,— bis	2,50	8—20	—
b. 53.	<i>myrthifolia purpurea</i> , s. Neuheiten. 2—4jähr. Veredl.	1,—	8	70
	Hochstämme	2,50	20	—
b. 40.	<i>pendula fol. var.</i> , Trauer-R., bent	3,—	—	—
b. 41.	<i>punctata</i> , Hrt., stark weiss marmorirt M. 1,— bis	2,50	8—22	—
25.	<i>purpurea</i> , Hrt., Purpur Feld-R. M. 1,— bis	2,—	8—18	—
P. 42.	<i>pyramidalis</i> , Hrt., Pyramiden F.-R. M. 1,— bis	3	9—25	—
69.	<i>sarniensis</i> , Loid. (= Wheatleyi, Hrt.), rundblättrige, etwas pyramidale Abart von <i>campestris</i> , dunkelgrün belaubt.	M. 1,— bis	2,50	9—20
50.	<i>umbraculifera</i> , Hrt., siehe Neuheiten. Niedrige 1—3jähr. Veredl. M. 0,75 bis	2,—	6—18	—
	Hochstämme	3,—	25	—
29.	<i>viminalis</i> , Loid., weidenbl. Rüster M. 1,— bis	2,—	9—18	—
b. 51.	<i>marginata</i> , Hrt., reich belaubt mit kleinen gelb- hunen, zierlichen Blättern Neu! M. 1,— bis	2,—	9—18	—
* 30.	<i>chinensis</i> , Pers. <i>parvifolia</i> , Jacq. = <i>camp. chinensis</i> , Loid., feine scharf gezähnte, freudig grüne Belaubung	1,25	10	—
64.	<i>corylifolia purpurea</i> , Hrt., siehe Neuheiten 1—2jähr. Veredl.	—,75	6	—
	Hochstämme	2,—	15	—
38.	<i>effusa</i> , Willd. (U. laevis, Pall.), Bast-R., II., (siehe auch Alleeabäume) ca. 2—3 m hoch M. 0,50 bis	1,50	4—13	—
31.	<i>fulva</i> , Mehr., langblättrig, gross und hell belaubt; ücht! M. 1,— bis	2,50	8—20	—
77.	<i>pendula</i> , s. Neuere Gehölze	Hochstämme	3,—	—
* 20.	<i>gigantea montana gigantea</i> , Riesige R., s. grossblättr. IV M. 1,— bis	2	9	—
21.	<i>glabra Scampstoniensis</i> , Loid., Glatte Scampston-R. M. 1,— bis	2,—	9	—
* 22.	<i>sibirica</i> , Hrt., Glatte sibirische R., hellgrün M. 1,— bis	1,50	—	—
75.	<i>Heyderi</i> , Späth, s. Neuheiten 1jähr. Veredl.	1,—	8	—
	2- u. mehrj. Veredl.	2,—	15	—
T. 23.	<i>horizontalis</i> , Hrt., Wagerrechte Trauer-R., schirmartig hängend, M. 1,— bis	2,50	15	—
	Hochstämme	2,—	18	—
73.	<i>latifolia</i> , Hrt., Breitblättrige R., sehr stark wachsend M. 1,25 bis	2,50	10—20	—
65.	<i>nigricans</i> , Hrt., s. Neuheiten 1—2 jährige Veredl.	—,75	6	—
	Hochstämme	2,—	15	—
T. 8.	<i>microphylla pendula</i> , Hrt., Kleinblättrige Trauer-R. M. 1,— bis	3,50	—	—
12.	<i>montana</i> , Benth. — <i>scabra</i> , Mill. = <i>corylifolia</i> Hrt. = <i>americana</i> , Hrt. <i>fulva</i> , Hrt., Grossblättr. oder schottische R. M. 0,50 bis	2,—	4—18	—
	Siehe auch Alleeabäume			
71.	<i>atropurpurea</i> , Späth, s. Neuheiten. 2—3 jährige Veredl.	1,50	—	—
	Hochstämme	2,50	20	—
14.	<i>crispa</i> , Loid., Schottische krause R., eigenthüml. V. M. 1,— bis	2,50	—	—
P. 15.	<i>fastigiata</i> , Loid. (U. <i>exoniensis</i> , Hrt.), Schott. Pyramiden-R. 1—2 1/2 m hoch, M. 1,— bis	3,50	9—25	—
	Hochstämme	2,—	18	—
13.	<i>Dampieri</i> , Hrt., Dampiers Pyramiden-Rüster, sehr schön pyramidal M. 1,— bis	2,50	9—20	—
	Hochstämme	2,—	18	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorathig
Ulmus.				
b. 55.	<i>montana fastigiata, Dampieri Wredei</i> , s. Neuh. 1–3 jährige Veredl. Hochstämme s. effectvoll u. empfehlenswerth	1,— 2,50	8 20	—
P. 43.	„ „ <i>glabra, Hrt.</i> , Glatte Pyramiden-R. M. 1.— bis	2,50	9–20	—
54.	„ „ <i>macrophylla</i> , Chaillon et Trefoux, von den grossblättrigen die starkwüchsigste. <i>Neu!</i> s. Alleebäume M. 1.— bis	2,50	—	—
45.	„ „ <i>monstrosa, Hrt.</i> , mit breiten Zweigen M. 1.— bis	3,—	9–25	—
47.	„ „ <i>nigra, Hrt.</i> , Blätter gross und sehr dunkelgrün M. 1.— bis	2,50	15	—
	„ „ „ starke Hochstämme	2,50	—	—
T. 19.	„ „ <i>pendula, Hrt.</i> , Aechte T.-R., Zweige senkrecht hängend M. 1 bis	4,—	9–30	—
	„ „ „ Stärkste Hochstämme M. 2.— bis	6,—	18–50	—
48.	„ „ <i>serpentina, Hrt.</i> , Zweige spiralförmig gewunden theils herab-			
	hängend M. 1.— bis	2,—	9–18	—
49.	„ „ <i>superba</i> Hochstämme	2,—	—	—
b. 57.	„ „ <i>tricolor, Hrt.</i> , Dreifarbige R.	1,—	9	—
9.	<i>monumentalis, Rz.</i> , Kugelförmige Feld-R., sehr schön! M. 1.— bis	2,—	9–18	—
24.	<i>Pitteursi, Hrt.</i> , Pitteur's R., mit grossen, runden Blättern, H. III, starkwüchsig M. 1.— bis	4,—	8–18	—
10.	<i>rugosa, Hrt.</i> , Korkige Hänge-R. M. 1.— bis	2,50	8–20	—
72.	<i>scabra (montana) lutescens, Hrt.</i> , Blätter schön gelb gefärbt. <i>neu!</i> sehr stark	2,50	9–20	—
11.	<i>suberosa alata, Hrt.</i> , Geflügelte Kork-R., Rinde sehr korkig, H. I, Mittel- und Hochstämme M. 2.— bis	5,—	—	—
70.	<i>tiliaefolia, Hrt. Borsd.</i> , Laub hell mit metallischem Reflex, starke Hochst.	3,—	—	—
26.	<i>triserrata, Hrt.</i> , hübsch grossblättrig M. 1.— bis	2,50	—	—
78.	<i>turkestanica, Rgl.</i>	2,—	—	—
27.	<i>vegeta, Lam.</i> , Starkwüchsig R. (Huntingdon-R.), grossblättrig, H. <i>ausserordentlich starkwüchsig! (s. auch Alleebäume.)</i> M. 1.— bis	4,—	8–35	—
74.	<i>Webbiana, Lev.</i> (= <i>V. camp. cucull.</i> , <i>Loul.</i>), mit eigenthümlich geformten Blättern.	1,50	—	—
Viburnum, L., Schneeball (Schlingel)				
10.	<i>bullatum, Hrt.</i> , Bläsiges S., niedrig	0,75	—	—
13.	<i>Lantana, L.</i> , Welliger Schneeball, V., Blätter gross, graugrün	0,40	3 1/4	—
	„ „ „ stärkste Sträucher ca. 1 1/2–2 m. hoch	0,75	6	—
12.	„ „ <i>fol. aureo marg.</i>	1,—	—	—
4.	<i>Opulus, L.</i> , Gemeiner S. (Wilder S.), Blumen u. rothe Früchte zierend, V.	—,25	2	—
5.	„ „ <i>roseum, L.</i> (V. Op. sterile, <i>Hrt.</i>), <i>Gefüllter S.</i>	—,40	3 1/2	30
	„ „ „ <i>1 1/2–2 m. hohe Stämme.</i> M. 1.— bis	1,50	9–13	75
16.	<i>piritolum, Presl</i> / Birnblättriger S.	1,—	—	—
13.	<i>plicatum, Miq.</i> , (= <i>tomentosum, Thab.</i>)	—,75	6	—
7.	<i>prunifolium, L.</i> , Pflaumenblättriger S.; schön belaubt, VI	—,60	5	—
Vinca, L., Sinngrün (Immergrün)				
4.	<i>intermedia fol. albo var.</i> , Blätter etwas grösser als die der folgenden Sorten, weiss marmorirt und gerandet	—,25	2	—
6.	<i>minor fol. alb. var.</i> , weissbunt	—,30	—	—
1.	„ „ <i>fl. azureo</i> , himmelblau	—,25	2	—
3.	„ „ <i>fl. purpureo pl.</i> , purpur, gefüllt	—,25	2	—
Virgilia s. Cladrastis.				
Vitex.				
1.	<i>Agnus castus, L.</i> , S., Europa Orient, Keuschbaum, Mönchspfeffer	—,75	6	—
2.	<i>incisa Lam.</i> mit eingeschnittenen Blättern	1,—	—	—
S.	Vitis, L., Wein. (Rebe), fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus und eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc. (Siehe ferner die amerikanischen Weine unter Obst.)			
48.	<i>cordifolia, Mehr.</i> , Herzblättr. H., grossblättrig	—,60	5	—
520.	<i>humulifolia, Hrt.</i> , ähnlich Regelia, in allen Dimensionen kleiner	—,60	—	—
280.	<i>Labrusca, L.</i> , Fuchswein der nördl. Vereinigten Staaten, unterseits stark filzig; hart und starkwüchsig	—,60	5	—
276.	<i>odoratissima, Thun.</i> , Wohlriechender W., trägt keine Trauben. Die sehr fein und stark riechenden Blüten werden zur Bereitung von Weinbowlen hochgeschätzt	—,75	6	—

Ziergehölze.

No.	Vitis.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
19.	<i>palmata</i> , <i>Fahl.</i> Handförmiger W.	—,75	—	—
519.	<i>Regeliana</i> , <i>Het.</i> Blätter mit bräunlichem Anflug, junges Holz behaart	—,60	5	—
523.	<i>riparia</i> , <i>Heck.</i> Uferwein ähnlich odoratissima	—,60	5	—
278.	<i>rupestris</i> , <i>Het.</i> ähnlich No. 275 mehr gezackt	—,60	—	—
Weigela , <i>Thaub.</i> (<i>Diercilla</i> <i>Hüll.</i>) Weigelia, 10 Sort. à 1 Stck. 5 M. sehr schön blühende Sträucher von 1—2 m Höhe, manche Sorten oft 2mal blühend				
6	<i>ambalis</i> , <i>Curr.</i> , (<i>coracensis</i> , <i>Thaub.</i>) Liebliche W., rosa, (Wuchs kräftig)	—,40	3 1/2	*
7	<i>alba</i> , <i>Het.</i> weiss im Verblühen blass-rosa	—,60	5	*
40	<i>arbores</i> Ed. André , <i>Het.</i> gr.-blauig, purp., innen sammetig braun, neu!	—,75	6	—
13	„ <i>grandiflora</i> , rosa in dunkel übergehend, junge Pflanzen	—,75	6	—
45	„ <i>sulphurea</i> , s. Neuere Gehölze	1,—	—	—
29	<i>Angusta</i> , <i>Het.</i>	—,50	4	o
8	<i>Desboisi</i> , <i>Het.</i> rosa kräftig, reichblühend	—,50	4	o
9	<i>Grönwegeni</i> , <i>Het.</i> dunkel rosa, gedrungener Wuchs	—,60	5	*
32	<i>hirsutis</i> gigantiflora , <i>Het.</i> sehr grossblumig	—,75	6	—
38	„ gratissima , <i>Het.</i> hell rosa, reichblühend	—,60	5	—
b. 21	„ <i>aurora</i> fol. aureo marg., <i>Het.</i> hell-rosa s. schön	—,75	6	*
36	„ Laval ei , <i>Het.</i> dunkelpurpur	—,75	6	—
11	<i>hyorida</i> , weiss mit dunkelrosa, im Verblühen dunkel	—,50	4	*
47	„ <i>Memoire de M^{re} van Houtte</i> , s. neuere Gehölze	3,—	—	—
42	„ <i>Pechaur</i> fils, violettes weinroth	—,75	6	—
14	<i>intermedia</i> , fast weiss, vollblühend	—,50	4	*
33	<i>Isoline</i> , s. <i>Het.</i> weiss in rosa übergehend	—,60	5	*
13	<i>Loxviansi</i> aure., <i>Het.</i> mit goldgelben Blättern. Junge Pflanzen	—,75	6	—
15	<i>Madame Conturier</i> , <i>Het.</i> gelblich weiss in rosa übergehend	—,50	4	o
31	„ Lemoine , <i>Het.</i> hellrosa, dunkler werdend	—,50	4	o
16	<i>Monsieur Dauvesse</i> , <i>Het.</i> fleischfarben rosa	—,50	4	o
17	<i>purpurata</i> , <i>Het.</i> purpurfarben. Junge Pflanzen	—,60	5	—
18	<i>rosea</i> , <i>Lindl.</i> Rosenfarbige W., rosa, gedrungener Wuchs	—,40	3 1/2	*
28	„ <i>multiflora</i> , <i>Het.</i>	—,60	5	—
b. 44	„ <i>nana</i> fol. varieg., s. neuere Gehölze	1,—	—	—
b. 39	<i>Sieboldi</i> fol. arg. marg. gelblich gerandet	—,75	6	—
19	<i>Stelzneri</i> , <i>Het.</i> dunkelroth, remontirt gewöhnlich	—,50	4	o
20	<i>Van Houttei</i> , <i>Het.</i> rosa kräftig	—,50	4	o
34	<i>venosa</i> <i>Het.</i> dunkelrosa mit weiss gestreift	—,50	4	o
24	<i>Verschaffelti</i> , <i>Het.</i> rosa kräftig	—,50	4	o
12	<i>versicolor</i> , <i>S. et Z.</i> (= <i>japonica</i> <i>Thaub.</i>) rosa in dunkel übergehend	—,50	4	o
Wistaria , <i>Nutt.</i> Wistaria (<i>Glycine</i>)				
1	<i>magnifica</i> <i>H. gall.</i> mit hellblauen Blüten M. 0,75 bis	1,25	6—10	—
2	<i>chinensis</i> , <i>Sims.</i> Chinesische W. eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen, blauen Blüthentrauben im Frühjahr, ertriert an ge- schützten Stellen nicht. M. 1 bis	2,—	9—18	—
6	„ pl. pl. , <i>Het.</i> Neu!	2,50	—	—
7	<i>frutescens</i> <i>L.</i> (<i>Glycine</i>) Strauchartige W.	1,—	9	—
Xanthoceras , <i>Bunge</i> , neuer Treibstrauch.				
1	<i>sorbifolia</i> zum Treiben sehr geeignet	1,50	—	—
Xanthoxylum fraxineum , Eschenblättriges Gelbholz. Ein mit Stacheln besetzter, decorativer Strauch aus Nord- Amerika, winterhart M. 0,75 bis				
		2,50	6—18	—
Xylosteum s. <i>Lonicera Xylosteum</i>				

Nadelhölzer.

B. Nadelhölzer (Coniferae).

Auf der grossen Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung 1883 erhielten meine Coniferen den erste Preis:

„Ehrenpreis der Stadt Berlin.“

Sämmtliche Coniferen sind mehrmals verpflanzt und werden mit Ballen versendet, was ein gutes Anwachsen sichert.

No	Abies, L., Tanne, Fichte, Abitaceae.		perStück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätig
	a) Tanne (Edel- oder Weisstanne) Picea, Don.				
2.	<i>balsamea</i> (Meb.) Balsamtanne 0,40—3 m. h.	M. 1.— bis	6.—	—	—
10.	<i>Fraseri</i> (Pinus) Pursh., Frasers Edeltanne, 0,40—0,90 m. h.	M. 1.—	3	9—25	—
10.	1,00—1,25 m. h.	4.—	6.	—	—
	2,50—4.— m. h.	8.—	30.—	—	—
5.	<i>Nordmanniana</i> (Pin.) Steud., Nordmann's Edel-T., eine ausgezeich- nete harte Art aus dem Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht, 0,30—0,50 m. h.	M. 1,25 bis	2,50	10—22	—
	0,50—0,70 m. h.	2,50	1,50	22—42	—
	0,75—1,50 m. h.	5.—	15.	45—140	—
	1,60—2.— m. h.	16.—	30.—	—	—
	2,25—3.— m. h. Prachtexemplare	35.	100	—	—
6.	<i>pectinata</i> Loud., Edeltanne, 0,20—0,40 m. h.	10	60	3 1/2—5	—
	0,50—1.— m. h.	1,25	3.—	—	—
7.	<i>Pinsapo</i> , Boiss., Spanische Edeltanne 0,20—0,30 m. h.	1,50	2,50	—	—
	b) Fichte, Abies, Don.				
23.	<i>alba</i> , Meib. (Pinus laxa, Ehrh.) Weiss-F., 0,40—0,50 m. h.	—,60	—,80	5.—	—
	0,60—1.— m. h.	80	1.	7—9	—
	1,25—2.— m. h.	1,25	2,50	10—22	—
	2,25—3.— m. h.	3.—	6.—	25—55	—
31.	<i>coerulea</i> , Forch., Bläuliche F., 0,30—0,50 m. h.	—,80	1,50	7—12	—
	0,60—1.— m. h.	1,75	2,50	16—22	—
	1,25—2.— m. h.	2,75	5.—	25—45	—
18.	<i>concolor</i> , Lindl., 0,20—0,25 m. h.	5.	6.—	—	—
	0,60—1.— m. h.	8.—	18.	—	—
41.	<i>Douglasi</i> , Lindl., Douglas-T., 0,25—0,50 m. h.	1.—	2,50	—	—
	0,60—1,25 m. h.	3.—	6.—	—	—
	3,00—4,00 m. h.	9.—	25.—	—	—
29.	<i>Engelmanni</i> , Par. hart u. sehr schön, 0,20—0,40 m. h.	1.—	3.	8—28	—
22.	<i>excelsa</i> (Pin.) Lam. (Pinus Abies L.) Gemeine F., Rothtanne, die schönste der einheimischen Arten, mehrmals verpflanzte u. guten Ballen, 0,45—0,55 m. h.	M. 40 bis	—,40	2 1/2	—
	0,60—0,75 m. h.	50	—,70	5.—	—
	0,80—0,90 m. h.	80	—,90	7.—	—
	1,00—1,75 m. h.	1,25	2	10—18	—
	2,00—3,50 m. h.	2,50	5.—	20—40	—
28.	<i>inverta</i> (pendula) Trauer-F. mit hängenden Zweigen, 0,10—0,25 m. h.		2.—	—	—
55.	<i>parvula</i> , Hrt., 0,30—0,75 m. h.	6.—	7,50	—	—
37.	<i>pyramidalis</i> , Hrt., pyramidal, 0,20—0,40 m. h.	1,50	2,50	—	—
	1,00—1,40 m. h.	4,50	7,50	—	—
56.	<i>Remonti</i> , Hrt., hübsche neue Zwergtanne, 0,25—0,60 m. h.	3.—	6.—	—	—

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Nadelhölzer.

No.	Abies.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verreithig
73.	<i>excelsa</i> viminalis, Gapp., Schlangeufichte aus dem Böhm. Waldgebirge. 0,20—0,45 m. h. M. 1,50 bis	4,—	—	—
31.	<i>lasiocarpa</i> , Lindl., sehr schöne californ. Art, 0,50—1 m. h. 7	25,—	—	—
26.	<i>Menziesi</i> , Loud. Menzies F. (nicht No. 70). 0,30—0,50 m. h. „ 0,60 „	—,75	5—7	—
	0,60—1,— m. h. „ 0,80 „	1,50	—	—
	1,25—2,— m. h. „ 2,— „	5,—	—	—
24.	<i>nigra</i> , Desf. (Mariana, Mill.), Schwarz-T., dunkelbelaubt, niedriger als „ <i>excelsa</i> “ setzt früh schon Fruchtzapfen an, 0,40—0,70 m. h. M. 0,60 bis	1, 5	5—12	*
	0,75—1,25 m. h. „ 1,50 „	2,—	13—18	—
	1,50—2,25 m. h. „ 2,50 „	5,—	—	—
	2,50—3,— m. h. „ 6,— „	10,—	—	—
58.	<i>obovata</i> , Ledeb. 0,40—0,90 m. h. „ 2,50 „	5,—	—	—
25.	<i>orientalis</i> (Pin. L. Orientalische Fichte, Zweige dünn, dicht gestellt sehr hübsch. 0,50—1 m. h. M. 1,50 bis	2,50	—	—
	1,25—1,75 m. h. „ 3,— „	7,50	—	—
	1,80—2,25 m. h. „ 9,— „	15,—	—	—
63.	<i>Parryana</i> , 0,20—0,40 m. h. „ 3,— „	7,50	—	—
21.	<i>rubra</i> , Par., Rothe F., 0,50—1,00 m. h. „ 90 „	2,50	—	—
	1,25—2,00 m. h. „ 3 „	7,50	27—70	—
c. Hemlockstanne, Tsuga, Endl.				
40.	<i>canadensis</i> , Mehr., Kanadische H. 1—2 m. h. M. 2,50 bis	5,—	—	—
Biota, Don, Morgenländischer Lebensbaum, Cupressaceae				
4.	<i>orientalis compacta</i> , Hrt. (Thuya orientalis nana Hrt.), grasgrün von gedrungenem Wuchse, 0,40—0,80 m. h. M. 2— bis	4,—	18—37	—
8.	<i>elegantissima</i> Hrt., schöne goldfarbige, pyramidal wachsende Varietät 0,20—0,50 m. h. M. 1,50 bis	4,—	12—37	—
1.	<i>Cephalotaxus</i> , drupacea S. et Z., ca. 0,50 m. h. „	3,—	—	—
Chamaecyparis, Spach, Lebensbaum, Cypresse, Cupressaceae.				
61.	<i>Chamaecyparis dubia</i> (Carr.) 0,15—0,20 m. h. „	1,—	9—	—
62.	„ <i>dubia glauca</i> , Hrt. (= Retinospora glaucescens Hechst.) 0,15—0,30 m. h. „	1,—	9—	—
60.	„ <i>ericoides</i> (Carr.) 0,15—0,20 m. h. „	1,50	13—	—
1.	<i>Lawsoniana</i> , Parl. (Cupressus Lawsoniana, Mur.) Lawson- Cypresse 0,30—0,50 m. h. M. 30 bis	1,—	1—9	—
	0,60—1,— m. h. „ 1,25 „	2,50	10—23	—
19.	„ <i>argentea</i> 0,40—0,70 m. h. „ 2,— „	6,—	—	—
22.	„ <i>elegantissima</i> , Hrt., 0,20—0,50 m. h. M. 1,25 bis	2,50	—	—
3.	„ <i>erecta</i> , Hrt., aufrechtstehende Varietät, eine der schönsten, 0,30—0,60 m. h. M. 1,50 bis	3,—	12—24	—
35.	„ <i>Fraseri</i> , Hrt., neue hübsche Varietät, 0,20—0,50 m. h. M. 1,50 bis	3,—	13—28	—
36.	„ <i>glauca</i> , Hrt., schön blaugrün, 0,25—0,80 m. h. „ 2,— „	1,50	16—42	—
23.	„ <i>lutescens</i> , Hrt., schön gelb gefärbt, 2—3 j. V., 0,20—0,40 m. h. „ 1,50 „	2,50	12—22	—
55.	„ <i>pyramidalis alba</i> , 0,20—0,40 m. h. „ 1,50 „	3,—	12—28	—
28.	„ <i>stricta coerulesa</i> , 0,40—0,50 m. h. „ 2,50 „	3,50	—	—
24.	„ <i>viridis</i> , 0,35—0,75 m. h. „ 3,— „	6,—	27—55	—
8.	<i>Nutkaensis</i> , Spach, Nutka Cypresse (Thuyopsis borealis). 0,30—0,60 m. h. „ 2,— „	4,—	18—35	—
	1,25—1,50 m. h. „ 7,— „	15,—	—	—
29.	„ <i>compacta</i> , sehr gedrängter Wuchs, 0,40—0,60 m. h. „ 3,— „	5,—	—	—
21.	„ <i>fol. varieg.</i> , Hrt., bunte, Nutka-Cypr., 0,20—0,50 m. h. „ 1,— „	2,50	9—23	—

Nadelhölzer.

No.			per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
Chamaecyparis.					
9.	Nutkaënsis glauca, Hrt., schön blaugrün.				
	0,30—0,60 m. h.	M. 2,— bis	2,50	9—20	*
	0,60—1,80 m. h.	3,— "	12,—	—	—
11.	pisifera, S. et Z., Erbsenfrüchtige Cypresse, schön und hart.				
	0,25—0,75 m. h.	M. 1,— "	2,50	8—22	*
	0,80—1,50 m. h.	3,— "	6,—	28—55	*
12.	" aurea, Hrt., ächt! Goldgelbe Varietät der C. pisifera.				
	0,20—0,40 m. h.	M. 2,— "	1,—	18—37	—
14.	" filifera, Hrt., fadenförmige, hängende Zweige.				
	0,20—0,50 m. h.	1,— "	2,50	9—22	—
	0,80—1,— m. h.	5,— "	10,—	—	—
13.	" plumosa, Fitch, (Retinospora pisifera plumosa), schöne Pfl.,				
	0,20—0,40 m. h.	M. 1,— bis	2,50	8—22	*
	0,75—0,90 m. h.	4,— "	8,—	—	—
18.	" aurea, gelbbunte, reizende Varietät.				
	0,30—0,50 m. h.	1,50 "	3,—	—	—
	0,60—0,80 m. h.	3,50 "	5,—	—	—
15.	squarrosa, Nadelblättrige Cypr., 0,20—0,40 m. h.	0,75 "	1,50	—	—
1.	Cryptomeria japonica elegans , 0,15—0,40 m. h.	1,— "	1,50	9—13	—
Ginkgo, L., Ginkgo (Salishuria) Taxaceae.					
1.	biloba, L., Zweiflappiger G.				
	0,40—0,60 m. h.	1,— "	2,—	8—18	—
	1,25—1,50 m. h.	3,— "	5,—	—	—
Juniperus, L., Wachholder, Sadebaum, Cupressaceae					
1.	Bernadiana, L., Bernada's-W., 0,60—1,— m. h.	1,75 "	2,50	—	—
11.	chinesensis, L., chinesischer Sadeb., 0,25—0,75 m. h.	1,— "	2,50	9—22	—
13.	" mascula, Hrt., 0,30—0,75 m. h.	1,— "	2,50	9—22	—
2.	communis, L., Gemeiner W., 0,40—0,80 m. h.	0,50 "	1,50	4—12	*
12.	" hibernica, 1,25—1,50 m. h.	5,— "	7,—	—	—
24.	japonica, Carr., dicht bezweigter, horizontal wachsender Strauch,				
	schöne Pflanzen, 0,20—0,50 m. h.	M. 1,50 bis	3,—	—	—
23.	prostrata, Pers., niederliegender, W., 0,20—0,30 m. hoch	1,— "	2,25	9—20	—
5.	Sabina, L., Gemeiner Sadeb., 0,25—1 m. breite schöne Pflanzen,	M. 0,75 bis	1,—	6—37	*
10.	" fol. var., Lindl., hübsche laute Varietät,				
	0,25—0,50 m. h.	1,50 "	3,—	—	—
3.	" tamariscifolia, Hrt., feiner und blaugrüner als Sabina,				
	0,30—1,— m. breit,	M. 1,— bis	3,—	9—28	—
6.	virginiana, L., Virginischer Sadebaum (Kotheder).				
	0,30—0,50 m. h.	0,40 "	—,60	3—5	—
	schöne Pyramiden, 1—3 m. h.	1,25 "	10,—	10—50	—
9.	" glauca, Hrt., hübsch blaugrün, 0,25—0,30 m. h.	1,— "	3,—	9—27	—
26.	" pendula viridis, Hrt., lebhaft grün, von hängendem Wuchse,				
	0,50—1,25 m. h.	M. 2,— bis	5,—	—	—
15.	" Schottii, Hrt., 0,30—0,75 m. hoch	1,— "	3,—	9—28	—
8.	" tripartita, Hrt., (Sab. var. repens Nutt.); hellgrüne Belaubung,				
	0,25—1,— m. h.	M. 1,— bis	3,50	—	—
Larix, L., Laeche; Abietaceae					
	Bäume mit abfallenden Nadeln und kleinen aufrechten Zapfen				
2.	europaea, C. D. (L. decidua, Mill.) Gemeine Laeche; schöne hohe				
	Pflanzen, 2½—5½ m. hoch	M. 1,— bis	7,50	13—70	—
9.	glauca pendula, 0,40—0,70 m. h.	4,— "	8,—	30—70	—
	0,30—1,10 m. h.	10,— "	18,—	—	—
5.	microcarpa, Wob., Kleinfrüchtige canad. L. 0,30—0,70 m. h.	—,60 "	1,—	5—9	*
	2—5 m. h.	2,— "	5,—	18—40	—
Libocedrus, Torr., Cupressaceae					
1.	decurrens, Forr. (Thuja gigant., Hort von Nutt. ; Heyderia decurrens Koch)				
	Kalifornischer L.				
	Die schönste aller Lebensbaum-Arten in kräftigen, gut				
	gezogenen Pflanzen. Hiervon sind ca. 1000 Stück vorrätig.				
	0,30—0,60 m. h.	M. —,50 bis	1,50	4—13	*
	0,75—1,50 m. h.	2,50 "	5,—	18—45	*

Nadelhölzer.

No.	Pinus, L., Kiefer (Föhre) Abietaceae	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
1.	austrica, Hoss. , Oesterreichische K. (Schwarzföhre). 0,75—1,— m. h. M. 1,— bis 1,25—2,— m. h. „ 2,50 „	2,— 4,—	9—18 20—35	—
15.	calabrica, Hrt. (P. corsicana Hrt.) 0,25—1,50 m. hoch . . . „ 1,— „	5,—	9—48	—
2.	Cembra, L. , Zürbel K. (Arye) sehr kraus und schön 0,30—0,45 m. h. „ 0,75 „ 0,50—1,— m. h. „ 1,50 „	1,25 5,—	7—11 13—45	—
25.	Jeffreyi, Marr. , Kalifornien, schön blaugrün gefärbt, 0,20—0,30 m. h. „ 2,— „ 0,40—0,60 m. h. „ 4,— „	3,— 8,—	18—28	—
10.	Laricio (-Pin. Pinaster <i>Plan.</i>), <i>Poit.</i> , Corsische Schwarzkiefer 0,40—0,75 m. h. M. 2,— bis 1,00—2,00 m. h. „ 4,— „	3,— 9,—	—	—
26.	Massoniana, S. et Z. , China und Japan 0,30—0,60 m. h. . . „ 2,50 „	6,—	20—50	—
4.	montana, Mill. (Pinus Mughus <i>Scop.</i>), Kiehlholz-Kiefer 0,30—0,50 m. h. „ 0,75 „ 0,60—1,— m. h. „ 2,25 „	1,75 4,—	6—15 20—37	*
16.	Pallasiana, Lamb. (P. pontica <i>C. Koch.</i>), 0,50—0,75 m. h. . . „ 2,— „ 1,00—1,50 m. h. „ 3,50 „	2,50 7,50	—	—
6.	Strobus, L. , Weymouth-K., hoher Baum mit langen dünnen, blaugrünen Nadeln, 0,50—0,75 m. h. M. 0,80 bis 1,00—2,— m. h. „ 1,25 „ 3,00—4,— m. h. „ 3,— „	1,— 2,— 5,—	7—9 10—18 27—47	—
3.	excelsa, Wall. , Weymouthskiefer von Nepal (Pinus Strobus excelsa <i>Hrt.</i>), sehr hübsch, blaugrün und feinnadlig. 0,15—0,30 m. h. M. 0,50 bis	1,50	1—13	—
Retinospora, siehe Chamaecyparis und Thuja				
Taxus, L., Eibe: Taxaceae				
1.	adpressa, Gord. , Japan 0,20—0,40 m. h. „ 1,50 „ 0,50—0,70 m. h. „ 3,50 „	2,50 5,—	—	—
2.	baccata, L. , Gemeine Eibe 0,40—0,60 m. h. „ 0,75 „ 0,65—0,90 m. h. „ 1,25 „	1,— 2,—	6—9 10—18	*
b. 3.	„ Schöne Pyramiden , 1,00—1,50 m. h., 0,75—1,50 m. br. . . „ 6,— „	15,—	50—125	*
4.	„ elegantissima, Hrt. , Gelbbunte E., 0,20—0,50 m. h. . . „ 1,25 „	3,50	10—32	*
1.	„ erecta, Hrt. , Aufrechte E., 0,20—0,50 m. h. „ 0,75 „ 0,60—1,00 m. h. „ 3,50 „	3,— 5,—	6—28	*
b. 22.	„ albo varieg., Späth , siehe Neuheiten. Junge Pflanzen Stärkere Pflanzen	1,— 2,—	— 17	—
13.	„ gracilis pendula , mit zierlich hängenden Zweigen, 0,30—0,80 m. h. M. 3,— bis	7,50	—	—
5.	„ hibernica, Hook. (Tax. baccata fastigiata), Irländische Eibe, 0,20—0,60 m. h. M. 2,— bis 0,75—1,50 m. h. „ 5,— „	4,— 25,—	—	—
7.	„ fol. var. Hrt. , 0,20—0,30 m. h. „ 1,50 „	2,50	—	—
23.	„ pyramidalis , 0,30—0,50 m. h. „ 0,80 „ 0,60—0,80 m. h. „ 2,25 „	1,75 3,50	7—16	—
10.	„ Washingtoni, Hrt. , Washingtons E., 0,20—0,40 m. h. . . „ 1,50 „	2,50	12—22	—
8.	canadensis, Willd. , Canadische E., 0,40—0,60 m. h. . . . „ 1,— „	1,50	9—13	—
6.	„ aurea, Hrt. , gelbbunt, 0,30—0,50 m. h. „ 1,— „	3,—	9—27	—
b. 9.	Dovastonii, Lamb. , dunkelgrün, 0,20—0,40 m. h. „ 1,25 „ 0,50—0,90 m. h. „ 2,— „	1,75 4,50	10—15 18—40	*
Thuja, L., Lebensbaum (Abendländischer L.) Cupressaceae				
21.	gigantea, Hrt. , Riesiger L. mit lebhaftgrüner Belaubung, siehe Libocedrus .			
6.	Menziesi, Douglas , (-Lobbi <i>Hrt.</i>) 0,40—0,60 m. h. M. 1,— bis	1,75	9—15	—
11.	plicata, Don. , Breitzweigiger L. aus Nordamerika, 0,20—0,60 m. h. „ 1,— „	3,—	9—27	*
7.	occidentalis, L. , Abendländischer L., 0,30—0,60 m. h. . . „ 0,50 „ 1,50—3 m. h., schöne volle Pyramiden . . . „ 2,50 „	1,— 10,—	4—9 20—90	—
17.	„ argentea, Hrt. , 0,30—0,60 m. h. „ 1,25 „	2,—	10—18	—
18.	„ Boothii, Hrt. , 0,20—0,50 m. h. „ 1,25 „ 0,60—1,00 m. h. „ 2,50 „	2,— 5,—	10—18	—

Nadelhölzer. Gehölze für Parkanlagen.

No.	Thuja.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
14.	<i>occidentalis</i> caucasica, <i>Hrt.</i> , kaukasischer L. (<i>sibirica</i> <i>Hrt.</i>),	M. 0,75 bis	2,50	5—22	—
	0,30—0,80 m. h.				
15.	" <i>cristata</i> <i>Hrt.</i> , kammförmig, sehr hübsch,	0,75 "	1,50	6—13	—
	0,20—0,50 m. h.	2,75 "	3,—	—	—
	0,60—1,00 m. h.				
2.	" <i>Ellwangeriana</i> , <i>Hort.</i> Th. Tom-Pouce (<i>Hrt.</i>), schöne breite				
	Pflanzen 0,20—0,50 m. h.	M. 0,75 bis	1,50	6—12	—
	0,60—0,90 m. h.	1,— "	4,—	18—37	—
10.	" <i>globosa</i> <i>Hrt.</i> , von gedrängtem, kugelförmigen Wuchse,				
	0,30—0,50 m. h.	M. 1,— bis	3,—	9—27	—
4.	" <i>Hoveyi</i> , <i>Hrt.</i> , Zweige breit und gedrängt,				
	0,30—0,60 m. h.	1,— "	2,—	9—18	—
	0,70—1,00 m. h.	2,50 "	5,—	22—47	—
8.	" <i>pendula</i> <i>Hrt.</i> , 0,20—0,70 m. h.	1,— "	2,50	9—23	—
28.	" <i>recurvata</i> <i>Hrt.</i> , 0,25—0,40 m. h.	1,— "	1,50	9—12	—
16.	" <i>Standishi</i> , <i>Carr.</i> , (<i>Thuyopsis</i> <i>Standishi</i> <i>Hort.</i>),				
	0,20—0,40 m. h.	1,— "	4,—	9—35	—
9.	" <i>Vervaeana</i> , Belaubung gelbl. grün,				
	0,20—0,40 m. h.	1,— "	1,25	9—10	—
	0,50—1,00 m. h.	1,50 "	3,—	—	—
10.	" <i>Wareana</i> , <i>Hort.</i> , der härteste aller Lebensbäume, von ge-				
	drungenem Wuchse,				
	0,25—0,75 m. h.	M. 0,75 bis	2,50	6—20	—
	1,25—2 m. n., ganz starke Pyramiden	6,— "	12,—	50—100	—
	Thuyopsis.				
1.	<i>colobrata</i> , <i>S. et Z.</i> , Japanischer L., 0,20—0,30 m. h.	1,— "	2,—	9—18	—
	0,60—0,80 m. h.	3,— "	7,—	—	—
2.	" <i>fol. var.</i> , 0,20—0,50 m. h.	2,— "	5,—	—	—

Gehölze für Parkanlagen.

Nach meiner Wahl.

	Stück
100 Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten, 0,50—1,50 m. h.	6—12
100 Gewöhnliche Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 0,60—1,50 m. h.	15—20
100 Feinere Vorsträucher in 15—20 Sorten, mit Namen	25—40
100 Gewöhnliche Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h.	10
100 Besonders starke oder feine Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h.	10—50
100 Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15—20 Sorten mit Namen je nach der Güte	25—50
100 " und schönblättrige Ziersträucher in 100 Sorten	45
100 " Ziersträucher in 50 Sorten	40
50 " " 25 " "	20
100 Schmuckbäume (Solitäräume) in 50 Sorten, kräftige Hoch-, Halbstämme und Pyramiden	M. 100 bis 150
50 " in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren	M. 50 bis 75
100 Gewöhnliche und harte Coniferen (Nadelhölzer) zu Gruppen in ca. 8—12 Sorten, 0,50—2 m. h., mehrmals verpflanzte Exemplare	M. 75 bis 200

Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks sind zu Hunderttausenden vorrätig. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preisermässigungen ein.

Alleebäume.

Alleebäume.

Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.

Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.

8 cm. Umfang ungefähr = 1 Zoll Durchmesser, 12 cm. Umfang ungefähr = 1 1/2", 16 cm. Umfang ungefähr = 2" Durchmesser u. s. w.

		Stamm- umfang cm.	per 1 Stück M.	per (10) Stück M.
Ahorn, Amerikan. Silber	Acer dasycarpum	7-9	1.10	90
"	"	10-12	1.75	150
"	"	13-15	2.50	225
"	"	16-20	3-5	—
"	Kalifornischer (Eschenblättr.) Acer californicum	7-9	1,—	80
"	"	10-12	1.50	120
"	"	13-15	2.25	200
"	"	16-20	3-4	275
Sehr schöner, hellgrün belaubter und ausserordentlich starkwüchsiger Baum, der selbst noch auf geringem Sandboden recht gut gedeiht. Er verdient nicht nur als Alleebaum, sondern auch als Waldbaum die häufigste Anpflanzung.				
Ahorn, Eschenblättriger, Violetter. Acer violaceum		7-9	1,—	80
"	"	10-12	1.50	120
"	"	13-15	2.25	200
Diese Varietät, von der alles über den Kalifornischen Ahorn Gesagte gilt, zeichnet sich vor letzterem durch noch üppigeres Wachsthum aus.				
Ahorn, Eschenblättr. Weissbunter. Acer Negundo fol. argenteo-var., m. starken Kronen.		—	1 1/2-2 1/2	110-200
Per 1000 Stück M. 1000 1500.				
"	Spitzblättriger. Acer platanoides	7-9	1.10	90
"	"	10-12	1.75	150
"	"	13-16	2-2 1/4	225
"	Schwedter's Blut- Schwedleri	7-9	1.50	130
"	"	10-12	2,—	180
"	"	13-15	2 1/4-3 1/2	—
Per 1000 Stück M. 1200 1700.				
"	Weisser Acer Pseudoplatanus	7-9	1.10	90
"	"	10-12	1.75	150
"	"	13-18	2-3 1/2	250
"	Purpurblättriger fol. purpureis	7-9	1.50	130
"	"	10-12	2,—	180
"	"	13-15	2.75	—
"	"	16-18	3.50	—
"	diverse veredelte Sorten. (s. Ziergeholz-Sortiment)	10-15	2-3 1/2	—
Akazie, Gemeine Robinia Pseudacacia		10-13	1.75	—
"	"	14-20	2.25	—
"	Kugel- inermis	—	1 1/2-3	—
Birke, Gemeine Weiss- Betula alba		8-10	—80	70
"	"	11-13	1,—	90
"	"	14-16	1 1/4-1 3/4	125
"	Purpurblättrige purpurea	—	1 1/2-2 1/2	110-230
Eberesche, Gemeine Sorbus aucuparia		7-9	1,—	80
"	"	10-12	1.50	125
"	"	13-15	2,—	175
"	"	16-18	2-3	250
"	Bastard hybrida	7-9	1.50	125
"	"	10-12	2,—	—
Eiche, Sommer- oder Stiel- Quercus Robur pedunculata		7-9	1,—	90
"	"	10-12	1.50	130
"	"	13-15	2.25	200
"	"	16-18	2.75	—
"	"	19-24	3-4	—
"	Sumpf- palustris	7-9	1.25	100
"	"	10-12	1.75	150
"	"	13-15	2-3	250

Alleebäume.

		Stamm- umfang cm	per 1 Stück M.	per 100 Stück M.
Erle, Roth-	Alnus glutinosa	8-10	—,75	—
" "	" "	11-13	1,10	—
" "	" "	14-20	1½-2	—
" "	" "	21-34	2¼-4	—
" Weiss-	incana	7-10	—,80	—
" "	" "	12-14	1,25	—
" "	" "	20-30	2,25	—
" "	" "	30-40	3,—	—
Esche, Gemeine	Fraxinus excelsior	7-9	—,80	70
	Per 1000 Stück M. 600.			
" Amerikanische weisse grbltr.	alba (pubescens)	10-12	1,20	100
" "	" "	13-15	1,80	130
" "	" "	16-19	2¼-3	220
" "	" "	20-27	4-6	—
" Kugel-	polemonifolia	7-11	2,—	180
" Sehr schön für nördliches Klima, als Ersatz für Kugelakazie	" "	7-9	1,25	—
" Mandschurische	mandschurica	10-12	1,50	—
" "	" "	8-10	2,—	—
" Pyramiden	excelsior spectabilis	8-10	2,—	150
" diverse veredelte Sorten (s. Ziergehölz-Sortiment).	" "	8-10	2,—	—
Dorn, Dunkelroth, gefüllt	Crataegus oxyacantha fl. kermesina pl.	7-9	1,25	110
" "	(Paul's new Scarlet)	10-12	1½-2	130
" "	stark	13-15	2½-3	—
" Als Alleebaum allein oder abwechselnd mit grösseren Bäumen ange- pflanzt, ist er in der Blüthezeit von überraschender Schönheit.	" "	7-9	1,25	110
" Rosa gefüllter	Crat. Oxyac fl. rubro pl.	9-13	1½-2	150
" Weiss gefüllter	" fl. albo pl.	7-9	1,50	130
" "	" "	10-12	2,—	150
Flügelnuss, Kaukasische	Pterocarya caucasica	7-9	1,50	125
" "	praechty, Alleebaum, sehr schnellwüchsig	10-12	2,—	150
" "	" "	13-15	2,50	210
" "	" "	16-20	3-5	250
Gleditschie	Gleditschia triacanthos	7-9	1,25	100
" "	" "	10-12	1,75	150
" "	" "	13-15	2,25	—
" diverse veredelte Sorten (s. Ziergehölz-Sortiment)	" "	7-9	1,75	—
Kastanie, Gemeine	Aesculus hippocastanum	8-10	1,10	90
" "	" "	11-13	1,75	150
" "	" "	14-16	2,50	220
" "	" "	17-23	3-6	—
" Gelbe und Gefüllte	lutea und Hippoc. fl. pl.	7-15	2-5	—
" Rothblühende	rubicunda (carnea)	7-9	1,75	150
" "	" "	10-12	2,50	220
" "	" "	13-20	3¼-6	—
Kirsche, Trauben-	Prunus Padus	—	1,50	—
" Späte pergamentbl.	serotina cartilaginea	7-9	1,50	125
" "	" "	10-12	2,—	—
" "	" "	13-17	2,50-3	—
" Gefülltblühende	Cerasus und Avium fl. pl. und Rexi fl. pl.	—	1,75	150
Linde, Grossblättr. holländische	Tilia platyphyllos n. intermedia	7-9	1,75	150
" "	" "	10-12	2,50	220
" "	" "	13-15	4,—	350
" "	" stark	16-18	6,—	540
" "	" sehr stark	19-30	7½-15	7-1200
" Kleinblättrige	ulmifolia	7-9	1,75	150
" "	" "	10-12	2,50	220
" "	" "	15-29	3-12	—
" "	" "	30-40	13-19	—
" Krim-	euchlora (dasystyla) s. schöne Art, glänzend dunkelgrüne Belaubung.	7-9	2,—	180
" "	" "	10-12	3,—	280

Alleebäume Trauerbäume

		Stamm- umfang cm.	per 1 Stück M.	per 100 Stück M.
Linde, Krim-	Tilia euchlora (= <i>dasystyla</i>) s. schöne Art glänzend dunkelgrüne Belaubung	13—15 16—18	5,— 6—8	470 —
"	<i>macrophylla, laxiflora, hybrida superba, gigantea, longifolia dentata, americana</i> recht, <i>begoniifolia, alba tomentosa flavescens</i>	9—15 7—10 11—13	2—4 1.20 1.50	250 90 125
Pappel, echte Silber-	Populus alba nivea	7—9 10—12 13—20	— 1,— 1.50—2	— 90 130
"	Lorbeerblättrige	7—9 10—12	— 1,—	— 90
"	canadische	7—9 10—12 13—21	— 1,— 1.50—2	— 90 130
"	Gold-	7—9 10—15	— 2,—	— 125
"	Ontario-	10—12 13—15	1.50 2,—	135 —
"	Pyramiden	7—9 10—12	1,— 1.50	90 —
Pflaume, Gefüllte rote	Prunus triloba	—	2,—	175
"	Reichblättrige Kirsche	<i>verasifera fol. purpur. (Pissardi)</i>	7—9 10—12 13—14	3,— 4,— 5—8
"		Platanus orientalis	7—9 10—12 13—14	3,— 4,— 5—8
Rüster, Feld-	Ulmus campestris	7—9 10—12 20—35	1.25 1.75 3—9	— — —
"	Kugel-	<i>ambrosculifera</i>	—	3,—
"	Dreispitzige	<i>triserrata</i> veredelt	7—11 12—15	2.25 3—
"	Flatter	<i>effusa</i>	7—9 10—12 13—16	1,— 1.75 2—2½
"	pr. 1000 St. 7000 Mk. Die beste Rüster für armen Boden, zugleich die schönste in Bezug auf Kronenbildung.	7—9 10—12 13—15 16—20	1,— 1.75 2.50 3—6	80 150 225 —
"	Grossblättrig	Ulmus montana (scabra)	7—9 10—12 13—15 16—20	1,— 1.75 2.50 3—6
"	"	<i>macrophylla</i>	7—9 10—12	1.75 2—3
"	Pitteurs	<i>Pitteursi</i> (veredelt)	7—9 10—12 13—15	1.75 2.50 3,—
"	Huntingdon	<i>vegeta</i> (vered.) s. stark w. u. schön	7—9 10—12 13—15	1.75 2.50 3,—
"	diverse andere veredelte Sorten s. Ziergeholz-Sortiment	10—15	2—5	—
Wallnuss, Schwarze amerikan.	Juglans nigra	7—9 10—12 13—19 20—30	1.25 2,— 2½—4½ 5—8	100 150 — —

Trauerbäume.

		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verfügb.
Acer dasycarpum pendulum , s. Neuheiten. Extra starke Hochstämmle.	M. 3½ bis	8,—	25	—
" <i>Wieri laciniatum</i> , als Solitär, durch starken Wuchs und zierliche Belaubung einer der elegantesten Trauerbäume.	M. 2.50 bis	5,—	22—40	—
Betula alba laciniata , Geschlitzblättr. <i>Birke</i> , Höchst. M. 1.75 bis		2.50	16—23	—

Trauerbäume. Schlingsträucher.

		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätlich
Caragana	arborescens pendula. Gewöhnliche Trauer- <i>Karagane</i> , bis über 2 m. hohe sehr schöne Hochst.	M. 1,75 bis	2,50 18—22	150
"	schwächere	M. 1,25 bis	1,50 11—13	100
"	Chamlagu, Chinesische Tr.-K.	Hochstämme	1,50 13	
"	pygmaea arenaria (gracilis), Feinzweigige Tr.-K. Höchst	M. 1,25 bis	2, 10—18	150
Carpinus	Betulus pendula. Trauer- <i>Hainbuche</i> , niedr. vered.	M. 1 — bis	2, 9—18	—
Crataegus	horizontalis, mit schirmförmiger Krone	1,75	—	—
"	Oxyantha pendula. Trauerdorn	Hochstämme	1,50 13	—
"	fl. roseo, Rosa blühender Trauerdorn	Hochstämme	1,50 13	—
Fagus	sylvatica pendula. Trauer- <i>Rothbuche</i>	schöne Hochstämme	3—5	—
Fraxinus	excelsior pendula. Trauer- <i>Esche</i>	M. 1,50 bis	2, — 13—18	120
"	" ganz stark	M. 2,50 bis	4, — 22—35	200
"	" aurea hängende Gold-Esche	1,75	—	—
"	lentiscifolia pendula. Feinblättrige schöne Trauer-E.	M. 2,50 bis	4, — 22	—
Pirus	floribunda, Rothblühender Pracht- <i>Apfel</i>	1,50	13	—
"	<i>Malus pendula</i> „ <i>Elise Rathke</i> “	6, —	—	—
"	prunifolia pendula,	M. 1,50 bis	2, — 13—18	—
"	salicifolia pendula,	1,50	13	—
Planera	repens, <i>Ht.</i> , Kriechende <i>Planere</i>	starke Hochstämme	2,50 20	—
Populus	canescens pendula. Trauer-Grau-Pappel	2, —	—	—
"	grandidentata pendula, grossgezähnte Tr.-Pappel	2, —	—	—
"	tremula pendula, Trauer-Espe	2, —	—	—
Prunus	Avium pendula. Trauer-Herz- <i>Kirsche</i>	starke Hochstämme	1,75 15	—
"	Cerasus semperflorens, Allerheiligenkirsche, starke Hochst.	M. 1,75 bis	2,25 15	—
"	fruticosa pendula. Hängende Zwergweissel, starke Hochst.	M. 1,75 bis	2,25 15	—
"	virginiana pendula, Hängende virginische <i>Traubenkirsche</i>	2, —	15	—
Quercus	pedunculata pendula Danvessel / Trauer- <i>Eiche</i> , schöne Hochst.			
"	" nova	M. 2,50 bis	4, — 20—35	—
Rosa	" Trauer- <i>Rose</i> , diverse Sorten	Hochst. M. 2,50 bis	4, —	—
Salix	caprea pendula			
"	incana (rosmarinifolia) / Trauer- <i>Weide</i> , stärkste Hochstämme			
"	purpurea pendula (nigra pendula)	M. 1,50 bis	3,50 13—30	—
"	rigida			
Sophora	japonica pendula,	4, —	—	—
Sorbus	aucuparia pendula, Trauer- <i>Eberesche</i>	M. 1,50 bis	3, — 13—22	—
"	fol. var.	1,50	2,50	—
Tilia	alba petiolaris, Trauer-Silber- <i>Linde</i> ; schöne Stämme	M. 3, — bis	8, — 25—60	—
Ulmus	fulva pendula. Sehr elegante Trauer- <i>Räster</i>	3, —	—	—
"	horizontalis, Wagerrechte Trauer- <i>Räster</i> , mit flacher schirmförmiger Krone	M. 2,50 bis	5, — 20	—
"	montana pendula, Trauer- <i>Räster</i> , sehr schöne Stämme	" 1,50	6, — 13—50	—
"	microphylla pendula	" 2, —	3,50	—

Schlingsträucher.

Actinidia	polygama	1, —	9	—
Akebia	quinata	M. 0,60 bis	1,50 5—13	—
Ampelopsis	quinquefolia, <i>Wilder Wein</i> , extra stark, 2 bis 3 Meter lang,			
"	5—7 Ranken	—,75	6	—
"	stark über 1 1/2 m. lang	—,50	4	—
"	schwächere ca. 1 m. lang	—,30	2 1/2	—
"	dissecta, zierlich geschnitten	—,75	6	—
"	hirsuta, Grossblättriger Wilder Wein	M. 0,40 bis	—,75 3—6	—
"	hederacea, Aechter Klimmer	—,60	5	—
"	virginiana, herzförmig gel. Bl., sehr zierend, fast selbstkriechend	1, —	9	—
Aristolochia	Sipho	M. 1 — bis	2, — 9—18	—
Celastrus	scandens, <i>Baummörder</i> , stark	M. 0,60 bis	1, — 5—9	—
Clematis	virginiana, winterhart, starkwüchsig, sehr empfehlenswerth	—,50	4	35
"	Vitalba, Weisse <i>Waldrebe</i>	—,60	5	45
"	Viticella, Blaue	M. 0,50 bis	—,75 4—6	35—50

Schlingsträucher. Gehölze zu Hecken und Lauben.

		pro Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätig
Clematis , grossblumige im Rammel	stark	1,—	9	—
Die einzelnen Sorten siehe im Sortiment der Ziergehölze.				
Lonicera Caprifolium , mehrere Sorten (siehe Sortiment)	M. 0,60 bis	1,—	5—9	—
Menispermum canadense, Kanadischer Mondsamen		—,30	5	—
Periploca graeca , Griechische Schlange		—,50	4	—
Rosa (siehe die Kletterrosen im Sortiment)	M. 0,50 bis	—,75	4½—7	—
Rubus fruticosus fl. albo pl., Gefüllte weisse Brombeere		—,50	4	—
Tecoma radicans (Bignonia)	M. 0,50 bis	1,—	4—9	—
Vitis odoratissima (Clinton u. andere amerikanische Sorten (siehe Sortiment)		—,75	6	—
Wistaria chinensis , Glycine	M. 1,— bis	2,—	9—18	—

Gehölze zu Hecken und Lauben.

Abies excelsa, Rothanne,	für hohe, immergrüne Schutzhecken	—	0,60—1,—	10—100	°	—
	sehr geeignet					
Berberis aquifolium	Mehrmals verpflanzte mit Ballen.					
	Mahonie, z. Anlage feiner niedriger					
	immergrüner Zierhecken					
	zu empfehlen	1	—	2,50	20	150
	verpfl.	2	—	3,50	30	250
		3	—	4,—	35	320
vulgaris	Berberitze, gemeine	2	0,20—0,35	2,—	18	—
		3	0,40—0,55	3,—	25	—
		1	—	1,50	13	—
atropurpureum	purpurbl.	2	—	2,50	20	—
	Sowohl für Schutz- als auch für Zierhecken sehr geeignet, verpfl.	3	—	3,25	30	—
		4	—	4,—	37 ½	—
Buxus suffruticosa	zu niedrigen Einfassungen,					
	per laufendes Meter M. 0,75	—	—			
	per 100 Meter M. 60,—	—	—			
Caragana arborescens	Karagane	1	—	2	18	150
	verpfl.	2	—	3,50	30	250
		3	—	4,50	40	—
Carpinus Betulus	Weissbuche (Hainbuche)	2	0,30—0,50	2,50	20	180
		3	0,60—0,80	3,—	25	200
		4	0,90—1,20	3,50	30	250

Crataegus Oxycantha. Weissdorn.

Vorrath 500,000 Stück.

III. Wahl, ca.	8-14 mm.	Umfang über der Wurzel	—	—	1,50	6	55
II. „ „	15-20 „	„ „ „ „	verpfl.	—	1,50	13	120
I. „ „	21-30 „	„ „ „ „	„ „	—	2,50	18	160

Cydonia japonica	Quitte, Japanische	1	0,15—0,25	5,—	45	—
" "	" "	2	0,30—0,40	7,50	67	—
" "	" buschige Sträucher	—	0,30—0,50	30,—	250	—
" "	" "	—	0,60—0,90	45,—	400	—
" vulgaris	gewöhnliche	—	0,40—0,60	4,—	35	—
" "	" buschige Sträucher	—	0,60—0,90	15,—	120	—
Ligustrum vulgare	Liguster Steckl.	1	0,20—0,30	2,50	22	200
" "	verpfl.	2	0,35—0,50	4,—	35	—
" "	" "	3	0,60—0,80	6,—	55	—
Robinia Pseud-Acacia	Akazie II. Wahl	1	0,15—0,30	—50	2	18
" "	I. "	1	0,40—0,60	4,—	6	50
" "	verpfl.	2	0,75—1,25	1,50	9	80
Spiraea, diverse Sorten	(zu Zierhecken) buschige Sträucher	—	0,60—1,00	12,—	100	—
Symphoricarpus racemosus	Schneebeere Steckl.	1	0,40—0,60	4,—	35	—
" "	" "	—	1,00—1,25	15,—	120	—
Ulmus campestris u. effusa	Rüster (zu Lauben)	—	1,50—2,50	30,—	—	—

Obstwildlinge zum Veredeln.

I. Wahl sogleich veredlungsfähig (Copulirstärke), verpflanzt.

II. „ im nächsten Sommer veredlungsfähig meist verpflanzt.

III. „ zum Verpflanzen.

Apfelwildlinge, Vorrath ca. 1½ Million extra starke.		I. Wahl	3,50	30	280
		II	2,50	20	180
		III	1,—	7	60
Birnwildlinge, Vorrath ca. 900,000 St. extra starke.		I	4,50	40	370
		II	3,—	28	250
		III	1,20	10	80
Kirschen, Süß-		I	4,50	40	350
		II	3,—	25	200
		III	1,—	8	70
	Sauer-	II	3,50	30	—
	Weichsel- (Mahaleb)	I	2,50	20	180
		II	2,50	20	180
Pflaumen, Damascener und St. Julien		I	6,—	50	—
		II	4,50	40	350
	Mirobalanen (Kirschpfl., Pr. cerasifera, Pr. divaricata)	I	2,50	20	180
	sehr gute Unterlage für Aprikosen u. für Pflaumen. (Kirschpfl.)	II	2,—	15	120
	Schlehen (Pr. spinosa)	I	3,—	28	—
		II	2,—	17	—
Pflaumen. Zwetschen (Prun. domestica)		I	3,50	30	270
		II	2,—	17	150
		III	1,—	8	70
Johannisapfel oder <i>Paradies-</i> , verpflanzte Ableger		I	5,—	45	400
	Ableger	II	4,—	35	300
Splittapfel oder <i>Doucín</i> , verpflanzte Ableger		I	5,—	45	400
	Ableger	II	4,50	40	350
		III	3,50	30	250
Quitten, verpflanzte Ableger		I	5,—	45	—
	Ableger	II	4,50	40	350
		III	3,—	25	200

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Alle Sämlinge sind in Folge der für diese Cultur ganz besonders günstigen Bodenverhältnisse vorzüglich gut bewurzelt und verhältnissmässig sehr stark.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 abgegeben.

Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist.

a) Laubhölzer.

		Alter in Jahren	Preise pro		
			100 M.	1000 M.	10000 M.
a) Laubhölzer.					
Acer	campestre, Feld-Ahorn	1	1,-	90	—
"	"	2	2,-	15	—
"	"	3	3,50	—	—
"	Ginnala	1	8,-	70	—
"	Monspessulanum	1	7,50	—	—
"	Negundo, Eschenblättriger. Ah.	1	—,80	7	—
"	"	2	1,20	10	—
"	"	3	2,-	15	—

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

			Alter in Jahren.	Preis pro		
				100 M.	1000 M.	10000 M.
Acer	Negundo Prachtpflanzen	verpfl.	4	3,—	24	—
"	<i>Negundo californicum</i>	0,30—0,50 m. h.	1	2,—	18	—
"	platanoides, Spitz-Ah.		1	1,25	—	—
"	Pseudoplatanus, weisser Ah.	0,15—0,30 m. h.	1	1,—	6	—
"	"	0,40—0,75 m. h. verpfl.	2	1,50	12	—
"	"	0,90—1,30 m. h.	3	2,50	17	—
"	"	1,40—2,— m. h.	4	3,50	27	—
"	erythrocarpum		1	6,—	—	—
"	fol. purpureis		1	6,—	—	—
"	"		2	8,—	—	—
"	"		3	10,—	—	—
"	robrum	verpfl.	1—2	10,—	—	—
"	tataricum		2	9,—	—	—
Aesculus	glabra		2—3	8,—	—	—
"	Hippocastanum Ross-Kastanie	0,10—0,15 m. h.	1	1,—	8	—
"	"	0,25—0,35 m. h.	2	2,—	16	—
"	"	0,40—0,55 m. h.	3	3,—	27	—
"	"	0,75—0,90 m. h.	4	4,—	37	—
Alnus	glutinosa Roth-Erle		1	1,—	8	70
"	"	0,30—0,50 m. h. verpfl.	2	2,—	18	150
"	"	0,60—0,80 " " "	3	3,—	25	225
"	"	" " "	4	4 1/2	—	—
"	incana, Weiss-E. (Nordische E.)		1	1,—	—	—
"	"	verpfl.	2	2 1/2	—	—
"	"	"	3	3,50	—	—
Amelanchier	canadensis, Felsenbirne		1	3,—	—	—
"	rotundifolia		1	2,50	—	—
Amorpha	fruticosa		1	1,—	8	—
"	"	verpfl.	2	2,—	17	—
"	"	"	3	4,—	30	—
Ampelopsis	quinquefolia	Stecklinge	1	4,—	35	—
Amygdalus	amara		1	8,—	—	—
"	"		2	10,—	—	—
Berberis	Aquifolium, Mahonie	0,05—0,15 m. h.	1	2,—	15	125
"	"	0,20—0,30 m. h. verpfl.	2	3,—	25	220
"	"	0,35—0,50 m. h.	3	4,—	35	320
"	vulgaris, Berberitze		2	2,—	18	—
"	"	"	3	3,—	25	—
"	atropurpurea, ächt		1	1,50	13	—
"	"	verpfl.	2	2,50	20	—
"	"	"	3	3,25	30	—
"	"	"	4	4,—	37,50	—
Betula	alba, Gemeine Birke	0,05—0,20 m. h.	1	1,—	8	70
"	"	0,30—0,50 m. h. verpfl.	2	1,50	13	125
"	"	0,60—1,00 m. h.	3	2 1/2	20	—
"	americana		1	3,50	—	—
"	"		2	6,—	—	—
"	odorata		1	3,50	30	—
"	populifolia		2	5,—	45	—
"	"		3	7,—	65	—
"	pubescens		1	3,—	—	—
"	tristis		1	3,—	25	—
"	"		2	4,—	—	—
"	"		3	6,—	—	—
Broussonetia	papyrifera		1	4,—	—	—
"	"	verpfl.	2	7,50	—	—
Buxus	arborescens (sempervirens)	Steckl.	1	10,—	90	—
"	myrtifolia	"	1	15,—	130	—
Calycanthus	floridus, Gewürzstrauch		1	10,—	90	—
Caragana	arborescens, Erbsenbaum		1	2,—	18	150
"	"	verpfl.	2	3,50	30	250
"	"	"	3	4 1/2	40	—
Carpinus	Betulus, Weissbuche (Hainbuche); siehe Heckenpflanzen.					

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren	Preis pro		
		100 M.	1000 M.	10000 M.
Carya amara <i>Hickory</i>	2	12,—	—	—
<i>olivaefornis</i>	1	8,—	15	—
" "	2	12,—	—	—
<i>porcina</i>	1	8,—	—	—
" "	2	12,—	100	—
<i>tomentosa</i>	2	10,—	—	—
Ceanothus americanus, <i>Säckelblume</i>	1	2,—	16	—
" "	2	3,50	30	—
" "	3	4,50	40	—
Celastrus scandens, <i>Baummörder</i>	1	6,—	50	—
" "	2	8,—	70	—
" "	3	10,—	—	—
Celtis occidentalis, <i>Zürgelbaum</i>	2	10,—	—	—
" "	3	12,—	—	—
Cephalantus occidentalis, <i>Kopfblume</i>	2	6,—	—	—
Cladrastis lutea	1	6,—	—	—
Clematis intermedia, <i>Waldrebe</i>	1	4,—	—	—
" "	2	6,—	—	—
" "	3	10,—	—	—
<i>Vitalba</i>	1	5,—	45	—
" "	2	6,—	55	—
" "	3	9,—	—	—
<i>Viticella</i>	1	5,—	45	—
" "	2	7,—	—	—
" "	3	10,—	—	—
Colutea arborescens, <i>Blasenstrauch</i>	1	1,—	8	—
" "	2	2½	20	—
" "	3	3½	30	—
<i>istria</i>	2	6,—	—	—
<i>orientalis</i>	1	2,—	18	—
" "	2	3,50	30	—
" "	3	5,—	45	—
Cornus alba, <i>Weisser Hartriegel</i>	1	1,50	10	—
" "	2	2,50	20	—
" "	3	4,—	30	—
<i>sibirica</i> , Sibirischer H. <i>ächt!</i>	1	15,—	130	—
" "	2	10,—	90	—
Corylus Avellana atropurpurea, <i>Blut-Hasel</i>	1	15,—	125	—
Contoneaster lucida	1	6,—	—	—
" "	2	10,—	—	—
<i>nummularia</i>	1	6½	—	—
<i>sinensis</i>	1	6,—	50	—
Crataegus Azarolus	3	12,—	—	—
" "	4	15,—	—	—
<i>coccinea</i> , <i>Scharlach-Dorn</i> , für den Norden zu Hecken	1	4,—	35	—
" "	2	6,—	—	—
<i>Crus galli</i> , <i>Hahnsporndorn</i>	1	4,—	35	—
" "	2	5,—	45	—
" "	3	6,—	—	—
" <i>ovalifolia</i>	3	9,—	—	—
" "	4	12,—	—	—
<i>Douglasi</i> (<i>glandulosa</i>)	1	4,—	—	—
" "	2	6,—	—	—
" "	3	8,—	—	—
<i>nigra</i>	1	4,—	45	—
" "	2	6,—	50	—
" "	4	10,—	—	—
<i>Oxyacantha</i> , <i>Weissdorn</i> Siehe Heckenpflanzen.	1	4,—	—	—
<i>prunifolia</i>	2	6,—	55	—
" "	3	8,—	—	—
<i>punctata</i>	1	5,—	—	—
<i>sanguinea</i> , <i>Blutdorn</i>	1	5,—	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren	Preis pro		
		100 M.	1000 M.	10000 M.
Crataegus sanguinea	2	7,—	—	—
subvillosa	1	5,—	—	—
Cydonia japonica , Japanische <i>Quitte</i> (s. auch Heckenpflanzen)	1	5,—	45	—
" "	2	7,50	67	—
" "	3	10,—	90	—
vulgaris, Gemeine Apfel-Q.	1	4,—	35	—
Cytisus hirsutus Behaarter <i>Gaisklee</i>	1	3,—	—	—
" "	3	7,—	—	—
elongatus	1	3,—	25	—
" "	2	5,—	—	—
Deutzia crenata	1	4,—	35	—
" " fl. pl.	1	4,—	35	—
Fortunei	1	5,—	—	—
gracilis	1	6,—	50	—
Elaeagnus angustifolia	1	5,—	—	—
Evonymus europaea , <i>Spindelbaum</i> (Pfaffenhütchen)	1	1,—	8	—
" "	2	2,—	15	—
" "	3	3,—	20	—
radicans viridis fol. arg. var.	2	15,—	—	—
Fagus sylvatica <i>Rothbuche</i>	2	2,—	18	—
" "	3	3,—	27	200
Fraxinus alba	1	4,—	—	—
" "	2	5,—	40	—
" "	3	6,—	50	—
" "	4	7,—	60	—
americana weisse <i>Esche</i>	2	5,—	45	—
" "	3	7,—	60	—
cinerea, Amerikanische Original-Saat)	1	7,—	—	—
excelsior, Gemeine E.	1	1,—	5	45
" "	2	1,50	12	100
" "	3	2 1/2	20	190
" "	4	4,—	—	—
oregona, (Amerikanische Original-Saat)	2	8,—	—	—
" "	3	10,—	—	—
Hypericum ramosissimum	1	8,—	75	—
" "	2-3	12,—	—	—
Iberis sempervirens , Schleifenblume	1	8,—	—	—
Ilex aquifolium , Stechpalme	2	12,—	100	—
Juglans nigra , Schwarze W.	1	4,—	30	—
" "	2	6,—	—	—
" "	3	8,—	—	—
Koelreuteria paniculata	1	3,—	27	—
" "	2	5,—	—	—
Laburnum vulgare , Gemeiner <i>Goldregen</i>	1	1,50	10	—
" "	2	2,50	20	—
Ligustrum amurense , <i>Liguster</i> vom Amur	2	12,—	—	—
atrovirens	2	12,—	—	—
vulgare, Gemeiner L.	1	2,50	22	200
" "	2	4,—	35	—
" "	3	12,—	—	—
fol. var., buntblättrig	2	12,—	—	—
italicum	2	12,—	—	—
ovalifolium	1	8,—	70	—
" "	2	12,—	—	—
pyramidale (compactum)	1	6,—	55	—
Lonicera Ledebouri	2	12,—	100	—
tatarica alba grandiflora	2	12,—	—	—
gracilis	2	10,—	—	—
Maclura aurantiaca , <i>Osageorange</i>	1	8,—	—	—
Morus alba , Weisse <i>Maulbeere</i>	1	2,—	—	—
" "	2	4,—	35	—
" "	3	6,—	—	—
nigra, Schwarze M.	1	2,—	—	—
" "	2	4,—	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

			Alter in Jahren	Preis pro		
				100 M.	1000 M.	10000 M.
Morus	nigra		3	6,—	—	—
Myricaria	germanica	verpfl. Steckl.	2	10,—	—	—
	dahurica		2	10,—	—	—
Phellodendron	amurense	Steckl.	1	25,—	225	—
Philadelphus	Columbianus		1	6,—	—	—
	coronarius		1	5,—	40	—
	fl. pl., gefüllt		1	7,—	—	—
	fr. aureis		1	8,—	75	—
		verpfl.	2	10,—	—	—
			3	15,—	—	—
	dianthiflorus pl.		2	10,—	90	—
			3	15,—	—	—
	floribundus (pubescens). Reichblühender J.		1	3,—	25	—
			2	4,50	—	—
	Gordonianus		1	3,—	—	—
	grandiflorus		1	5,—	—	—
	speciosissimus	verpfl.	2	8,—	—	—
	latifolius		1	3,—	25	—
	pendulifolius		3	10,—	—	—
	primulaeflorus pl.		3	12,—	—	—
	pubescens Souvenir de Billard		1	8,—	—	—
		verpfl.	2	10,—	—	—
Pirus	baccata Beeren-Äpfel		1	3,—	27	—
		verpfl.	2	4,—	35	—
			3	5,—	45	—
	cerasifera		2—3	6,—	—	—
	oblonga		1	3,—	25	—
			2—3	6,—	—	—
	floribunda		1	4,—	—	—
			2	6,—	—	—
			3	8,—	—	—
	Kajdo		1	3,—	—	—
			2	4,—	—	—
		verpfl.	3	5,—	45	—
Platanus	orientalis, Platané	Steckl.	1	5,—	45	—
		verpfl. starke	2	8,—	—	—
Populus	alba nigra, Silber-Pappel, ächt		2	7,—	—	—
	balsamifera macrophylla		2	6,—	—	—
	canadensis	Steckl.	2	5,—	45	—
	aurea		1	10,—	90	—
	candicans		2	8,—	—	—
	fastigiata, Pyramiden-P.		2	5,—	—	—
	hybrida Berolinensis, Berliner Lorbeer-P.		2	5,—	—	—
	laurifolia, Lorbeer-P.		1—2	4,—	—	—
	Simoni		1	8,—	—	—
			2	2,—	—	—
Potentilla	floribunda		2	10,—	—	—
			3	12,—	—	—
	fruticosa		1	4,—	—	—
Prunus	cerasifera (Myrobalana) Kirschpflaume, s. Obstwildlinge.					
	Mahaleb, Weichsel, s. Obstwildlinge.					
	Padus Traubenkirsche		1	2½	20	—
		verpfl.	2	4,—	35	—
			3	6,—	—	—
	serotina, mit lorbeerartigen Blättern, sehr schön!		1	3,—	27	—
			2	4,50	—	—
			3	6,—	—	—
	virginiana	0,10—0,25 m. h.	1	2½	20	—
			2	4,—	30	—
		0,80—1,10 "	3	5,—	40	—
		1,20—1,60 "	4	6,—	50	—
Ptelea	trifoliata, Lederbaum		1	1½	13	—
			2	2½	20	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

			Alter in Jahren	Preis pro		
				100 M.	1000 M.	10000 M.
Ptelea	trifoliata		3	3,50	30	—
Quercus	coccinea Scharlach-E.	verpfl.	1	4,—	35	—
"	"	"	2	7,—	—	—
"	ilicifolia	"	2	9,—	—	—
"	palustris, Sumpf-E.	"	1	3,—	25	—
"	"	verpfl.	2	5,—	—	—
"	rubra, Rothe E.	"	1	3,—	25	—
"	"	verpfl.	2	5,50	—	—
"	"	"	3	8,—	70	—
"	"	"	4	12,—	110	—
"	pedunculata Robur, Gemeine Stiel-E. (Sommer-E.)	0,10—0,25 m. h.	1	1,25	80	—
"	"	"	2	2,—	18	—
"	"	"	3	3,50	30	—
"	"	0,30—0,40 m. h. verpfl.	1	7,—	—	—
"	Robur, var. virgiliana	"	2	10,—	90	—
"	"	"	3	15,—	125	—
"	tinctoria	verpfl.	2	16,—	—	—
"	"	"	3	20,—	—	—
Rhamnus	cathartica, Kreuzdorn	"	1	1,50	12	—
"	"	"	3	3 ½	—	—
"	"	"	4	5,—	—	—
"	Frangula, Faulbaum	"	2	1,50	—	—
Rhus	typhina	"	3	10,—	—	—
"	toxicodendron	"	3	8,—	—	—
Ribes	albidum, Weissblühende Johannisbeere	Steckl.	1	4,—	—	—
"	alpinum, Bester Schattenstrauch	verpfl.	2	5,—	45	—
"	"	"	3	6,—	50	—
"	"	"	4	8,—	75	—
"	aureum	"	2	6,—	50	—
"	"	"	3	8,—	70	—
"	acerifolium	"	1	5,—	40	300
"	"	"	2	8,—	70	600
"	Diacantha	"	1	6,—	—	—
"	floridum (americanum)	Steckl.	1	5,—	—	—
"	"	"	2	6,—	50	—
"	Gordonianum	Steckl.	1	6,—	50	—
"	"	"	2	9,—	80	—
"	nigrum fol. aur. var.	"	1	6,—	—	—
"	"	"	2	8,—	—	—
"	heterophyllum, geschlitzblättrig	Steckl.	1	6,—	—	—
"	"	"	2	10,—	—	—
"	sanguineum carneum grandiflorum	"	1	6,—	—	—
"	"	"	2	10,—	—	—
"	setosum	"	1	6,—	—	—
Robinia	Pseud-Acacia, Akazie, siehe Heckenpflanzen.					
Rosa	canina, Hunds-Rose	verpfl.	1	1,25	10	90
"	"	"	2	2,50	20	180
"	cinnamomea, Zimmetrose	"	2	10,—	—	—
"	fraxinifolia	"	2	10,—	—	—
"	rubiginosa, Schottische Zaunrose (sweet briar)	"	1	6,—	—	—
"	"	"	2	10,—	—	—
"	rubrifolia	"	1	5,—	—	—
Salix	Amaniana	Stecklingspflanzen	1	5,—	—	—
"	amygdalina discolor	"	2	5,—	—	—
"	austriaca	"	2	4,—	—	—
"	Bataviae	"	2	5,—	—	—
"	caspica (pruinosa) Kaspische Weide	"	1	2,—	18	—
"	decipiens	"	2	5,—	—	—
"	Doniana	"	2	5,—	—	—
"	elegantissima, Japanische Trauerw.	"	2	4,—	35	—
"	Helix pyramidalis, Pyramiden-Bach-W.	"	2	4,—	35	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren.	Preis pro		
		100 M.	1000 M.	10000 M.
Salix heterophylla Stecklingspflanzen	2	5,—	—	—
hippophaefolia undulata	1	5,—	—	—
holosericea angustifolia	12	6,—	—	—
Hoppeana	22	4,—	—	—
japonica	12	6,—	—	—
jaspidea	12	4,—	—	—
incana (rosmarinifolia) (-Elaeagnus)	12	5,—	—	—
Lambertiana	12	6,—	—	—
laurina	12	6,—	—	—
Laweana	12	6,—	—	—
menthaefolia	12	7,—	—	—
Meyeriana	12	4,—	—	—
mirabilis	12	6,—	—	—
mollissima	12	5,—	—	—
nigricans	1	4,—	—	—
parvifolia	12	6,—	—	—
Petzoldi	12	6,—	—	—
Pontederana	12	8,—	—	—
praecox	12	6,—	—	—
purpurea	12	5,—	—	—
pendula	12	4,—	—	—
uralensis	12	4,—	—	—
rigida	12	5,—	—	—
rubra	12	5,—	—	—
Russelliana	12	4,—	—	—
Sacramento	12	4,—	—	—
salviaefolia	12	5,—	—	—
Seringeana	12	5,—	—	—
stipularis	12	4,—	—	—
viminalis caprea	12	5,—	—	—
regalis	12	6,—	55	—
vitellina, Dotter-W.	1	2,—	18	—
acuminata	12	4,—	35	—
lanceifolia	1	4,—	—	—
aurantiaca	12	5,—	—	—
Britzensis, Rothe Dotter-W. (s. Neuheiten)	1	7,—	60	—
flava	12	12,—	100	—
glauca	12	5,—	—	—
nova	12	4,—	—	—
purpurea	2	8,—	70	—
Sambucus canadensis, Kanadischer Hollunder	12	4,—	—	—
fol. luteis	1	6,—	50	—
heterophylla	12	8,—	70	—
racemosa	1	6,—	—	—
racemosa	12	8,—	—	—
racemosa	1	2,—	18	—
racemosa	12	5,—	15	—
Sorbus aucuparia, Gemeine Eberesche	1	1 80	—	—
Fifeana	1	6,—	55	—
Fifeana	2	8,—	—	—
Spiraea alba, Weißer Spierstrauch Steckl.	1	3,—	—	—
aurifolia	2	5,—	—	—
bella coccinea	2	6,—	50	—
callosa (Fortunei)	1	7,—	—	—
callosa (Fortunei)	2	2,—	18	—
atrosanguinea	3	4,—	30	—
Foxi	1	10,—	—	—
Foxi	1	7,—	—	—
macrophylla	2	10,—	—	—
macrophylla	1	7,—	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

			Alter in Jahren	Preis pro		
				100 M	1000 M	10000 M.
Spiraea	<i>callosa</i> <i>superba</i>	Steckl.	1	6,—	—	—
"	"	"	2	8,—	—	—
"	<i>canescens</i> (<i>nepalensis</i>)	"	1	5,—	—	—
"	"	"	2	7,—	—	—
"	<i>cantonensis</i>	"	1	5,—	—	—
"	<i>Douglasi</i>	"	1	6,—	—	—
"	<i>eximia</i>	"	1	6,—	—	—
"	<i>expansa</i>	"	1	5,—	—	—
"	" <i>nivea</i>	"	1	6,50	—	—
"	<i>hypericifolia</i>	"	1	5,—	40	—
"	"	"	2	8,—	—	—
"	<i>laucelata</i>	"	1	6,—	—	—
"	<i>opulifolia</i>	"	1	1,50	—	—
"	"	"	3	4,—	—	—
"	<i>prunifolia</i>	Steckl.	1	6,—	—	—
"	<i>sorbifolia</i>	"	1	6,—	—	—
"	<i>Thunbergi</i>	Steckl.	1	7,—	65	—
"	"	"	2	10,—	—	—
"	<i>vaccinifolia</i>	"	1	6,—	—	—
Staphy	<i>aea colchica</i> , Kolchische <i>Pimpernuss</i> (<i>Hoibrenkia formosa</i>).					
	Sehr gut zum Frühlreiben in Töpfen geeigneter schönblühender		2	20,—	175	1500
	Strauch (siehe Abbildung Seite 198) starke verpflanzte		3	30,—	250	—
"	<i>pinata</i>	"	1	5,—	40	—
"	"	"	2	8,—	—	—
"	"	"	3	10,—	—	—
Symphoricarpus	<i>orbiculatus</i> (<i>vulgaris</i>)	Steckl.	1	4,—	—	—
"	"	"	2	6,—	50	—
"	fol. aurea var.	"	1	6,—	—	—
"	"	"	2	9,—	—	—
"	<i>racemosus</i> , <i>Schneebeere</i>	"	1	4,—	35	—
"	"	"	2	6,—	—	—
Syringa	<i>persica</i> , Persischer <i>Flieder-</i>	Steckl.	2	10,—	—	—
"	<i>alba</i>	"	2	10,—	—	—
"	<i>Rothomagensis</i> <i>alba</i>	"	2	10,—	—	—
"	<i>rubra</i> (<i>Saugeana</i>)	"	1	8,—	75	—
Tamarix	<i>africana</i> , Afrikanische <i>Tamariske</i>	"	1	3,50	—	—
"	<i>gallica</i>	"	1	3,—	25	—
"	"	"	2	6,—	50	—
"	<i>tetrandra</i> (<i>parviflora</i>)	Steckl.	1	2,—	15	—
"	"	"	2	4,—	30	—
Tecoma	<i>radicans</i>	verpfl. Steckl.	3	20,—	180	—
Tilia	<i>americana</i>	"	1	12,—	—	—
"	"	"	2	15,—	—	—
"	"	"	3	18,—	—	—
"	<i>platyphyllos</i> , Grossblättr. holländ. <i>Linde</i>	"	1	2,50	20	—
"	<i>ulmifolia</i> , Kleinblättrige Steinlinde	"	1	2,50	20	—
"	"	"	2	3,—	25	—
"	"	"	3	3,50	30	—
"	"	"	4	5,—	40	—
"	<i>vulgaris</i>	"	1	3,—	25	—
"	"	"	2	4,—	—	—
Ulmus	<i>americana</i> , ächt.	"	1	2,50	20	—
"	<i>campestris</i> , Feld- <i>Rüster</i>	"	1	1,—	6	—
"	"	"	2	1,50	12	—
"	"	verpfl.	3	2,50	—	—
"	<i>effusa</i> (<i>laevis</i>) <i>Flatter-R.</i>	"	1	1,50	12	—
"	"	"	2	2,50	20	—
"	<i>montana</i>	"	1	2,—	—	—
"	"	"	2	4,—	—	—
"	"	"	3	6,—	50	—

b) Nadelhölzer.

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren	Preis pro		
		100 M.	1000 M.	10000 M.
Juniperus communis Wachholder	1	3,—	25	—
" "	2	5,—	45	—
" Sabina	1	15,—	130	—
" "	2	20,—	—	—
" tamariscifolia	1	15,—	—	—
" virginiana	1	3,—	—	—
" "	2	5,—	—	—
" tripartita	1	15,—	—	—
Larix europaea Lärche	1	1,—	9	—
Pinus contorta	1	5,—	—	—
" "	2	10,—	—	—
" inops	2	10,—	—	—
" insignis	1	6,—	—	—
" Laricio	2	3,—	25	—
" austriaca	2	5,—	45	—
" montana	1	3,—	25	—
" muricata	1	5,—	—	—
" Pinaster	1	3,—	25	—
" "	2	5,—	—	—
" rigida	1	2,50	20	—
" "	2	5,—	—	—
" Strobilus, Weymouth-K.	2	3,50	30	—
" "	1	2,—	18	—
" excelsa, Hohe W. Kiefer	1	5,—	45	—
" "	2	10,—	90	—
" sylvestris, Gemeine Kiefer (Föhre)	1	— 80	3	18
" "	3	2,—	15	—
" "	4	3,50	30	—
Taxodium distichum	1	8,—	—	—
Taxus baccata, Eibe	1	5,—	40	300
" erecta	1	5,—	40	—
" canadensis	1	6,—	—	—
" Dovastoni	1	10,—	—	—
" Menziesi (Lobbi)	1	4,—	30	—
Thuja Ellwangeriana	1	12,—	100	—
" Menziesi	2	20,—	—	—
" occidentalis, Abendländischer Lebensbaum	1	1,—	6	50
" "	2	2,—	12	100
" "	3	3,—	25	200
" argentea	1	20,—	—	—
" Boothi	1	15,—	130	—
" caucasica	1	15,—	—	—
" compacta	1	15,—	—	—
" globosa	1	15,—	130	—
" Hoveyi	1	15,—	125	—
" recurvata	1	20,—	—	—
" nana	1	20,—	—	—
" tatarica	1	15,—	—	—
" (Biotia) orientalis, Morgenländischer Lebensbaum	2	3,—	20	—
" "	3	4,—	—	—
" Verwaeneana	1	15,—	—	—
" Wareana	1	17,50	150	—
Thuyopsis dolabrata	1	15,—	—	—
" fol. var.	1	20,—	—	—
" laetevirens (-dolabrata nana.)	1	15,—	—	—

Spargelpflanzen. Diverse Pflanzen und Zwiebeln.

Spargelpflanzen.

		100 M.	1000 M.	10000 M.
Riesen-Spargel (Vorrath ca. 300,000 St.)	I. Wahl	1,50	14	—
" "	II. "	1,25	11	100
" "	III. "	1,—	8	60
Conover's Colossal (Vorrath über 150,000) sehr starke Stiele	I. "	2,50	22	—
" "	II. "	1,75	16	140
" "	III. "	1,25	11	100
Früher von Argenteuil (Vorrath über 100,000)	I. "	3,—	25	—
" "	II. "	2,—	18	—
" "	III. "	1,50	12	110

Diverse Pflanzen und Zwiebeln.



Hyacinthus candicans.

Asarum europaeum *Haselwurz*

Asclepias syriaca, hübsche grossbl. Staude mit graulila Blüten

Bocconia cordata, sehr hübsche grossblättrige Einzelpflanze auf Rasen, mit grossen weissen Blütenrispen. Eine völlig harte Staude

Hyacinthus candicans, (s. Abbildung.) Die im August erscheinenden Blumenstiele erreichen eine Höhe von mehr als 1 Meter und sind mit 30–50 schneeweissen Glocken garnirt. Die Zwiebel braucht erst im Frühjahr gelegt zu werden (in guten Gartenboden) I. Wahl 1000 St. 60 M.

" " " (noch blühbare Zwiebeln) II. " 1000 St. 40 M.

" " " III. " 1000 St. 25 M.

Iris caucasica major, gr. gelb

" foetida fol. var. mit weissgestreiften Blättern

" iberica

" pumila

" reticulata, die beste zierlichste Freiland-Species

Oxalis Deppe's zu Einfassungen, auch als Gemüse verwendbar

Paeonia herbacea, Krautartige Päonie in schönem Rummel

" " " 1 Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück 4 M.

" " " 1 " 10 " 2 " 7 "

1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
—,10	—,75	7
—,50	—	—
—,10	2 1/2	—
—,10	—,80	7
—,10	—,60	5
—,05	—,40	3
—,50	—	—
—,50	—	—
—,50	4 1/2	40
—,20	1,75	15
—,60	5 1/2	50
—,20	1 3/4	15
—,35	3,—	25

Diverse Pflanzen und Zwiebeln. Pflanzen zum Treiben.

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Paeonia tenuifolia <i>pl.</i> , Gefüllte feinblättrige, dunkelroth blühende Päonie; eine Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchpartieen jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt	—,30	5 1/2	50
Phlox decussata „ <i>Boule de feu</i> “, eine herrlich roth blühende Staude	—,30	2 1/2	20
Poligonum Sieboldi	—,20	1 1/2	—
Rhabarber (<i>Rheum barbatum</i> , <i>R. giganteum</i> , <i>R. Victoria</i>); die zubereiteten Blattscheiben geben ein vorzügliches dem Apfelmuss ähnliches Compot	—,25	2	15
Spiraea palmata elegans , neu	—,40	3 1/2	30
„ <i>Ulmaria fl. pl.</i> , gefüllt weiss	—,30	2 1/2	20
„ <i>venusta rosea</i> , die schönste der Stauden-Spiraeen, mit grossem, rosenrothen Blütenstande; <i>neu!</i>	—,70	6	—

Pflanzen zum Treiben.



Spiraea jap. (*Hoteia japonica*.)

Spiraea jap. (Hoteia japonica.)		1000 M.	1000 M.
Maiblumenkeime,	stärkste blühbare, versende ich von Mitte October bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Sand-Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse	I. Wahl netto	4 36
(Convallaria majalis.)			
Amygdalus persica pl.	in div. Sorten, starke 1 jähr. Veredlungen	I. Wahl	125 —
Deutzia gracilis		II.	20 —
31		I.	10 —
32	crenata fl. pl.	II.	30 250
33		I.	18 150
34		II.	50 —
Lonicera fuchsoides		I.	35 —
Prunus japonica (sinensis) alba pl., veredelt		I.	25 —
	wurzelächt	II.	15 —
35		I.	40 —
36	tritoba	II.	15 —
Spiraea callosa alba		I.	9 —
37		II.	25 —
38	Cantonensis fl. pl.	I.	18 —
39	japonica (Hoteia japonica) (s. Abbildung)	II.	12 —
40		I.	20 —
41	Thunbergi		75 —
Staphylaea colchica, starke Sträucher (s. Abbildung Seite 98)			25 200
42	2 3jähr. verpflanzte		

L. Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Pflanzen zum Treiben. Diverse Artikel.

			1000 M.	1000 M.
Syringa persica		I Wahl	40	—
<i>Rothomagensis</i> (sinensis)		I	40	—
" <i>alba</i>		I	40	—
" <i>rubra</i> (Saugeana)		I	40	—
obige 4 Sorten		II	30	—
<i>vulgaris</i> „Andenken an Ludwig Späth“, behält die schöne dunkelrothe Farbe beim Treiben bei.	Starke 1jährige Veredlungen		200	—
Charles X.	2—3	"	55	—
" " " " " " " " " " "	1	"	35	300
Marie Legray	1	"	75	—
Marlyensis (Marlyronge)		I. Wahl	45	—
Schneelawine	1 jährige Veredlungen		35	—
virginialis (blanche virginale)	1	"	40	—
<i>Viburnum opulus roseum</i>		I. Wahl	30	—
ca. 1,25 m hohe Stämme mit starken Kronen			75	—

Pflanzen zum Treiben in Töpfen

	10 St. M.	100 St. M.
Deutzia gracilis	4½	40
Staphylaea colchica	6	50
Syringa Rothomagensis rubra (Saugeana)	7½	60

Diverse Artikel.

Späth'sche Pfropfpfannen, (s. Abbildung) äusserst practisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses p. Stück 6 M.

Verzinkten Eisendraht für Schnurbäumchen u. Spaliere p. K. 1 M., 10 K. 8 M. (1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter.)

Drahtspanner p. St. 50 Pf. u. 20 Pf., p. 10 St. 4,50 M. u. 1,75 M.

Schlüssel zu den Drahtspannern p. St. 40 Pf.

Englische Gartenmesser aus der Saynor'schen Fabrik, deren Inhaber sich speciell mit der Anfertigung von Garten-Werkzeugen beschäftigen und anerkanntermassen das Vorzüglichste auf diesem Gebiete leisten.

a) Hippen Klängen vom feinsten Stahl, meist Hirschhorn-Griff, in 12 verschiedenen Grössen und Formen p. St. 2,31—3,80 M.

b) Oculir- u. Copulir-Messer, ebenfalls bester Stahl, meist Elfenbein-Griff, in 8 verschiedenen Grössen u. Formen p. St. 2,30—4,00 M.

Verzinkten Etikettendraht p. Kilo 3 M.

Holz-Etiketten zum Anbinden, frisch gestrichen und mit Draht versehen p. 100 St. 1,25 M., p. 1000 St. 10 M.

Radig'sche wetterbeständige Etiketten, oval mit blauem Blechrande, sehr elegant, oval 75 mm. lang, 55 mm. breit p. 100 St. 8 M.

Etikettentinte pro Fläschchen, zu mehr als 1000 St. reichend à 0,75 M.

Etikettenlack à Fläschchen 0,75 M.

Zink-Etiketten, chemisch präparirt, 80 mm. lang 24 mm. breit mit Draht versehen p. 100 St. 3 M., p. 1000 St. 27,50 M.

Etikettentinte, unauflöschliche, für Zink-Etiketten à Fläschchen 0,75 M.

Baumwachs, warmflüssiges, in hiesiger Baumschule benutzte Composition p. Kilo 2 M.

Raffiabast, Japanischer p. Kilo 3 M.



Späth'sche Pfropfpfanne.

Das Verzeichniss über

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumen-zwiebeln findet von *Mitte August bis Ende October* statt.

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzweibelfelder (welche ca. $1\frac{1}{2}$ Hektar umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt.

Baumschule bei Rixdorf-Berlin, im September 1885,

L. Späth.

Auf

der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung
im September 1885

erhielten die von mir ausgestellten Baumschul-Artikel
den für die hervorragendste Leistung ausgesetzten






„Ehrenpreis Sr. Majestät des Kaisers.“



Inhalts-Verzeichniss.

	Seite.		Seite.
Neuheiten der Baumschule	2	Johannisbeeren	42
Neue und sehr wenig verbreitete Ziergehölze	5	Himbeeren	43
Edeleiser	6	Brombeeren	44
Veredelte Obstbäume	6	Erdbeeren	45
Äpfel	7	Rosen	50
Birnen	16	Ziergehölze, Sortimente, Laubhölzer	59
Kirschen	26	„ Nadelhölzer (Coniferen)	104
Pflaumen	29	Gehölze für Parkanlagen	108
Pfirsiche	33	Alleebäume	108
Aprikosen	35	Trauerbäume	111
Mandeln	36	Schlingsträucher	112
Walnüsse	36	Gehölze zu Hecken und Lauben	113
Haselnüsse	37	Obstwildlinge zum Veredeln	114
Mispeln	37	Gehölzsämlinge und junge Pflanzen	114
Quitten	38	Spargelpflanzen	124
Hagebutten	38	Diverse Pflanzen und Zwiebeln	124
Weinreben	38	Pflanzen zum Treiben	125
Stachelbeeren	41	Diverse Artikel	126





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Für die Besucher meiner bei Rixdorf-Berlin gelegenen, jetzt über 125 Hektar umfassenden Baumschule, bemerke ich, dass der Weg dahin von Berlin durch Rixdorf vom Kriegerdenkmale (Granitsäule) links die Berliner Strasse entlang führt. (Bis zur Baumschule gepflasterte Strasse.) Man fährt von Berlin per Droschke bis zur Baumschule in einer halben Stunde; ausserdem kann man folgende Verbindungen benutzen:

Stadtring-Züge (Südring).

(Winter-Fahrplan.)

Station	Morgens	Abds.
<i>Friedrichstrasse</i>	Abg. 5 ²⁴	stündl. bis 10 ²⁴
<i>Börse</i>	" 5 ²⁷	" " 10 ²⁷
<i>Alexander-Platz</i>	" 5 ³⁰	" " 10 ³⁰
<i>Jannowitz-Brücke</i>	" 5 ³³	" " 10 ³³
<i>Schlesischer Bahnhof</i>	" 5 ³⁷	" " 10 ³⁷
<i>Warschauer Brücke</i>	" 5 ⁴⁰	" " 10 ⁴⁰
<i>Stralau-Rummelsburg</i>	" 5 ⁴⁴	" " 10 ⁴⁴
<i>Treptow</i>	" 5 ⁴⁷	" " 10 ⁴⁷
<i>Rixdorf</i>	Ank. 5 ⁵²	" " 10 ⁵²

Rückf. von Rixdorf in derselben Richtung vice versa:

Abgang 5²⁴ | 5⁵⁴ stündlich bis 10⁵⁴ Abends.

Morgens

Station	Morgens	Abds.
<i>Potsd. Bahnhof</i>	Abg. 5 ⁴ 5 ³⁴	stündl. bis 10 ³⁴
<i>Schöneberg</i>	" 5 ¹⁰ 5 ⁴⁰	" " 10 ⁴⁰
<i>Tempelhof</i>	" 5 ¹⁶ 5 ⁴⁶	" " 10 ⁴⁶
<i>Rixdorf</i>	Ank. 5 ²³ 5 ⁵³	" " 10 ⁵³

Rückf. von Rixdorf in derselben Richtung vice versa:

Abgang 5⁵³ Morgens stündlich bis 10⁵³ Abends.

Vorort-Züge der Stadt- und Ringbahn.

Station	Morgens	Abds.
<i>Friedrichstrasse</i>	Abg. 6 ⁴¹ * 8 ¹⁶ 10 ⁵ * 2 ⁸ * 6 ⁴² 9 ⁵	
<i>Alexander-Platz</i>	" 6 ⁴⁷ 8 ²³ 10 ¹¹ 2 ¹⁵ 6 ⁴⁹ 9 ¹¹	
<i>Schlesischer Bahnhof</i>	" 6 ⁵⁴ 8 ³¹ 10 ¹⁸ 2 ²⁵ 7 ¹ 9 ¹⁸	
<i>Stralau-Rummelsburg</i>	" 6 ⁵⁹ — 10 ²⁴ — — 9 ²⁴	
<i>Treptow</i>	" 7 ² — 10 ²⁷ — — 9 ²⁷	
<i>Johannisthal (-Nieder-Schönweide)</i>	Ank. 7 ¹² 8 ⁴⁶ 10 ³⁷ 2 ⁴² 7 ¹⁷ 9 ³⁷	

In derselben Richtung vice versa:

Abg. v. Stat. <i>Johannisthal</i> (-Nied.-Schönw.)	Morgens	7 ³³ * 11 ⁵ 3 ⁰ * 5 ²³ 7 ⁴⁰ 10 ²	Abds.
--	---------	--	-------

Die mit * bezeichneten Züge halten in Treptow und Stralau-Rummelsburg nicht!

Berlin-Görlitzer Eisenbahn.

(Winter-Fahrplan. Vorort- und Anschluss-Züge.)

Station	Morgens	Abds.
<i>Berlin, Görlitzer Bahnhof</i>	Abg. 5 ¹⁵ 7 ⁵ 8 ⁰ 8 ³⁴ 10 ³⁰ 12 ³⁰ 1 ³⁰ 2 ³⁵ 3 ²⁰ 4 ³⁰ 6 ³⁰ 7 ¹⁰ 8 ²⁰ 9 ³⁰ 11 ¹⁵	
<i>Kanne</i>	Ank. — 7 ¹⁵ — — 10 ⁴⁰ — 1 ⁴³ — — 4 ⁴³ — — — 11 ²⁸	
<i>Johannisthal (-Nieder-Schönweide)</i>	" 5 ²⁵ 7 ¹⁵ 8 ¹² 8 ⁴² 10 ⁴⁴ 12 ¹² 1 ⁴⁶ 2 ⁴⁶ 3 ³⁵ 4 ⁴⁶ 6 ⁴² 7 ²¹ 8 ³⁴ 9 ⁴² 11 ³¹	
<i>Johannisthal (-Nieder-Schönweide)</i>	Abg. 6 ²³ 7 ²⁸ 8 ³ 10 ³ 11 ⁹ 12 ³ 2 ⁵⁵ 3 ⁴³ 5 ²⁸ 7 ³⁰ 8 ⁴⁹ 9 ⁵⁷ 10 ²⁷ 11 ²⁴	
<i>Kanne</i>	" 6 ²⁶ — 8 ⁶ — — 12 ⁶ — 3 ⁴⁶ — 7 ³³ — — — —	
<i>Berlin, Görlitzer Bahnhof</i>	Ank. 6 ¹⁰ 7 ⁴⁰ 8 ¹⁷ 10 ¹⁵ 11 ²⁰ 12 ²⁰ 3 ⁷ 4 ⁰ 5 ⁴⁰ 7 ⁴⁴ 9 ² 10 ⁸ 10 ⁴⁰ 11 ⁴⁰	

An Sonn- und Feiertagen halten die Züge in Kanne nicht!

Von Kanne führt die Kanne-Rixdorfer Chaussee fast direct nach der Baumschule; man erreicht dieselbe zu Fuss von Kanne in 15, von Johannisthal (Nieder-Schönweide) in 20 und von Neuer Krug (vide unten) in 20 Minuten.

Pferde-Eisenbahn.

Spittelmarkt—Rollkrug—Rixdorf und Behrenstrasse—Rollkrug.

Von 7¹⁰ Morgens bis 10³⁰ Abends in Zwischenräumen von je 12 Minuten (von Rixdorf zurück der letzte Wagen 10⁴⁰ Abends).

Dampfer-Verbindung.

Berlin, Jannowitzbrücke—Köpnickerstr. 8a.—Neuer Krug [Johannisthal (-Nieder-Schönweide)].

	Herbst	Frühjahr	Sommer
	vom 16. Sept.—31. October	vom 1. April—23. Mai	vom 24. Mai—15. September
<i>Berlin, Jannowitzbrücke</i>	Abg. 8 ⁰ 10 ⁰ 12 ¹⁵ 2 ⁰ 3 ⁰ 6 ⁰	8 ⁰ 10 ⁰ 12 ¹⁵ 2 ⁰ 3 ⁰ 6 ⁰	— 8 ⁰ 10 ⁰ 12 ¹⁵ 2 ⁰ 3 ⁰ 4 ⁰ 5 ⁰ 6 ⁰ 7 ⁰ 8 ⁰
<i>do. Köpnickerstr. 8a</i>	8 ¹⁰ 10 ¹⁰ 12 ²⁵ 2 ¹⁰ 3 ¹⁰ 6 ¹⁰	8 ¹⁰ 10 ¹⁰ 12 ²⁵ 2 ¹⁰ 3 ¹⁰ 6 ¹⁰	6 ⁰ 8 ¹⁰ 10 ¹⁰ 12 ²⁵ 2 ¹⁰ 3 ¹⁰ 4 ¹⁰ 5 ¹⁰ 6 ¹⁰ 7 ¹⁰ 8 ¹⁰
<i>Neuer Krug</i>	8 ¹⁹ 10 ¹⁹ 1 ⁴ 2 ⁴ 3 ⁴ 6 ¹⁹	8 ¹⁹ 10 ¹⁹ 1 ⁴ 2 ⁴ 3 ⁴ 6 ¹⁹	6 ³⁹ 8 ⁴⁹ 10 ⁴⁹ 1 ⁴ 2 ⁴ 3 ⁴ 4 ⁴ 5 ⁴ 6 ⁴ 7 ⁴ 8 ⁴
	Vorm. Nachm. Abd.	Vorm. Nachm. Abd.	Vormittag Nachmittag Abend
<i>Neuer Krug</i>	Abg. 7 ⁴¹ 10 ⁴ 12 ¹⁹ 2 ²⁹ 3 ¹⁹ 6 ¹⁹	7 ⁴⁴ 10 ⁴ 12 ¹⁹ 2 ²⁹ 3 ¹⁹ 6 ¹⁹	6 ³⁹ 7 ⁴⁴ 10 ⁴ 12 ¹⁹ 2 ²⁹ 3 ¹⁹ 4 ¹⁹ 5 ¹⁹ 6 ¹⁹ 7 ¹⁹ 8 ¹⁹
<i>Berlin, Köpnickerstr. 8a</i>	Ank. 8 ³⁴ 10 ⁴⁴ 12 ³⁹ 3 ⁹ 4 ⁹ 6 ³⁹	8 ³⁴ 10 ⁴⁴ 12 ³⁹ 3 ⁹ 4 ⁹ 6 ³⁹	7 ¹⁹ 8 ³⁴ 10 ⁴⁴ 12 ³⁹ 3 ⁹ 4 ⁹ 5 ⁹ 6 ³⁹ 7 ³⁹ 8 ³⁹ 9 ³⁹
<i>do. Jannowitzbrücke</i>	8 ⁴³ 10 ⁵³ 1 ¹⁰ 3 ²⁰ 4 ¹⁰ 7 ¹⁰	8 ⁴³ 10 ⁵³ 1 ¹⁰ 3 ²⁰ 4 ¹⁰ 7 ¹⁰	7 ³⁰ 8 ⁴³ 10 ⁵³ 1 ¹⁰ 3 ²⁰ 4 ¹⁰ 5 ¹⁰ 6 ¹⁰ 7 ¹⁰ 8 ¹⁰ 9 ¹⁰

Situationsplan.

